

N. VILENKIN


¿ DE CUANTAS FORMAS ?

COMBINATORIA



$$P_n = n!$$

00, 01, 02, 03
10, 11, 12, 13
20, 21, 22, 23
30, 31, 32, 33



EDITORIAL MIR · MOSCÚ



Н. Я. ВИЛЕНКИН

КОМБИНАТОРИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
МОСКВА

N. VILENKIN

¿DE CUANTAS FORMAS? COMBINATORIA

TRADUCIDO DEL RUSO POR
JUAN JOSE TOLOSA

EDITORIAL MIR

MOSCU

CDU 519.1=60

Presentación de
M. O. Bišofs

Impreso en la URSS 1972
Derechos reservados

INDICE

Prefacio	7	CAPITULO III. PROBLEMAS COMBINATORIOS CON LIMITACIONES	
CAPITULO I. REGLAS GENERALES DE LA COMBINATORIA		Los leones y los tigres	42
Los ciclistas supersticiosos	9	La construcción de la escalera	42
Arreglos con repetición	9	El estante de libros	43
Sistemas de numeración	10	Los caballeros del rey Arturo	43
El candado secreto	11	La chica está apurada: tiene una cita	44
El código Morse	11	La sesión de telepatía	46
El semáforo marino	12	Problema general del desplazamiento	47
La máquina computadora electrónica digi- tal	13	Subfactoriales	48
El código genético	13	La caravana del desierto	49
Reglas generales de la combinatoria	14	Un paseo en calesita	51
Problema del dominó	15	En la cola del cine	52
La tripulación de la nave cósmica	15	Problema de las dos filas	55
Problemas de las damas	16	Nuevas propiedades de las combinaciones	55
¿Cuántas personas desconocen las lenguas extranjeras?	18	CAPÍTULO IV. COMBINATORIA DE LAS PAR- TICIONES	
Fórmula de inclusiones y exclusiones	19	El juego del dominó	58
¿Dónde está el error?	21	La distribución en cajones	59
La criba de Eratóstenes	21	El ramo de flores	59
CAPITULO II. ARREGLOS, PERMUTACIONES Y COMBINACIONES		Problema sobre el número de divisores	60
El campeonato de fútbol	23	La recolección de manzanas	60
Arreglos sin repetición	23	La recolección de hongos	61
La sociedad científica	24	El envío de las fotografías	61
Permutaciones	24	Banderas en los mástiles	62
Problema de las torres	25	Número total de señales	63
Problemas lingüísticos	25	Diferentes estadísticas	63
La ronda	26	Particiones de números	64
Permutaciones con repetición	27	El envío de la encomienda	64
Los anagramas	28	Problema general sobre el pegado de las estampillas	65
Combinaciones	29	Problemas combinatorios de la teoría de la información	66
La lotería genovesa	31	Problema del aspirante	66
La compra de los pasteles	33	El pago del dinero	67
Combinaciones con repetición	34	La compra de los caramelos	68
De nuevo el campeonato de fútbol	34	¿Cómo cambiar una moneda de 10 kopeks?	69
Propiedades de las combinaciones	35	Partición de números en sumandos	70
Caso particular de la fórmula de inclusiones y exclusiones	39	Método de los diagramas	71
Sumas alternadas de combinaciones	40	Diagramas duales	72
		Fórmula de Euler	73

CAPITULO V. COMBINATORIA EN EL		Tablas de recurrencia	108
TABLERO DE AJEDREZ		Otra resolución del problema del mayor-	
Un hombre deambula por la ciudad	76	domo	107
El cuadrado aritmético	76	Resolución de las relaciones de recurrencia	108
Números figurados	77	Relaciones de recurrencia lineales con coef-	109
El triángulo aritmético	78	icientes constantes	
Triángulo aritmético ampliado	79	Caso de raíces iguales de la ecuación ca-	111
El rey del ajedrez	80	racterística	
Triángulo aritmético generalizado	81	Tercera resolución del problema del mayor-	112
Triángulos aritméticos generalizados y sis-		domo	
tema de numeración m -esimal	81		
Algunas propiedades de los números $C_m(k, n)$	82	CAPITULO VII. LA COMBINATORIA Y LAS	113
La ficha en la esquina del tablero	83	SERIES	
El pentágono aritmético	84	División de polinomios	113
Método geométrico de demostración de las		Fraciones algebraicas y series de poten-	
propiedades de las combinaciones	85	cias	113
Movimientos aleatorios	87	Operaciones con las series de potencias	116
Movimiento browniano	88	Aplicación de las series de potencias a la	
En el reino de la zarina de Shemaján	90	demostración de identidades	117
La pared absorbente	91	Funciones generatrices	118
Paseos en el plano infinito	91	Binomio de Newton	118
Problema general de las torres	92	Fórmula polinómica	120
Distribuciones simétricas	93	Serie de Newton	122
Dos caballos	94	Extracción de raíces cuadradas	124
		Funciones generatrices y relaciones de	
CAPITULO VI. RELACIONES DE RECURRENCIA	97	recurrencia	125
Números de Fibonacci	97	Desarrollo en fracciones elementales	126
Otro método de demostración	99	Sobre una relación única no lineal de	
Proceso de particiones sucesivas	99	recurrencia	128
Multiplicación y división de números	100	Funciones generatrices y particiones de	
Problemas con polígonos	102	los números	129
La dificultad con que tropieza el mayordo-		Resumen de los resultados sobre la combi-	
mo	108	natoria de la partición	132
Números «de la suerte» de los billetes del		ROBLEMAS DE COMBINATORIA	133
trolebús	105	SOLUCIONES Y RESPUESTAS	164

PREFACIO

A los representantes de las más diferentes especialidades les toca resolver problemas en que se consideran unas u otras combinaciones, formadas por letras, cifras u otros objetos. El jefe del taller debe distribuir varios tipos de trabajo entre los tornos de que dispone; el agrónomo, distribuir la siembra de los cultivos agrícolas en varios campos; el director de la parte docente de una escuela, confeccionar el horario de las clases; el químico, estudiar las posibles uniones entre los átomos y las moléculas; el lingüista, considerar las distintas variantes del significado de las letras en un idioma desconocido, etc. La parte de la matemática que estudia los problemas sobre cuántas combinaciones diferentes—sometidas a unas u otras condiciones—se pueden formar con objetos dados, se denomina *combinatoria*.

La combinatoria surgió en el siglo XVI. En la vida de las capas privilegiadas de la sociedad de entonces, ocupaban un gran lugar los juegos de azar. Jugando a las cartas y a los dados¹ se ganaban y se perdían oro y brillantes, palacios y estancias, caballos de raza y adornos costosos. Estaban muy difundidas las loterías más variadas. Es comprensible, pues, que al principio los problemas combinatorios tratasen fundamentalmente sobre los juegos de azar, tratando de averiguar de cuántas maneras se puede obtener un número dado de tantos al arrojar dos o tres dados, o de cuántas formas se pueden obtener dos reyes en un juego de cartas. Estos y otros problemas de los juegos de azar fueron la fuerza motriz del progreso de la combinatoria y de la teoría de las probabilidades, que se desarrolló paralelamente a ésta.

Uno de los primeros en ocuparse del recuento del número de combinaciones diferentes en el juego de los dados fue el matemático italiano



Tartaglia. Este confeccionó una tabla que mostraba de cuántas maneras pueden caer r dados. Sin embargo, no se tenía en cuenta que una misma suma de puntos puede ser obtenida de diferentes maneras (por ejemplo, $1 + 3 + 4 = 4 + 2 + 2$).

El estudio teórico de los problemas combinatorios fue abordado en el siglo XVII por los científicos franceses Pascal y Fermat. El punto de partida de sus investigaciones también lo constituyeron problemas de los juegos de azar. Un papel particularmente grande lo jugó aquí el problema sobre la división de la apuesta, que fue propuesto a Pascal por su amigo, el caballero de Meré, un jugador apasionado. El problema consistía en lo siguiente: el «campeonato» de cara y cruz continuaría hasta que se ganasen seis partidos. Pero se interrumpiría cuando un jugador ganase 5 partidos, y el otro, 4; ¿cómo dividir la apuesta? Era evidente que la división en la razón $5 : 4$ no era justa. Aplicando los métodos de la combinatoria, Pascal resolvió el problema para el caso general, cuando a un jugador le quedan r partidos hasta que gane, y al otro, s . Otra resolución del problema fue dada por Fermat.

¹ En el juego de los dados se arrojan varios cubitos, en cuyas caras se representaban los números del 1 al 6. Ganaba el que obtenía mayor número de tantos. Existían también otras variantes del juego.

El desarrollo ulterior de la combinatoria está ligado a los nombres de Jacobo Bernoulli, Leibnitz y Euler. Sin embargo, para éstos también el papel fundamental lo jugaban las aplicaciones a diferentes juegos (lotería, solitarios y otros). En los últimos años, la combinatoria entró en un período de intenso desarrollo, relacionado con el crecimiento general del interés hacia los problemas de la matemática discreta. Los métodos combinatorios son aplicados para resolver problemas de transporte, en particular, problemas sobre la confección de horarios; para la confección de planes de producción y de realización de ésta. Fueron establecidos nexos entre la combinatoria y problemas de la programación lineal, la estadística, etc. La combinatoria es utilizada para confeccionar y descifrar claves y para resolver otros problemas de la teoría de la información.

Los métodos combinatorios juegan un gran papel también en problemas puramente matemáticos: en la teoría de los grupos y de sus representaciones, en el estudio de los fundamentos de la geometría, en las álgebras no asociativas, etc.

En el libro que proponemos al lector, se relata sobre los problemas combinatorios en forma entretenida, de divulgación. No obstante, en éste se analizan algunos problemas combinatorios bastante complejos, se da un concepto sobre los métodos de las relaciones de recurrencia y las funciones generatrices.

El primer capítulo del libro está dedicado a las reglas generales de la combinatoria: a las reglas de suma y de producto. En el segundo capítulo se estudian los arreglos, permutaciones y combinaciones. Este material escolar tradicional va acompañado del análisis de algunos ejemplos entretenidos. En el capítulo III estudiamos los problemas combinatorios en los que se imponen unas u otras limitaciones a las combinaciones en cuestión. En el capítulo IV se consideran los problemas sobre la partición de números y se relata sobre los métodos geométricos en la combinatoria. El capítulo V está dedicado a problemas sobre los desplazamientos aleatorios y a distintas modificaciones del triángulo aritmético. En el capítulo VI se relata sobre las relaciones de recurrencia, y en el VII, sobre las funciones generatrices y, en particular, sobre la fórmula binómica.

En el libro hay un apéndice que contiene más de 400 problemas combinatorios, tomados por el autor de varias fuentes. Muchos problemas han sido tomados del libro de W. Whitworth «Choice and Chances» («Elección y oportunidad»), Londres, 1901, del libro de J. Riordan «An Introduction to Combinatorial Analysis», New York 1958, del libro de A. M. Yaglom e I. M. Yaglom «Problemas no elementales expuestos en forma elementales», ed. Gostejizdat, 1954 (en ruso), de diferentes colecciones de problemas propuestos en olimpiadas matemáticas, etc.

REGLAS GENERALES DE LA COMBINATORIA

LOS CICLISTAS SUPERSTICIOSOS

«¡Otra vez un ocho!» exclamó amargamente el presidente del club de ciclistas, observando la rueda torcida de su bicicleta. «¿Y todo por qué?» Porque al ingresar al club me dieron el carné número 008. Y ahora no pasa un mes sin que en una u otra rueda aparezca un ocho. Hay que cambiar el número del carné. Y, para que no me acusen de superstición, haré un nuevo registro de todos los miembros del club, otorgando solamente billetes con números en los que no figure ni un ocho».

Dicho y hecho: al día siguiente cambió todos los carnés. ¿Cuántos miembros había en el club, si se sabe que fueron utilizados todos los números de tres cifras que no contienen ningún ocho? (Por ejemplo, el 000 fue utilizado, y el 836, no.)

Para resolver este problema determinemos primeramente cuántos números de una cifra no contienen ochos. Está claro que hay nueve números así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (el número 8 se omite). Hallemos ahora todos los números de dos cifras que no contengan ochos. Los podemos formar así: se toma cualquiera de los números de una cifra hallados y se escribe después de éste cualquiera de las nueve cifras admisibles. Como resultado, de cada número de una cifra obtenemos nueve de dos cifras. Y como los números de una cifra son también 9, se obtendrán $9 \cdot 9 = 81$ números de dos cifras sin ochos. Helos aquí:

00,	01,	02,	03,	04,	05,	06,	07,	09
10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	19
20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	29
30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	39
40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	49
50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	59
60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	69
70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	79
90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	99

Existen, pues $9^2 = 81$ números de dos cifras en los que no figura el 8. Pero a continuación de cada uno de ellos se puede escribir nuevamente



cualquiera de las nueve cifras admisibles. Como resultado, obtenemos $9^2 \cdot 9 = 9^3 = 729$ números de tres cifras. Esto significa que en el club había 729 ciclistas. Si tomamos no los números de tres cifras, sino los de cuatro, habrá $9^4 = 6561$ números que no contengan ochos.

En otro club, los ciclistas eran aún más supersticiosos. Como el número 0 se parece a una rueda estirada, eliminaron también esta cifra, y se las arreglaban con ocho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¿Cuántos miembros tenía este club, si los números de los carnés eran de tres cifras?

Este problema es semejante al que acabamos de resolver; sólo que ahora tenemos nada más que 8 cifras, en lugar de 9. Por esto, en la respuesta debemos también sustituir el 9 por el 8. En otras palabras, en el club había $8^3 = 512$ miembros.

ARREGLOS CON REPETICION

El problema sobre los ciclistas pertenece al siguiente tipo. Se dan objetos que pertenecen a n formas distintas. A partir de éstos se forman

todas las posibles distribuciones con k objetos en cada una o, como diremos en lo sucesivo, para abreviar, las k -distribuciones. Además, en cada distribución pueden figurar objetos de un mismo tipo, y dos distribuciones se consideran distintas, si se diferencian entre sí por el tipo de objetos que figuran en éstas, o por su orden. Hay que hallar el número total de estas distribuciones.

Las distribuciones del tipo descrito se denominan k -arreglos con repetición de elementos de n tipos¹; el número total de estos arreglos se denota mediante \bar{A}_n^k ². En el primer problema sobre los ciclistas, el número de tipos de elementos era igual a 9 (tomábamos todas las cifras, a excepción del 8), y en cada arreglo (en cada número) figuraban tres elementos. Como fue demostrado, en este caso el número de arreglos era igual a $\bar{A}_9^3 = 9^3$. Es natural suponer que, si el número de tipos es igual a n , y en cada arreglo figuran k elementos, se pueden formar n^k arreglos con repetición.

Queremos, pues, demostrar, que el número de k -arreglos con repetición de elementos de n tipos es igual a

$$\bar{A}_n^k = n^k. \quad (1)$$

La demostración se efectúa mediante inducción completa con respecto a k : el número de elementos en el arreglo, para un valor fijo de n . Para $k = 1$, la respuesta es evidente: cada arreglo (con repetición) está formado por un solo elemento, y distintos arreglos se obtienen si se toman elementos de tipos diferentes. Pero, como el número de tipos es igual a n , también el de arreglos será igual a n . Así, pues, $\bar{A}_n^1 = n$, en correspondencia con la fórmula (1).

Supongamos ahora que ya fue demostrada la igualdad $\bar{A}_{n-1}^k = n^{k-1}$, y consideremos los k -ar-

reglos con repetición. Todos estos pueden ser obtenidos de la siguiente manera. Tomemos cualquier $(k-1)$ -arreglo (con repetición) (a_1, \dots, a_{k-1}) y agreguémosle el elemento a_k de uno de los n tipos dados. Obtenemos cierto k -arreglo $(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k)$. Entonces queda claro que de cada $(k-1)$ -arreglo se obtienen tantos k -arreglos cuantos tipos distintos de elementos hay, es decir, n arreglos. Es evidente que, actuando de la forma indicada, no omitiremos ningún k -arreglo y que tampoco obtendremos ninguno repetido (si $(a_1, \dots, a_{k-1}) \neq (b_1, \dots, b_{k-1})$, o si $a_k \neq b_k$, será $(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k) \neq (b_1, \dots, b_{k-1}, b_k)$). Por esto, el número de k -arreglos con repetición formados por elementos de n tipos es n veces mayor que el de $(k-1)$ -arreglos con repetición de elementos de los mismos tipos. De este modo, $\bar{A}_n^k = n \bar{A}_{n-1}^k$. Pero partimos de la hipótesis de que $\bar{A}_{n-1}^k = n^{k-1}$. Por esto,

$$\bar{A}_n^k = n \cdot n^{k-1} = n^k.$$

Con esto queda demostrada la igualdad (1) para todos los valores de k .

La fórmula (1) se encuentra en toda una serie de problemas. Ahora nos referiremos a algunos de ellos.

SISTEMAS DE NUMERACION

Además del sistema decimal de numeración, se utilizan otros: de base dos, tres, ocho, etc. (véase el libro de S. V. Fomin «Sistemas de Numeración», ed. «Naúka», 1963, en ruso). En el sistema n -ario de numeración se utilizan n cifras. Calculemos cuántos números naturales que se escriben exactamente con k cifras hay en el sistema n -ario³. Si admitimos números que comiencen con cero, cada número de k cifras, en el sistema n -ario de numeración, se puede considerar como un arreglo con repetición, formado

¹ Se utiliza también la expresión «arreglos con repetición de n elementos, tomados de k en k ». Con frecuencia, en vez de «arreglos» se utiliza el término «variaciones (N. del T.)».

² En ruso, la posición de los índices n y k es inversa, \bar{A}_n^k (N. del T.).

³ Para mayor comodidad, aquí incluiremos al 0 entre los números naturales.

por k cifras, las cuales pueden ser de n tipos. Según la fórmula (1), se obtiene que la cantidad de números de este tipo es igual a n^k .

Pero para los números naturales no se utilizan escrituras que comiencen con cero. Por esto, del valor obtenido n^k hay que restar la cantidad de números cuya escritura n -aria comience con cero. Si eliminamos la primera cifra de estos números (el cero), obtendremos un número de $k-1$ cifras (el cual también puede comenzar con cero). Según la fórmula (1), habrá n^{k-1} números de este tipo. Esto significa que la cantidad total de números de k cifras en el sistema n -ario de numeración es igual a

$$n^k - n^{k-1} = n^{k-1}(n-1).$$

Por ejemplo, en el sistema decimal de numeración tendremos $10^3 - 9 = 900$ números de cuatro cifras: de los 10 000 números desde el 0 hasta el 9999 hay que restar mil números, precisamente, desde el 0 hasta el 999.

La fórmula obtenida se puede deducir también de otra forma. Resulta que en el número de k cifras, escrito en el sistema n -ario de numeración, la primera cifra será cualquiera de las cifras 1, 2, ..., $n-1$. La segunda, en cambio, así como todas las demás, cualquiera de las cifras 0, 1, 2, ..., $n-1$. De esta manera, tomamos $n-1$ candidatos al primer puesto, y n candidatos a cada uno de los $k-1$ puestos restantes. De aquí se deduce fácilmente que debe haber $(n-1)n^{k-1}$ números buscados.

EL CANDADO SECRETO

Para cerrar cajas fuertes y cámaras automáticas para equipaje, se utilizan candados secretos, que se abren sólo empleando cierta palabra secreta. Esta palabra se forma mediante uno o varios discos, en los cuales se han escrito letras (o cifras). Supongamos que en el disco se han escrito 12 letras, y la palabra secreta está formada por 5 letras. ¿Cuántas pruebas infructuosas pueden ser

efectuadas por una persona que desconozca la palabra secreta?

Según la fórmula (1), el número total de combinaciones es igual a

$$12^5 = 248\ 832.$$

Esto significa que puede haber 248 831 pruebas infructuosas. A propósito, por lo común las cajas fuertes se hacen de forma que después de la primera prueba infructuosa de abrirlas suene la alarma.

EL CODIGO MORSE

Al transmitir informaciones por el telégrafo, se utiliza el código Morse. En éste, las letras, las cifras y los signos de puntuación se denotan con puntos y rayas. Para algunas letras se utiliza un solo signo, por ejemplo, E^1 , y para otras hay que utilizar cinco símbolos, por ejemplo $\vartheta \dots$.

¿De dónde sale el número 5? ¿No se podría tomar un número menor de símbolos, por ejemplo, transmitir todas las informaciones mediante combinaciones que contengan no más de cuatro signos? Resulta ser que no se puede, y la respuesta la da precisamente la fórmula para el número de arreglos con repetición. De la fórmula (1) se deduce que $A_1^4 = 2$. En otras palabras, con un solo signo se pueden transmitir solamente dos letras (E y T). Mediante dos símbolos se pueden transmitir $2^2 = 4$ letras; con tres, $2^3 = 8$ letras, y con cuatro, $2^4 = 16$. Por esto, el número total de letras que se pueden transmitir con cuatro signos es igual a

$$2 + 4 + 8 + 16 = 30.$$

Pero el alfabeto ruso contiene 32 letras, y debemos transmitir además cifras y signos de puntuación.

¹ Aquí se utiliza el alfabeto ruso, cosa que no influye en absoluto sobre la comprensión del problema analizado. Para el alfabeto español, que posee 27 letras, tampoco bastarían cuatro signos (N. del T.).

Está claro que no bastan los símbolos de cuatro signos. En cambio, si tomamos también los símbolos de 5 signos, a los 30 obtenidos se agregarán 32 más. Los 62 símbolos obtenidos son totalmente suficientes para telegrafiar.

En el telégrafo se utiliza también un código de cinco signos en el cual cada letra se representa exactamente mediante cinco símbolos. Aquí se utilizan, en lugar de puntos y rayas, cambios de sentido de la corriente, o el envío de una señal con y sin corriente. Cuando se utiliza este código, se tienen exactamente $2^5 = 32$ combinaciones. Estas son suficientes, para transmitir las letras. Para la transmisión de las cifras, los signos de puntuación, etc., se utilizan las mismas combinaciones que para las letras. Por esto, los aparatos telegráficos de código de cinco signos tienen un dispositivo especial para hacer pasar el aparato de las letras a las cifras y viceversa¹.

EL SEMAFORO MARINO

En la marina se utiliza a veces un semáforo de banderines. A cada letra le corresponde aquí una posición determinada de los banderines. Por regla general, éstos se hallan en lados opuestos con respecto al cuerpo del que señala. Sin embargo, en la transmisión de ciertas letras (б, д, к, х, ю, я)² ambos banderines están situados a un mismo lado. ¿Por qué hubo que hacer esta excepción? La respuesta la da la misma fórmula de arreglos con repetición. Sucede que hay cinco posiciones distintas de cada banderín: hacia abajo verticalmente, hacia abajo e inclinado, horizontal, hacia arriba e inclinado y hacia arriba en forma vertical. Como se tienen dos banderines, el número total de combinaciones



de las posiciones fundamentales es igual a $\bar{A}_2^5 = 5^2 = 25$. Debe además eliminarse la posición en que ambos banderines están dirigidos hacia abajo, que sirve para separar las palabras. En total se obtienen 24 combinaciones, lo que es insuficiente para transmitir todas las letras del alfabeto ruso. Por esto, para algunas letras hubo que dirigir ambos banderines hacia un mismo lado.

¹ Este paso se efectúa en forma similar a como en la máquina de escribir se pasa de la posición «mayúsculas» a la «minúsculas», y viceversa (N. del T.).

² Véase la nota al pie de la pág. 11. Aquí tampoco es de importancia especial que se considere el código para el alfabeto ruso. Para el español tampoco bastarían las posiciones con los banderines en lados distintos (N. del T.).

LA MAQUINA COMPUTADORA ELECTRONICA DIGITAL

Las máquinas computadoras electrónicas pueden resolver los problemas más diferentes. En una misma máquina se pueden descifrar las escrituras en idiomas desconocidos, efectuar el cálculo de una represa y elaborar los datos sobre el movimiento de un cohete. ¿Cómo se explica esta diversidad de aplicaciones de la máquina? Fundamentalmente esto se debe a que todos estos problemas se reducen a cálculos, a operaciones con números. Pero ¿por qué la máquina puede resolver tantos problemas, y para los datos numéricos más variados? ¿Cuántas combinaciones diferentes de números se pueden situar en la máquina?

Para responder a esta pregunta, tomemos, por ejemplo, la computadora «Strelá». La memoria operativa de esta máquina está formada por 2048 células, cada una de las cuales contiene 43 cifras binarias¹. Cada cifra puede contener 0 ó 1. En total, tenemos $43 \cdot 2048 > 87\,000$ lugares diferentes, siendo el número de tipos de llenado de las celdas igual a dos (0 ó 1). Según la fórmula (1), obtenemos que la máquina «Strelá» puede hallarse en más de $2^{87\,000}$ estados diferentes. Es difícil hacerse una idea de la magnitud de este número. Es suficiente decir que el número de neutrones que se pueden empaquetar densamente en una esfera de radio igual a la distancia hasta la nebulosa más alejada que conocemos, no es mayor que 2^{500} .

Si tomásemos una sola célula de la memoria, se necesitaría el trabajo de nueve años de un ejército de cien mil mecanógrafas, para imprimir todos los números que pueden surgir en esta célula (considerando que las mecanógrafas trabajan siete horas por día y que invierten 10 segundos en escribir un número de 43 cifras).

¹ Para este ejemplo se ha tomado una de las computadoras más pequeñas de la URSS. La memoria operativa de una computadora media es de 4 a 8 veces mayor (N. del T.).

EL CODIGO GENETICO

Un descubrimiento trascendente de la biología del siglo XX fue el descifrado del código genético. Se pudo esclarecer de qué forma se transmite la información hereditaria a los descendientes.

Resultó ser que esta información está escrita en las moléculas gigantes del ácido desoxirribonucleírico (ADN). Las distintas moléculas de ADN se diferencian entre sí en el orden de distribución de 4 bases de nitrógeno: adenina, timina, guanina y citosina. Estas bases determinan el orden de formación de las albúminas del organismo, a partir de dos decenas de aminoácidos, estando cada aminoácido cifrado en un código de tres bases de nitrógeno.

Es fácil comprender de dónde salió el número 3. Mediante combinaciones de dos bases se pueden cifrar sólo $4^2 = 16$ aminoácidos, lo cual es insuficiente. Si, en cambio, se toman de a 3 bases, se obtienen $4^3 = 64$ combinaciones. Esto ya bastará, con exceso, para cifrar las dos decenas. Sería muy interesante saber cómo utiliza la naturaleza el exceso de información: el número de combinaciones es igual a 64, y el de aminoácidos es tres veces menor.

En un cromosoma hay varias decenas de millones de bases de nitrógeno. El número de combinaciones diferentes en que estas bases pueden ir una detrás de la otra es inimaginablemente grande¹.

Sería suficiente una parte pequinísima de estas combinaciones para asegurar toda la variedad de la naturaleza viva durante el tiempo de existencia de la vida en la Tierra. Se sobreentiende que hay que tener en cuenta que sólo una parte muy pequeña de las combinaciones teóricamente posibles conduce a organismos aptos para la vida.

¹ Este es igual a 4^N , siendo N el número de bases en el cromosoma; véase la fórmula (1).

REGLAS GENERALES DE LA COMBINATORIA

Como veremos más adelante, los problemas combinatorios son de los tipos más variados. Pero la mayoría de éstos se resuelven mediante dos reglas fundamentales: la regla de la suma y la del producto.

A menudo se pueden dividir todas las combinaciones estudiadas en varias clases, figurando cada combinación en una clase, y sólo en una. Está claro que en este caso el número total de combinaciones es igual a la suma de los números de combinaciones de todas las clases. Este enunciado se llama, precisamente, *regla de la suma*. A veces se formula en forma un tanto diferente:

Si cierto objeto A puede ser escogido de m maneras, y otro objeto B, de n maneras, la elección de A o B se puede efectuar de $m + n$ modos.

En la aplicación de la regla de la suma en su última forma, hay que cuidar de que ninguna de las maneras de elección del objeto A coincida con alguna forma de elección del B (o, como expresamos antes, de que ninguna combinación se halle a la vez en dos clases). Si existen tales coincidencias, la regla de la suma pierde su validez, y obtenemos sólo $m + n - k$ modos de elección, donde k es el número de coincidencias.

La segunda regla, denominada *regla del producto*, es algo más compleja. Con frecuencia, al formar las combinaciones de dos elementos se sabe de cuántas maneras se puede escoger el primer elemento y de cuántas el segundo, no dependiendo el número de formas de elección del segundo elemento de cómo fue elegido el primero. Supongamos que el primer elemento se puede escoger de m maneras, y el segundo, de n . Entonces el par de estos elementos se puede elegir de mn modos. En otras palabras:

Si el objeto A se puede escoger de m maneras y si, después de cada una de estas elecciones, el objeto B se puede escoger de n modos, la elección del par (A, B) en el orden indicado se puede efectuar de mn formas.

Para demostrar la regla del producto, obsérvese que cada una de las m formas de elección del objeto A se puede combinar con las n maneras de escoger el B. Esto, precisamente, conduce a las mn formas de elegir el par (A, B).

La regla del producto puede ser representada ilustrativamente mediante la tabla siguiente:

Tabla 1

$(A_1, B_{11}), \dots, (A_1, B_{1n})$
$(A_2, B_{21}), \dots, (A_2, B_{2n})$
\dots
$(A_i, B_{i1}), \dots, (A_i, B_{in})$
\dots
$(A_m, B_{m1}), \dots, (A_m, B_{mn})$

Aquí mediante A_1, \dots, A_m se denotan las m maneras de elección del objeto A, y mediante B_{11}, \dots, B_{1n} , las n formas de escoger el B, si el objeto A fue elegido de la i -ésima manera. Está claro que esta tabla contiene todas las formas de elección del par (A, B) y consta de mn elementos.

Si las formas de elección del objeto B no dependen de cómo fue elegido el A, en lugar de la tabla 1 se obtiene otra más sencilla:

Tabla 2

$(A_1, B_1), (A_1, B_2), \dots, (A_1, B_n)$
$(A_2, B_1), (A_2, B_2), \dots, (A_2, B_n)$
\dots
$(A_m, B_1), (A_m, B_2), \dots, (A_m, B_n)$

Puede suceder que debamos formar no pares, sino agrupaciones de un mayor número de elementos. Se llega entonces al siguiente problema:

¿Cuántas k-distribuciones se pueden formar, si el primer elemento puede ser de uno de los n_1 tipos diferentes, el segundo, de n_2 tipos diferentes, ..., el k-ésimo, de n_k tipos distintos? Dos distribuciones se consideran distintas, si por lo menos en un lugar de éstas se hallan elementos diferentes.

Este problema se resuelve igual que el de los ciclistas. El primer elemento se puede escoger de n_1 formas. Cada uno de los elementos elegidos se puede unir a cualquiera de los n_2 tipos de segundos elementos, lo que nos da $n_1 n_2$ pares. Cada par se puede unir a cualquiera de los n_3 tipos de terceros elementos, obteniéndose así $n_1 n_2 n_3$ ternas. Continuando el proceso, obtenemos en fin de cuentas $n_1 n_2 \dots n_k$ distribuciones del tipo buscado.

En el problema de los ciclistas había que escoger tres elementos (la cifra de las decenas,




Fig. 1.

la de las decenas y la de las unidades). En cada paso podíamos escoger una de las nueve cifras admisibles. Por esto obtuvimos, precisamente, $9 \cdot 9 \cdot 9 = 729$ números. El problema que insertamos a continuación es más difícil.

Se forman signos que consisten en una figura geométrica (circunferencia, cuadrado, triángulo o hexágono), una letra y una cifra. ¿Cuántos signos de este tipo pueden formarse?

Aquí se puede elegir, en primer término, una figura geométrica. Esta elección se puede hacer de cuatro maneras (disponemos en total de cuatro figuras). Luego hay que escoger una de las 32¹ letras y, por último, una de las 10 cifras. En total, se obtienen $4 \cdot 32 \cdot 10 = 1280$ combinaciones.

PROBLEMA DEL DOMINÓ

Son más difíciles de resolver los problemas combinatorios en los cuales el número de eleccio-

nes después de cada paso depende de qué elementos fueron escogidos en los pasos anteriores. He aquí un ejemplo de estos problemas.

¿De cuántas formas se pueden escoger dos fichas de dominó, de las 28 que hay, de forma que se puedan aplicar una a la otra (es decir, de modo que se encuentre el mismo número de tantos en ambas fichas)?

Escojamos primeramente una ficha. Esto se puede hacer de 28 maneras. Aquí, en 7 casos la ficha elegida será un «dobles», es decir, tendrá la forma 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, y en 21 casos será una ficha con distinto número de tantos (por ejemplo, 05, 13, etc.). En el primer caso, la segunda ficha se puede elegir de 6 maneras (por ejemplo, si en el primer paso fue elegida la ficha 11, en el segundo se puede tomar una de las fichas 01, 12, 13, 14, 15, 16). En el segundo caso, la segunda ficha se puede escoger de 12 maneras (para la ficha 35 servirán las 03, 13, 23, 33, 34, 36, 05, 15, 25, 45, 55, 56). Según la regla del producto, en el primer caso obtenemos $7 \cdot 6 = 42$ elecciones, y en el segundo, $21 \cdot 12 = 252$. Esto significa, según la regla de la suma, tendremos $42 + 252 = 294$ formas de elegir el par.

En el razonamiento efectuado se consideró también el orden en que se elegían las fichas. Por esto, cada par de fichas figuraba dos veces (por ejemplo, la primera vez 01 y 16, la segunda, 16 y 01). Si no se tiene en cuenta el orden de elección de las fichas, obtendremos una cantidad dos veces menor de las formas de elección, es decir, 147.

LA TRIPULACION DE LA NAVE COSMICA

En el caso en que el número de elecciones posibles en cada paso depende de qué elementos fueron elegidos antes, resulta cómodo representar el proceso de confección de las combinaciones en forma de «árboles». Primeramente se trazan, a par-

¹ En el alfabeto español disponemos de 27 letras solamente, lo cual nos da un resultado total de $4 \cdot 27 \cdot 10 = 1080$ combinaciones (N. del T.).

tir de un punto, tantos segmentos como elecciones diferentes se pueden hacer en el primer paso (de este modo, cada segmento corresponde a un elemento). A partir del extremo de cada segmento, se trazan tantos segmentos como elecciones se pueden hacer en el segundo paso, si la primera vez fue escogido el elemento dado, etc.




Fig. 2.

Como resultado de esta construcción se obtiene un «árbol», cuyo análisis nos da fácilmente el número de soluciones de nuestro problema.

Estudieemos el ejemplo siguiente. Se sabe que al formar la tripulación de las naves cósmicas de más de una persona surge el problema sobre la compatibilidad psicológica de los participantes de la travesía cósmica. Puede ocurrir que incluso las personas más indicadas, si se consideran aisladamente, no se adaptan entre sí durante un viaje cósmico prolongado. Supongamos que es necesario formar la tripulación de una nave cósmica de tres personas: el comandante, el ingeniero y el médico. Para el lugar del comandante hay cuatro candidatos: a_1, a_2, a_3, a_4 , para el de ingeniero, 3: b_1, b_2, b_3 , y para el de médico, 3: c_1, c_2, c_3 . El análisis efectuado demostró que el

comandante a_1 es psicológicamente compatible con los ingenieros b_1 y b_2 y con los médicos c_2, c_3 ; el comandante a_2 , con los ingenieros b_1 y b_2 y con todos los médicos; el a_3 lo es con los ingenieros b_1 y b_2 y los médicos c_1, c_2 ; el a_4 , con todos los ingenieros y con el médico c_2 . Además, el ingeniero b_1 es psicológicamente incompatible con el médico c_3 ; el ingeniero b_2 , con el médico c_1 , y el b_3 , con el médico c_2 . ¿De cuántas maneras se puede formar la tripulación de la nave, bajo estas condiciones?

El árbol correspondiente está representado en la fig. 2. Este muestra que existen sólo 10 combinaciones admisibles (si no existiera la limitación de la compatibilidad, el número de combinaciones sería, según la regla del producto, igual a $36 = 4 \cdot 3 \cdot 3$).

PROBLEMAS DE LAS DAMAS

Resolvamos el siguiente problema:

¿De cuántas maneras se pueden poner en el tablero de damas dos fichas, una blanca y una negra, de forma que la blanca pueda comer a la negra?

Según las reglas del juego de damas¹, éstas se ubican en las casillas negras, y una ficha come a la otra saltando sobre ésta y situándose en la casilla siguiente (fig. 3). Si la ficha alcanzó la última horizontal, se transforma en dama y puede comer a todas las fichas que se hallen en una misma diagonal con ella, a excepción de las que se hallen en los extremos de las diagonales.

La complejidad de este problema consiste en que para distintas posiciones de la ficha blanca hay un número diferente de posiciones de la negra, en las cuales se la puede comer. Por ejemplo, si la ficha blanca se halla en la casilla a_1 , existe

¹ En la Unión Soviética el tablero de damas coincide con el de ajedrez (forma un cuadrado de ocho casillas de lado, y no de diez). Además, una ficha puede comer a la otra moviéndose no solamente hacia adelante, sino también hacia atrás. Todo esto debe ser tenido en cuenta en la resolución del problema considerado (N. del T.).

sólo una posición de la negra, en la cual ésta se hallará en peligro. Si, en cambio, la ficha blanca está en la casilla c3, el número de posiciones buscadas de la ficha negra es igual a 4. Por





Fig. 3.

último, si la ficha blanca llegó a dama, en la casilla h8, hay 6 posiciones de la negra en la que esta dama se la puede comer.


Por esto, aquí lo más sencillo es indicar, para cada posición de la ficha blanca, el número de posiciones posibles de la negra y sumar los resultados obtenidos. En la fig. 4, a está representado el tablero con la indicación de los números correspondientes. Sumándolos, obtenemos 87. Esto significa que la distribución buscada es posible de 87 maneras.

Está claro que existe exactamente la misma cantidad de posiciones en las que la ficha negra puede comerse a la blanca. Pero la cantidad de posiciones en las que ambas fichas pueden comer una a la otra es menor. Por ejemplo, si la ficha blanca se halla en el extremo del tablero, no se la puede comer, esté donde esté la ficha negra. Por esto, a todas las casillas del borde del tablero les corresponde el número 0. De igual forma se hallan los números que corresponden a las otras casillas negras. Estos se representan en la fig. 4, b. Sumando estos números, obtenemos que la distribución buscada es posible de 50 modos.

Hallemos, por último, el número de posiciones de las fichas blanca y negra, en las cuales ni una de ellas puede comerse a la otra. Podríamos resolver este problema al igual que los anteriores,



a)




b)

Fig. 4.

ubicando la ficha blanca en cada casilla negra y calculando de cuántas formas se puede colocar la ficha negra de modo que ninguna de estas fichas pueda comerse a la otra. Pero aquí resulta más sencillo aplicar el «principio de la tetera»¹

¹ Cuentan que una vez un matemático preguntó a un físico: «Ante usted hay una tetera vacía y un hornillo de gas apagado; ¿qué hacer para hervir el agua?» «Hay que llenar la tetera con agua, prender el gas y poner la tetera



y reducir este problema a otro ya resuelto. Para esto, hallemos primeramente la suma total de posiciones en que se puede poner en el tablero una ficha blanca y una negra. La ficha blanca se puede colocar en cualquiera de las 32 casillas negras. Después de esto, para la ficha negra quedarán 31 casillas. Por esto, en virtud de la regla del producto, la distribución es posible de $32 \cdot 31 = 992$ maneras. Pero de éstas, hay 87 en las que la ficha blanca puede comerse a la negra, y 87 en los que la negra puede comerse a la blanca. Por esto, hay que restar $2 \cdot 87 = 174$ maneras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas formas fueron eliminadas dos veces, a causa de que la ficha blanca podía comerse a la negra, y a causa de que la negra podía comerse a la blanca. Hemos visto que

sobre el hornillo, contestó el físico. «Correcto», dijo el matemático. «Ahora resuelva un segundo problema: ante un hornillo encendido se halla una tetera llena. ¿Cómo hervir el agua?» «Esto es aún más sencillo: hay que poner la tetera sobre el hornillo.» «De ningún modo!» exclamó el matemático. «Hay que apagar el hornillo, verter el agua de la tetera, y llegamos así al primer problema, que ya sabemos resolver.»

Por esto, cuando se reduce un problema nuevo a otros ya resueltos, se dice en broma que se aplica el «principio de la tetera».

existen 50 posiciones en las cuales ambas fichas pueden comerse una a la otra. Por esto, el número de posiciones en que ninguna ficha puede comer a la otra es igual a

$$992 - 174 + 50 = 868.$$

¿CUANTAS PERSONAS DESCONOCEN LAS LENGUAS EXTRANJERAS?

El método con que resolvimos el último de los problemas sobre las damas se aplica con frecuencia a la resolución de problemas combinatorios. Consideremos el siguiente ejemplo:

En un instituto de investigación científica trabajan 67 personas. De éstas, 47 conocen el inglés, 35, el alemán y 23, ambos idiomas. ¿Cuántas personas en el instituto no conocen el inglés ni el alemán?

Para resolver este problema, es necesario dividir todo el colectivo de colaboradores del instituto en partes sin elementos comunes. La





Fig. 5.

primera la formarán los que saben sólo el inglés; la segunda, los que saben sólo el alemán; la tercera, los que conocen todos los idiomas, y la cuarta, los que no saben ni uno ni otro idioma (fig. 5). Se conoce que la tercera parte consta de 23 personas. Pero, como el inglés lo saben 47 personas, sólo este idioma lo conocerán $47 - 23 = 24$ personas. De la misma manera, solamente el alemán lo dominarán $35 - 23 = 12$ personas. De aquí se deduce que el número total de personas que conocen uno de estos idiomas (por lo menos) es igual a $23 + 24 + 12 = 59$. Y como en el instituto trabajan en total 67 personas, para la última parte quedarán $67 - 59 = 8$ personas. Así, pues, 8 personas desconocen el inglés y el alemán.

La última respuesta se puede escribir en la forma

$$8 = 67 - (23 + 24 + 12).$$

Peró 24 lo obtuvimos restando 23 de 47, y 12, restando 23 de 35. Por esto,

$$\begin{aligned} 8 &= 67 - 23 - (47 - 23) - (35 - 23) = \\ &= 67 - 47 - 35 + 23. \end{aligned}$$

Ahora se aprecia la regla: del número total de colaboradores se resta el número de los que saben inglés y el de los que saben alemán. Aquí algunos colaboradores se incluyen en ambas listas, y resultan «sustraídos» dos veces. Estos son justamente los políglotas, que conocen ambos idiomas. Agregando el número de éstos, obtenemos la cantidad de personas que no dominan ninguno de estos idiomas.

Compliquemos el problema analizado, agregando un idioma más. Supongamos que 20 personas saben francés; 12, el inglés y el francés; 11, el alemán y el francés, y 5, los tres idiomas. Está claro que entonces sólo inglés y francés (sin alemán) sabrán $12 - 5 = 7$ personas, y sólo alemán y francés, $11 - 5 = 6$ personas. Por ende, sólo el francés lo sabrán $20 - 7 - 6 - 5 = 2$ personas. Estas figuras entre las 8 personas que no saben ni el inglés ni el alemán.

Por lo tanto, el número de personas que desconocen los tres idiomas es igual a $8 - 2 = 6$.

La respuesta obtenida se puede escribir como sigue:

$$\begin{aligned} 6 &= 8 - 2 = 67 - 47 - 37 + 23 - (26 - 7 - 6 - 5) = \\ &= 67 - 47 - 37 + 23 - 20 + (12 - 5) + (11 - 5) + 5 = \\ &= 67 - 47 - 37 - 20 + 23 + 12 + 11 - 5. \end{aligned}$$

Ahora la regla queda totalmente clara. Primeramente, del número total de colaboradores se resta el de los que saben uno de los idiomas (y, puede ser, los otros también). Entonces algunos son «sustraídos» dos veces, pues saben dos idiomas. Por esto, se suman los números 23, 12, 11, que indican cuántas personas dominan dos idiomas (y, puede ser, también el tercero). Pero las personas que conocen los tres idiomas son al principio «sustraídas» tres veces y después «sumadas» tres veces. Como hay que sustraerlas, de todos modos, debemos restar además el número 5.

FORMULA DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

Los ejemplos analizados permiten formular una ley general. Supongamos que se tienen N objetos, algunos de los cuales poseen las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Cada objeto puede o bien no poseer ninguna de estas propiedades, o bien tener una o varias de ellas. Denotemos mediante $N(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k)$ la cantidad de objetos que poseen las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ (y, puede ser, también algunas de las otras propiedades). Si nos hace falta subrayar que se toman sólo los objetos que no poseen cierta propiedad, ésta se escribirá con tilde. Por ejemplo, $N(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3)$ denota el número de objetos que poseen las propiedades α_1 y α_2 , pero no poseen la α_3 (la cuestión sobre las demás propiedades queda sin resolver).

El número de objetos que no poseen ninguna de las propiedades indicadas se designa, según esta

regla, mediante

$$\begin{aligned}
 N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_n). \text{ La ley general consiste en que} \\
 N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_n) = N - N(\alpha_1) - N(\alpha_2) - \dots \\
 \dots - N(\alpha_n) + N(\alpha_1\alpha_2) + N(\alpha_1\alpha_3) + \dots \\
 \dots + N(\alpha_1\alpha_n) + \dots + N(\alpha_{n-1}\alpha_n) - \\
 - N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) - \dots - N(\alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n) + \dots \\
 \dots + (-1)^n N(\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n). \quad (2)
 \end{aligned}$$

Aquí la suma algebraica se generaliza a todas las combinaciones de las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (sin tener en cuenta su orden); el signo $+$ se pone cuando el número de propiedades que figuran es par, y el $-$, cuando este número es impar. Por ejemplo, $N(\alpha_1\alpha_3\alpha_4\alpha_5)$ figura con signo $+$, y $N(\alpha_3\alpha_4\alpha_1\alpha_5)$, con signo $-$. La fórmula (2) se llama *fórmula de inclusiones y exclusiones*: primeramente se excluyen todos los objetos que poseen por lo menos una de las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, luego se incluyen los que poseen por lo menos dos de estas propiedades, se excluyen los que tienen por lo menos tres, etc.

Demostremos la fórmula (2). La demostración se efectúa mediante inducción con respecto al número de propiedades. Para una propiedad, la fórmula es evidente. Cada objeto o bien posee esta propiedad, o no la posee. Por esto,

$$N(\alpha') = N - N(\alpha).$$

Supongamos ahora que la fórmula (2) ya fue demostrada para el caso en que el número de propiedades es igual a $n-1$:

$$\begin{aligned}
 N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}) = N - N(\alpha_1) - \dots - N(\alpha_{n-1}) + \\
 + N(\alpha_1\alpha_2) + \dots + N(\alpha_{n-2}\alpha_{n-1}) - \\
 - N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) - \dots - N(\alpha_{n-3}\alpha_{n-2}\alpha_{n-1}) + \dots \\
 \dots + (-1)^{n-1} N(\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_{n-1}). \quad (3)
 \end{aligned}$$

Esta fórmula, por hipótesis, es válida para cualquier conjunto. En particular, es válida para el conjunto de $N(\alpha_n)$ elementos que poseen la propiedad α_n . Para éste, la fórmula (3) adquiere

la forma

$$\begin{aligned}
 N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}\alpha_n) = N(\alpha_n) - N(\alpha_1\alpha_n) - \dots \\
 \dots - N(\alpha_{n-1}\alpha_n) + N(\alpha_1\alpha_2\alpha_n) + \dots \\
 \dots + N(\alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n) - N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_n) - \dots \\
 \dots + (-1)^{n-1} N(\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_{n-1}\alpha_n) \quad (4)
 \end{aligned}$$

(se agrega la indicación de que en cada caso se toman sólo los objetos que poseen la propiedad α_n).

Restemos la igualdad (4) de la (3). En el segundo miembro obtenemos lo que necesitábamos: el segundo miembro de la fórmula (2). Y en el primero, obtenemos la diferencia

$$N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}) - N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}\alpha_n). \quad (5)$$

Pero $N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1})$ es el número de objetos que no poseen las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ pero que pueden poseer la α_n . Y $N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}\alpha_n)$ es el número de objetos que no tienen las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ pero con seguridad poseen la α_n . Por ende, la diferencia (5) es precisamente igual al número de objetos que no poseen ninguna de las propiedades $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$. En otras palabras,

$$\begin{aligned}
 N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}) - N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}\alpha_n) = \\
 = N(\alpha'_1\alpha'_2 \dots \alpha'_{n-1}\alpha'_n).
 \end{aligned}$$

De este modo, después de restar obtenemos, también en el primer miembro, el primer miembro de la fórmula (2). Queda así demostrada dicha fórmula para el caso en que el número de propiedades es igual a n .

Así, pues, la relación (2) es justa para n propiedades, siempre y cuando lo sea para $n-1$. Y para $n=1$ ya ha sido demostrada; por esto, queda demostrada la validez de dicha relación para cualquier cantidad de propiedades.

La fórmula (2) se puede representar también en forma simbólica de la siguiente manera:

$$N(\alpha'\beta' \dots \omega') = N(1 - \alpha)(1 - \beta) \dots (1 - \omega). \quad (6)$$

Aquí, luego de abrir paréntesis, hay que escribir los productos $N\alpha\beta \dots \lambda$ en la forma $N(\alpha\beta \dots \lambda)$. Por ejemplo, en lugar de $N\alpha\beta\delta\omega$ escribiremos $N(\alpha\beta\delta\omega)$.

$$N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 45 - 25 - 30 - 28 + 16 + 18 + \\ + 17 - 15 = -2.$$

¡Pero la respuesta no puede ser negativa! Por esto, los datos suministrados contienen una contradicción interna, son incorrectos.

¿DONDE ESTA EL ERROR?

El responsable de una clase dio los siguientes datos sobre los alumnos: «En la clase estudian 45 escolares, de los cuales 25 son niños, 30 escolares tienen notas de «buenos» y «sobresalientes», entre ellos, 16 niños. 28 alumnos practican el deporte, habiendo entre ellos 18 niños y 17 escolares que tienen notas de «buenos» y «sobresalientes». 15 niños tienen notas de «buenos» y «sobresalientes» y al mismo tiempo practican el deporte»¹.

Al cabo de varios días el alumno fue llamado por el director de la clase (el cual, para colmo, dictaba matemáticas) quien le dijo que había un error en los datos. Tratemos de descubrir cómo lo supo. Para esto, calculemos cuántas niñas no practican el deporte y obtienen a veces «tres» (y, puede ser, «dos»). Denotemos mediante α_1 la pertenencia al sexo masculino, mediante α_2 las buenas calificaciones y mediante α_3 la afición al deporte. Hallemos a qué es igual $N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)$. Las condiciones del problema nos dan que

$$N(\alpha_1) = 25, N(\alpha_2) = 30, N(\alpha_3) = 28, \\ N(\alpha_1\alpha_2) = 16, \\ N(\alpha_1\alpha_3) = 18, N(\alpha_2\alpha_3) = 17, N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 15.$$

Esto significa, de acuerdo con la fórmula de inclusiones y exclusiones, que

LA CRIBA DE ERATOSTENES

Uno de los problemas más grandes de las matemáticas es la distribución de los números primos entre todos los naturales. A veces, entre dos números primos hay tan sólo uno compuesto (por ejemplo, 17 y 19, 29 y 31); a veces, van uno tras otro un millón de números compuestos. Ahora ya los científicos conocen bastante bien cuántos números primos hay entre los N primeros números naturales. En estos cálculos resultó de suma utilidad un método que se remonta a Eratóstenes, sabio de la Grecia antigua (vivió en el siglo III a.n.e. en Alejandría).

Eratóstenes estudió los problemas más variados: realizó investigaciones interesantes en las matemáticas, la astronomía y otras ciencias. A propósito, esta diversidad lo condujo a ser un tanto superficial. Los contemporáneos llamaban a Eratóstenes, no sin ironía, «el segundo en todo» (el segundo matemático después de Euclides, el segundo astrónomo después de Hiparco, etc.).

En las matemáticas, a Eratóstenes le interesaba precisamente el problema sobre cómo hallar todos los números primos entre los naturales de 1 a N^1 . Para resolverlo, ideó el siguiente medio. Primeramente, se tachan todos los números que se dividen por 2 (excluyendo el propio 2). Luego se toma el primero de los números que quedan (precisamente, el 3). Está que este número es primo. Se tachan todos los números que lo siguen y se dividen por 3. El primero de los números

¹ En las escuelas de la URSS existen cinco calificaciones: 5 (sobresaliente), 4 (bueno), 3 (regular), 2 (insuficiente) y 1 (deficiente). La nota «1» se utiliza raramente; en los institutos de enseñanza superior no se utiliza, siendo «2» la nota más baja (en los exámenes significa «aplazado» o «eliminado») (N. del T.).

¹ Eratóstenes consideraba a 1 número primo. Ahora los matemáticos consideran a 1 un número de tipo especial, que no pertenece ni a los números primos ni a los compuestos.

restantes será el 5. Tachamos todos los siguientes que se dividen por 5, etc. Los números que sobrevivan a todas las tachaduras serán precisamente los primos. Como en los tiempos de Eratóstenes escribían en tablas de cera, y no tachaban las cifras, sino que las perforaban, la tabla, después de efectuar el proceso descrito, se asemejaba a una criba. Por esto, el método de Eratóstenes para determinar los números-primos fue denominado «criba de Eratóstenes».

Calculemos cuántos números quedarán en la primera centena si tachamos, por el método de Eratóstenes, los que se dividen por 2, 3 y 5. En otras palabras, planteémosnos el siguiente problema ¿cuántos números de la primera centena no se dividen por ninguno de los números 2, 3, 5? Este problema se resuelve mediante la fórmula de inclusiones y exclusiones.

Designemos por α_1 la propiedad de un número de ser divisible por 2, mediante α_2 , la de divisibilidad por 3 y mediante α_3 , la de ser divisible por 5. Entonces $\alpha_1\alpha_2$ significará que el número se divide por 6; $\alpha_1\alpha_3$, que éste se divide por 10, y $\alpha_2\alpha_3$, que se divide por 15. Por último, $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ significa que el número se divide por 30. Debemos hallar cuántos números, del 1 al 100, no se dividen ni por 2, ni por 3, ni por 5, es decir, no poseen ninguna de las propiedades α_1 , α_2 , α_3 .

Según la fórmula (2), se tiene que

$$N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 100 - N(\alpha_1) - N(\alpha_2) - N(\alpha_3) + \\ + N(\alpha_1\alpha_2) + N(\alpha_1\alpha_3) + N(\alpha_2\alpha_3) - \\ - N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3).$$

Pero, para hallar cuántos números, del 1 al N , se dividen por n , hay que dividir N por n y tomar la parte entera del cociente obtenido. Por esto

$$N(\alpha_1) = 50, \quad N(\alpha_2) = 33, \quad N(\alpha_3) = 20, \\ N(\alpha_1\alpha_2) = 16, \quad N(\alpha_1\alpha_3) = 10, \quad N(\alpha_2\alpha_3) = 6, \\ N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 3,$$

de donde

$$N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 32.$$

De esta manera, 32 números del 1 al 100 no se dividen ni por 2, ni por 3, ni por 5. Estos, precisamente, serán los números que sobrevivirán a las tres primeras etapas del proceso de Eratóstenes. Además, quedarán los propios números 2, 3 y 5. En total, quedarán 35 números.

Del primer millar, después de las tres primeras etapas del proceso indicado, quedarán 335 números. Esto es consecuencia de que en este caso será:

$$N(\alpha_1) = 500, \quad N(\alpha_2) = 333, \quad N(\alpha_3) = 200, \\ N(\alpha_1\alpha_2) = 166, \\ N(\alpha_1\alpha_3) = 100, \quad N(\alpha_2\alpha_3) = 66, \quad N(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 33.$$

CAPITULO II

ARREGLOS, PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

Hemos analizado algunas reglas generales de resolución de problemas combinatorios. Con su concurso se pueden resolver problemas de los tipos más variados. Sin embargo, al igual que en la geometría resulta engorroso reducir siempre la resolución de un problema a los axiomas, resultando más cómodo aplicar los teoremas. Así, en la combinatoria resulta más cómodo utilizar fórmulas ya listas, en lugar de resolver el problema por las reglas generales, puesto que algunos tipos de problemas se encuentran con mucha mayor frecuencia que otros. A las disposiciones que se encuentran en estos problemas se les han otorgado denominaciones especiales: arreglos, permutaciones y combinaciones.

Para el número de estas disposiciones han sido deducidas fórmulas especiales, las cuales son aplicadas a la resolución de distintos problemas combinatorios. Una de estas fórmulas ya nos es conocida: al principio del capítulo I fue demostrado que el número de k -arreglos con repetición de elementos de n tipos es igual a n^k . Ahora analizaremos cuántos arreglos se pueden formar si no se admiten repeticiones, es decir, si todos los elementos que figuran en el arreglo son diferentes. Abordemos, ante todo, el problema que sigue.

EL CAMPEONATO DE FUTBOL

En el primer grupo de la clase «A» del campeonato de la URSS de fútbol participan 17 equipos. Los premios son medallas de oro, de plata y de bronce. ¿De cuántas formas éstas pueden ser distribuidas?

Este problema se resuelve a base de la regla del producto. La medalla de oro puede ser obtenida por cualquiera de los 17 equipos. En otras palabras, aquí tenemos 17 posibilidades. Pero si ya fue otorgada la medalla de oro a algún equipo, quedan sólo 16 pretendientes a la medalla de plata. Aquí no puede haber repeticiones: un

mismo equipo no puede obtener las medallas de oro y de plata.

Esto significa que después de que un equipo obtenga las medallas de oro, quedarán 16 posibilidades de obtener las de plata. Análogamente, si ya fueron otorgadas las medallas de oro y las de plata, las de bronce pueden ser obtenidas sólo por uno de los 15 equipos restantes. Esto significa, en virtud de la regla del producto, que las medallas pueden ser distribuidas de $17 \cdot 16 \cdot 15 = 4080$ formas.

ARREGLOS SIN REPETICION

El problema resuelto pertenece a la clase de problemas combinatorios sobre arreglos sin repetición. El enunciado general de dichos problemas es como sigue:

Se tienen n objetos diferentes. ¿Cuántas k -distribuciones se pueden formar a partir de ellos? Aquí dos k -distribuciones se consideran diferentes, si se diferencian entre sí por lo menos en un elemento, o están formadas por los mismos elementos pero dispuestos en orden distinto.

Estas distribuciones se denominan *arreglos sin repetición*, y el número de ellas se denota mediante $A_n^{(k)}$. Al formar los k -arreglos sin repetición de n objetos, debemos efectuar k elecciones. En la primera etapa podemos escoger cualquiera de los n objetos disponibles. Si ya fue hecha esta elección, en la segunda etapa habrá que escoger entre los $n - 1$ objetos restantes, pues no se puede repetir la elección efectuada¹. De forma totalmente análoga, en la tercera etapa quedarán sólo $n - 2$ objetos libres para elegir, en la cuarta, $n - 3$ objetos . . . , en la k -ésima, $n - k + 1$ objetos. Por esto, en virtud de la regla del pro-

¹ También se utiliza la notación $A_{n,k}$. La notación rusa es A_n^k ; véase la nota al pie de la pág. 10. En algunos textos se emplea el término *variaciones* en lugar de *arreglos*. Entonces se utiliza la letra «V» en lugar de la «A» para denotar el número de éstos (N. del T.).

² Recordemos que a diferencia del caso de arreglos con repetición ahora tenemos tan sólo un elemento de cada tipo.

ducto, se obtiene que el número de k -arreglos sin repetición de n elementos se expresa como sigue:

$$A_k^n = n(n-1) \dots (n-k+1). \quad (1)$$

LA SOCIEDAD CIENTIFICA

Apliquemos la fórmula deducida a la resolución del problema siguiente: *Una sociedad científica está formada por 25 personas. Es necesario elegir al presidente de la sociedad, al vice-presidente, al secretario científico y al tesorero. ¿De cuántas formas se puede efectuar esta elección, si cada miembro de la sociedad puede ocupar sólo un cargo?*

En este caso, hay que hallar el número de arreglos (sin repetición) de 25 elementos tomados de a 4, puesto que aquí tiene importancia quién será elegido de dirigente de la sociedad y qué puestos ocuparán los escogidos (la elección «presidente Ivanov, vice Tatárinov, secretario Timoshenko, tesorero Alexéiev» se diferencia de la elección «presidente Timoshenko, vice presidente Ivanov, secretario Tatárinov y tesorero Alexéiev»). Por eso, la respuesta se expresa mediante la fórmula

$$A_4^{25} = 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 = 303\,600.$$

PERMUTACIONES

Al formar arreglos sin repetición de n elementos tomados de a k , obtuvimos distribuciones que se diferenciaban entre sí tanto en la composición como en el orden de los elementos. Pero si tomamos distribuciones en las que figuren todos los n elementos, éstas podrán diferenciarse entre sí solamente en el orden de los elementos que figuren en ellas. Tales distribuciones son llamadas *permutaciones de n elementos* o, más brevemente, *n -permutaciones*¹.

¹ El término « n -permutaciones», así como el « n -distribuciones», que se encuentra más abajo, no se utiliza en español, pero los hemos conservado en la traducción por ser más concisos que los términos españoles respectivos (N. del T.).

En otras palabras, se llaman n -permutaciones a los arreglos sin repetición de n elementos, en los cuales figuran todos los elementos. Se puede decir también que se llaman permutaciones de n elementos todas las n -distribuciones posibles, cada una de las cuales contienen todos estos elementos tomados una sola vez y que se diferencian entre sí sólo en el orden de los elementos. El número de n -permutaciones se denota mediante P_n . La fórmula para P_n se obtiene directamente de la fórmula que da el número de arreglos sin repetición. Más precisamente,

$$P_n = A_n^n = n(n-1) \dots 2 \cdot 1. \quad (2)$$

De este modo, para saber cuántas permutaciones se pueden formar de n elementos, hay que multiplicar todos los números naturales del 1 al n . Este producto se denomina $n!$ (se lee «factorial de n »). Así, pues,

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n.$$

Aquí se conviene que $1! = 1$.

En lo sucesivo encontraremos la notación $0!$. Parecería que $0!$ debe ser igual a cero. Sin embargo, se ha convenido considerar que $0! = 1$.

El hecho reside en que la factorial posee, evidentemente, la siguiente propiedad:

$$n! = n(n-1)!$$

Esta igualdad es válida para $n > 1$. Es natural definir $0!$ de forma que esta igualdad permanezca válida también para $n = 1$, es decir, de forma que sea $1! = 1 \cdot 0!$. Pero entonces hay que hacer $0! = 1$.

Obsérvese, además, que la fórmula (1) para el número de arreglos sin repetición se puede escribir de la siguiente manera:

$$A_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}. \quad (3)$$

En efecto, en el quebrado (3) todos los factores $1, 2, 3, \dots, n-k$ figuran tanto en el numerador como en el denominador. Después de sim-

plificar, obtenemos que $A_k^n = n(n-1) \dots (n-k+1)$, lo que corresponde a la fórmula (1).

PROBLEMA DE LAS TORRES

¿De cuántas formas se pueden colocar en el tablero de ajedrez 8 torres de modo que no se puedan comer una a la otra?

Está claro que en tal distribución en cada línea horizontal y en cada vertical habrá solamente una torre. Tomemos una de estas distribuciones y denotemos mediante a_1 el número de la casilla




Fig. 6.

ocupada en la primera fila horizontal, mediante a_2 , en la segunda, ..., mediante a_8 , en la octava. Entonces (a_1, a_2, \dots, a_8) será cierta permutación de los números 1, 2, ..., 8 (está claro que entre los números a_1, a_2, \dots, a_8 no hay dos iguales, puesto que de ser así dos torres quedarían en una misma vertical). Recíprocamente, si a_1, a_2, \dots, a_8 es alguna permutación de los números 1, 2, ..., 8, a ésta le corresponderá cierta distribución de las torres, en la cual no se podrán comer una a la otra. Por ejemplo, en la fig. 6 se representa la distribución de las torres que corresponde a la permutación

7 5 4 6 1 3 2 8. De esta manera, el número de distribuciones buscadas de las torres es igual al número de permutaciones de los números 1, 2, ..., 8, es decir, a P_8 . Pero

$$P_8 = 8! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 40\,320.$$

Esto significa que las torres se pueden ubicar de la forma requerida de 40 320 modos diferentes.

De manera totalmente análoga se demuestra que en un tablero de n hileras horizontales y n verticales se pueden ubicar de $n!$ formas n torres de modo que no se puedan comer una a la otra.

Obtendríamos una respuesta totalmente diferente si las torres se diferenciaban en algo entre sí: si tuviesen distinto color, o si estuviesen numeradas. En este caso, de cada distribución de las torres sin numerar se obtendrían $n!$ distribuciones de las numeradas: éstas se obtienen si, para las mismas casillas ocupadas, se cambian entre sí las n torres de todas las formas posibles. Por esto, obtendríamos $(n!)^2$ maneras de distribuciones en las que las torres no se podrían comer entre sí.

Se puede llegar a la misma deducción, aplicando directamente la regla del producto. La primera torre se puede ubicar en cualquiera de las n^2 casillas. Si se tacha la fila horizontal y la vertical, en las que quedó esta torre, quedará un tablero con $n-1$ hileras horizontales y $n-1$ verticales, con $(n-1)^2$ casillas. Esto significa que la segunda torre se puede ubicar de $(n-1)^2$ maneras. Análogamente la tercera torre se puede colocar de $(n-2)^2$ modos, etc. En total, obtenemos

$$n^2(n-1)^2 \dots 1^2 = (n!)^2$$

formas de distribución de las torres.

PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS

Los lingüistas, especialistas en idiomas vivos y muertos, deben adivinar con frecuencia escrituras hechas en idiomas desconocidos. Suponga-

mos que en sus manos cayó un texto escrito mediante 26 signos desconocidos. Estos símbolos son letras que representan uno de los 26 sonidos del idioma. *¿De cuántas maneras se pueden hacer corresponder los sonidos a los signos del idioma?*

Dispongamos los signos de la escritura en cierto orden. Entonces, cada modo de correspondencia nos dará cierta permutación de los sonidos. Pero de 26 sonidos se pueden formar $P_{26} = 26!$ permutaciones. Este número es aproximadamente igual a $4 \cdot 10^{26}$. Se sobreentiende que comprobar todas estas posibilidades es un trabajo no sólo superior a las fuerzas del hombre, sino a las de una computadora electrónica. Por esto, se trata de disminuir el número de posibilidades. Con frecuencia se logra separar los símbolos que denotan vocales de los que denotan consonantes (las vocales con mayor frecuencia se hallan al lado de las consonantes que las últimas entre sí, o las vocales una junto a la otra; observando qué combinaciones de símbolos se encuentran con mayor frecuencia, se pueden separar los signos de las vocales de los que corresponden a las consonantes). Supongamos que se pudo hallar 7 signos para las vocales y 19 para las consonantes. Calculemos en cuántas veces disminuyó el número de posibilidades. Los 7 signos para las vocales se pueden permutar entre sí de 7! formas, y los 19 para las consonantes, de 19! maneras. El número total de combinaciones es igual a $7! \cdot 19!$ Esto significa que el trabajo disminuyó en $26! / (7! \cdot 19!) \approx 650\,000$ veces. Está claro que ahora es más fácil, pero también $7! \cdot 19!$ es un número gigantesco.

Después de esto, se calcula la frecuencia de aparición de cada signo por separado. Comparando esta frecuencia con la frecuencia de aparición de letras en idiomas próximos al analizado, se puede acertar aproximadamente el significado de algunos signos. Otros signos se pueden hallar comparando el texto en cuestión con el mismo texto en otro idioma (los monarcas antiguos

solían informar sobre sus «hazañas» en varios idiomas).

Supongamos que, como resultado de este trabajo, se han identificado 4 vocales y 13 consonantes. ¿Cuántas posibilidades quedan aún? Está claro que $3! \cdot 6! = 4320$. Este número de combinaciones ya puede ser verificado, utilizando las computadoras electrónicas.

Con dificultades análogas se encuentran los criptólogos, o especialistas en el descifrado de códigos.

LA RONDA

Siete muchachas forman una ronda. De cuántas maneras distintas se pueden colocar en círculo?

Si estuviesen paradas sin moverse, se obtendrían $7! = 5040$ permutaciones. Pero, como las niñas giran, su posición con respecto a los




Fig. 7.

objetos que los rodean no interesa, e influye sólo su disposición relativa. Por esto, las permutaciones que se transforman una en la otra al girar las personas deben considerarse iguales. Pero de cada permutación se pueden obtener otras seis mediante el giro. Por lo tanto, el número 5040 debe dividirse entre 7. Obtenemos $5040 : 7 = 720$ permutaciones diferentes de niñas en la ronda.

En general, si se examinan las permutaciones de n objetos, ubicados no en fila, sino en cir-

conferencia, y se consideran iguales las distribuciones que se transforman una en la otra mediante un giro, el número de permutaciones diferentes es igual a $(n - 1)!$

Calculemos ahora cuántos collares se pueden confeccionar con 7 cuentas diferentes. Por analogía con el problema que acabamos de resolver, se podría pensar que el número de collares diferentes es igual a 720. Pero el collar no solamente se puede girar en redondo, sino también rebatir (fig. 7). Por esto, la respuesta de este problema es $720 : 2 = 360$.

PERMUTACIONES CON REPETICION

Hasta ahora hemos permutado objetos que eran diferentes por pares entre sí. Si, en cambio, algunos de los objetos permutados son iguales, se obtendrán menos permutaciones: algunas de ellas serán iguales entre sí. Por ejemplo, permutando las letras de la palabra «mano», obtenemos 24 permutaciones diferentes:

mano	namo	mona	noma
maon	moan	naom	noam
mnao	nmao	nmoa	nomoa
onam	oman	amon	anom
oamn	aoam	oamn	oamn
anmo	anmo	onma	onma

Y si en lugar de la palabra «mano» tomamos la palabra «mama», en todas las permutaciones escritas habrá que sustituir la «n» por la «m» y la «o» por la «a». En este caso, algunas de nuestras 24 permutaciones resultarán iguales. Por ejemplo, las permutaciones mano, namo, mona, noma de la primera fila nos darán, al efectuar dicha sustitución, la misma palabra «mama». Análogamente, las cuatro permutaciones de la segunda fila darán la palabra «maam». En general, todas las 24 permutaciones se dividen en cuaternas, las que, al sustituir la «n» por la «m» y la «o» por la «a» nos darán el mismo resultado. En la tabla, estas permutaciones se hallan

en una misma fila. Por esto, el número de permutaciones distintas que se pueden escribir de la palabra «mama» es igual a $24 : 4 = 6$. Helas aquí:

mama, maam, mmaa, amam, aamm, amma.

El problema general se enuncia como sigue:
Se tienen objetos de k tipos diferentes. ¿Cuántas permutaciones se pueden hacer tomando n_1 elementos del primer tipo, n_2 del segundo, . . . , n_k del k -ésimo tipo?

El número de elementos en cada permutación es igual a $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. Por esto, si todos los elementos fuesen diferentes, el número de permutaciones sería igual a $n!$. Pero, a causa de que algunos elementos coinciden, se obtendrá un número menor. En efecto, tomemos, por ejemplo, la permutación

$$\underbrace{aa \dots a}_{n_1} \underbrace{bb \dots b}_{n_2} \dots \underbrace{xx \dots x}_{n_k} \quad (4)$$

en la cual se han escrito primeramente todos los elementos del primer tipo, después, todos los del segundo, . . . , por último, todos los del k -ésimo. Los elementos del primer tipo pueden ser permutados entre sí de $n_1!$ formas. Pero, como todos estos elementos son iguales, estas permutaciones no cambiarán nada. De forma totalmente análoga, no cambian nada las $n_2!$ permutaciones de los elementos del segundo tipo, . . . , las $n_k!$ permutaciones de los del k -ésimo tipo. Por ejemplo, en la permutación «mmaa» no cambiará nada si permutamos el primer elemento con el segundo, o el tercero con el cuarto.

Las permutaciones de los elementos del primer tipo, del segundo, etc. se pueden efectuar en forma independiente entre sí. Por esto (en virtud de la regla del producto), los elementos de la permutación (4) se pueden intercambiar entre sí de $n_1!n_2! \dots n_k!$ maneras de modo que esta permutación permanezca invariable. Esto mismo es válido para cualquier otra distribu-

ción de los elementos. Por esto, el conjunto de todas las $n!$ permutaciones se separa en partes formadas por $n_1!n_2! \dots n_k!$ permutaciones iguales cada una. Por consiguiente, el número de permutaciones con repetición diferentes que se pueden escribir a partir de los elementos dados es igual a

$$P(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}, \quad (5)$$

siendo, recordemos una vez más, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Aplicando la fórmula (5) resulta fácil responder a la pregunta: ¿cuántas permutaciones se pueden hacer de las letras de la palabra «Mississippi»? Tenemos aquí una letra «m», cuatro «i», tres «s» y una «p», habiendo en total 9 letras. Esto significa, de acuerdo con la fórmula (5), que el número de permutaciones es igual a

$$P(4, 3, 1, 1) = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 2\,520.$$

LOS ANAGRAMAS

Hasta el siglo XVII no existían casi revistas científicas. Los hombres de ciencia se enteraban de los trabajos de sus colegas o bien de los libros, o bien de las cartas particulares. Esto creaba grandes dificultades en la publicación de los resultados originales: la impresión de los libros llevaba años enteros, y escribir en una carta privada sobre un descubrimiento era arriesgado: de pronto alguien se apropia del trabajo y luego jécómo demostrar que no lo hizo él, sino que se enteró por medio de la carta recibida! También pudo suceder que el que recibió la carta pensó mucho tiempo sobre el mismo problema, halló su solución y la carta no le dio nada nuevo, y él a su vez quería escribirle a su colega una información análoga.

A causa de esto, con frecuencia surgían disputas sobre la prioridad de los descubrimientos. Aún

a fines del siglo XVII había largas discusiones sobre la prioridad entre Newton y Leibnitz (sobre quién descubrió primero los cálculos diferencial e integral), entre Newton y Hooke (quién enunció primero la ley de gravitación universal), etc.

En la antigüedad, Arquímedes inclusive tuvo que recurrir a una artimaña. Cuando algunos científicos de Alejandría se apropiaron de sus resultados, de los que se enteraron por cartas que recibieron de éste, él les escribió otra carta. En ella había fórmulas de extraordinaria importancia para las superficies y volúmenes de algunas figuras. Los alejandrinos expresaron nuevamente que estas fórmulas ya las conocían hace mucho, y que Arquímedes no les informó de nada nuevo. Pero aquí se aclaró que Arquímedes los agarró en la trampa: las fórmulas que contenía la carta eran incorrectas! Para asegurarse la prioridad y no admitir la difusión prematura de los resultados obtenidos, los científicos enunciaban en una frase corta la esencia del descubrimiento, después permutaban las letras de ésta y enviaban la carta con las letras intercambiadas a sus colegas. Estos textos se denominan *anagramas*. Por ejemplo, las palabras «luna» y «mula» son anagramas. Cuando se imprimía el libro con la exposición detallada del resultado, en éste se daba el descifrado del anagrama. Estos eran utilizados también en las discusiones políticas. Por ejemplo, después del asesinato del rey francés Henri III, del nombre de su asesino, frère Jacques Clément (el hermano Jacques Clément), confeccionaron el anagrama «C'est l'enfer qui m'a créé» (me ha creado el infierno). Los enemigos del rey no se quedaron atrás, y de su nombre Henri de Valois crearon el anagrama Vilain Herodés (el villano Herodes). Cuando Christian Huygens (1629—1695) descubrió el anillo de Saturno, formó el anagrama *aaaaaa, ccccc, d, eeeee, g, h, iiiiii, ll, mm, nnnnnnnn, oooo, pp, q, rr, s, tttt, uuuuu*. Si se colocan aquí las letras en el orden necesario, se obtiene el texto

«Annulo cingitur tenui, plano, nusquam coherente, ad eclipticam inclinato».

(«Está rodeado por un anillo tenue, plano, no adherido en ninguna parte, inclinado hacia la eclíptica».)

Sin embargo, no siempre los anagramas permitían conservar el misterio. Cuando el mismo Huygens descubrió el primer satélite de Saturno (Titano) y halló que el período de su rotación alrededor del planeta era igual a 15 días, formó a raíz de esto un anagrama y lo envió a sus colegas. Sin embargo, uno de ellos, Wallis, experto maestro en el descifrado de escrituras secretas, adivinó este anagrama y formó a su vez el suyo, que envió a Huygens. Cuando los científicos se intercambiaron los descifrados de los anagramas, resultó ser como si Wallis hubiese hecho el mismo descubrimiento antes que Huygens. Luego Wallis reconoció que había hecho una broma, con el fin de demostrar la inutilidad de los anagramas en lo que se refiere a la escritura secreta. Sin embargo, Huygens no supo interpretar la broma y se enojó...

Calculemos cuántas permutaciones habría que hacer para hallar el verdadero significado del primer anagrama de Huygens. En éste figuran 7 letras *a, 5c, 1d, 5e, 1g, 1h, 7i, 3l, 2m, 9n, 4o, 2p, 1q, 2r, 1s, 5t* y 5 letras *u*, habiendo en total 61 letras. En virtud de la fórmula (5) obtenemos entonces

61!

7! 5! 1! 5! 1! 1! 1! 7! 3! 2! 9! 4! 2! 1! 2! 1! 5! 5! 1!

permutaciones. Este enorme número es aproximadamente igual a 10^{90} .

El problema de escribir todas estas permutaciones lo llevaría a una computadora electrónica, que efectúe un millón de operaciones por segundo, más tiempo que todo el que lleva de existencia el Sistema Solar.

En cierto sentido al hombre le es más fácil resolver este problema que a la máquina, puesto que el hombre tomará no todas las permutaciones, sino sólo aquellas en que se obtengan palabras

con sentido, tomará en consideración las reglas morfológicas, etc. Esto reduce mucho el número de pruebas necesarias. Y, lo que es más importante, éste sabe aproximadamente qué problemas ocupaban a su correspondiente. Pero, de todas formas, resulta un trabajo muy engorroso.

COMBINACIONES

No siempre nos interesa el orden en que se distribuyen los elementos. Por ejemplo, si en la semifinal del campeonato de la URSS de ajedrez participan 20 personas, y a la final llegan sólo tres, el orden dentro del trío no interesa: aunque sea tercero, con tal de quedar para la final! Se han dado casos en que el campeón de la URSS resultaba ser un ajedrecista que no ocupaba en la semifinal el lugar más alto.

De igual manera, en el campeonato de la URSS de fútbol la liga superior, formada por 17 equipos, debe ser abandonada por los equipos que ocuparon los últimos cuatro lugares. Y es un débil consuelo el saber que el equipo ocupó el lugar 14, y no el 17: de todas formas deberá pasar al segundo plano.

En los casos en que no nos interesa el orden de los elementos en la distribución, sino solamente su composición, se dice que se trata de una combinación. De este modo, se llaman *k-combinaciones de n elementos*¹ las *k-distribuciones* posibles, formadas a partir de estos elementos y que se diferencian entre sí por la composición de los elementos, pero no por su orden. El número de *k-combinaciones* que se pueden formar a partir de *n* elementos se denota mediante C_n^k ².

La fórmula del número de combinaciones se obtiene fácilmente de la que dedujimos antes para el número de arreglos. En efecto, formemos

¹ En español se utiliza la expresión «combinaciones de n elementos tomados de a k», véase la nota de la pág. 10 (N. del T.).

² Se utiliza también el símbolo $\binom{n}{k}$. La notación rusa es C_n^k (véase la nota de la pág. 10) (N. del T.).



primeramente todas las k -combinaciones de n elementos, e intercambiamos luego los elementos que figuran en cada combinación de todas las maneras posibles. Obtendremos entonces todos los k -arreglos de n elementos, tomado cada uno una sola vez. Pero de cada k -combinación se pueden efectuar $k!$ permutaciones, y el número de estas combinaciones es igual a C_k^n . Por consiguiente, tiene lugar la fórmula

$$k! C_k^n = A_k^n.$$

De esta fórmula se halla que

$$C_k^n = \frac{A_k^n}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! k!}. \quad (6)$$

Es interesante observar que la fórmula que acabamos de deducir coincide con la que da el número de permutaciones de k elementos de un tipo y $n-k$ de otro:

$$P(k, n-k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

En otras palabras,

$$C_k^n = P(k, n-k). \quad (7)$$

Esta igualdad se puede demostrar también directamente, sin recurrir a la fórmula del número de arreglos. Para esto, escribamos en orden todos los n elementos, a partir de los cuales se forman las combinaciones, y cifremos cada combinación mediante un n -arreglo de ceros y unidades. Más precisamente, si algún elemento figura en la combinación, en su lugar escribiremos 1; si éste no figura, escribiremos 0. Por ejemplo, si se forman las combinaciones de las letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, a la combinación a, c, f, h, i le corresponderá la distribución 1010010110, a y la distribución 01110001001, la combinación b, c, d, g, j. Está claro que a cada k -combinación le corresponderá una distribución de k unidades y $n-k$ ceros, y a cada distribución de este tipo le corresponderá cierta k -combinación; además, a distintas distribuciones corresponderán distintas k -combinaciones. De aquí, precisamente, se deduce que el número de k -combinaciones de n elementos coincide con el de permutaciones de k elementos de un tipo (unidades) y $n-k$ de otro (ceros).

Aplicando la fórmula (6), es fácil resolver los problemas a que hicimos referencia al principio de este apartado. El número de resultados diferentes de la semifinal del campeonato de ajedrez se expresa por la fórmula

$$C_8^{20} = \frac{20!}{3!17!} = 1140.$$

El número de distintas posibilidades "tristes" del campeonato de fútbol es igual a

$$C_4^7 = \frac{7!}{4!3!} = 2380.$$

Aquí tenemos otro problema sobre combinaciones:

¿De cuántas formas se pueden colocar en el tablero de ajedrez 8 torres? A diferencia del problema estudiado en la pág. 25, aquí no se impone la condición de que las torres no puedan comerse unas a otras. Por esto, simplemente debemos escoger 8 casillas cualesquiera de las 64 del

tablero de ajedrez. Esto se puede hacer de

$$C_{81}^{64} = \frac{64!}{81 \cdot 56!} = 4\,328\,284\,968$$

formas distintas.

En forma totalmente análoga se demuestra que en un tablero con m líneas horizontales y n verticales se pueden colocar k torres de

$$C_k^{mn} = \frac{(mn)!}{k!(mn-k)!}$$

maneras.

Si colocamos, en cambio, no k torres iguales sino k figuras diferentes, tendrá también importancia qué figura ha sido colocada en cuál casilla. Por esto, aquí no obtenemos combinaciones, sino arreglos, y la respuesta se expresa por la fórmula

$$A_k^{mn} = \frac{(mn)!}{(mn-k)!}$$

LA LOTERÍA GENOVESA

En los siglos pasados gozaba de gran popularidad la llamada *lotería genovesa*, que se conservó hasta ahora en algunos países. Su esencia consistía en lo siguiente. Los participantes de la lotería compraban billetes, en los que había números del 1 al 90. Se podían comprar también billetes en los que había directamente dos, tres, cuatro o cinco cifras. En el día del sorteo de la lotería, de una bolsa que contenía fichas con los números del 1 al 90 se extraían cinco fichas. Ganaban aquellos en cuyos billetes todos los números se hallaban entre los que habían sido extraídos¹. Por ejemplo, si en el billete había los números 8, 21, 49, y habían sido extraídos los números 3, 8, 21, 37, 49, el billete ganaba; si, en cambio, habían sido extraídos, por ejemplo, los números 3, 7, 21, 49, 63, el billete perdía,

¹ Una variante de esta lotería es la lotería de salón, con cartones: aquí hay también bolillas con los números del 1 al 90. En los cartones de los jugadores hay 3 filas de 5 números cada una. Cuando se completan 4 números se dice, precisamente, que se tiene una «cuaterna».



puesto que el 8 no se hallaba entre los números extraídos.

Si el participante de la lotería compraba un billete con un solo número, obtenía, si ganaba, una suma 15 veces mayor que el costo del billete; si éste tenía dos números (ambo), la suma era 270 veces mayor; si tenía tres (terna), 5500 veces; si tenía cuatro (cuaterna), 75 000 veces, y si tenía cinco números (quina), 1 000 000 de veces mayor que el costo del billete.

Muchos probaban enriquecerse participando en esta lotería y apostando, en cada sorteo, a una terna o un ambo. Pero casi nadie logró conseguirlo: la lotería estaba calculada de forma que ganasen sus organizadores².

Para comprender las causas de esto, tratemos de calcular la razón entre el número de casos «afortunados» de la lotería y el número total de casos en las distintas formas de juego. El número

² Las emociones de los participantes de esta lotería han sido descritas con gran brillantez por la escritora italiana Matilde Serao en la novela «El sorteo de la lotería».

total de casos de la lotería se halla directamente mediante la fórmula (6). De la bolsa con 90 fichas se extraen 5, sin que el orden tenga importancia alguna. Se obtienen combinaciones de 90 elementos tomados de a 5, el número de las cuales es igual a

$$C_5^{90} = \frac{90!}{5!85!} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}.$$

Supongamos ahora que el participante de la lotería compró un billete con un solo número. ¿En cuántos casos ganará? Para ganar es necesario que uno de los números extraídos coincida con el que se halla en el billete. Los otros 4 pueden ser arbitrarios. Pero estos cuatro números se escogen entre los 89 restantes. Por esto, el número de combinaciones propicias se expresa por la fórmula

$$C_4^{89} = \frac{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}.$$

De aquí se desprende que el cociente entre el número de combinaciones propicias y el número total de éstas es igual a

$$\frac{C_4^{89}}{C_5^{90}} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}.$$

Esto significa, aproximadamente, que el jugador ganará una vez cada dieciocho. En otras palabras, pagara por 18 billetes y ganará sólo 15 veces más que el costo de uno de ellos: el costo de tres billetes quedará en el bolsillo de los organizadores de la lotería.

Se sobreentiende que no se debe considerar que de cada 18 veces el jugador ganará exactamente una vez. A veces, entre dos casos de ganancia pasan 20 ó 30 sorteos; a veces se logra ganar en dos y en tres sorteos consecutivos. Aquí se trata del número medio de ganancias en un intervalo grande de tiempo, o para un gran número de participantes. De otro modo, se puede incurrir en el error que se adjudica a cierto médico. Este dijo a su paciente: «Tiene Ud. una enfermedad de la cual sana 1 entre 10. Pero los 9 enfermos pre-

cedentes que he tratado de esta enfermedad se han muerto. [Ud. se curará sin falta!].

Calculemos ahora las probabilidades de ganar en un ambo. Aquí ya es necesario que los dos números apostados figuren entre los que se han extraído de la bolsa; los tres números restantes pueden ser cualesquiera. Como se los puede escoger entre los 88 que quedan, el número de casos «afortunados» en el juego del ambo se expresa mediante la fórmula

$$C_3^{88} = \frac{88 \cdot 87 \cdot 86}{1 \cdot 2 \cdot 3}.$$

La razón entre el número de dichos casos y el número total de éstos es de

$$\frac{C_3^{88}}{C_5^{90}} = \frac{4 \cdot 5}{90 \cdot 89} = \frac{2}{801}.$$

Aquí ya de 801 casos sólo dos conducen al éxito. Pero como la ganancia es sólo 270 veces mayor que el costo del billete, de cada 801 de billetes de «ambo» el precio de 261 quedará en los bolsillos de los organizadores de la lotería. Está claro que el juego al ambo es aún menos ventajoso a los participantes que el juego a un número simple.

Resultan totalmente desventajosos los juegos a la terna, cuaterna y quinta. En el juego a la terna la razón entre el número de casos propicios y el número total de éstos es igual a

$$\frac{C_3^{87}}{C_5^{90}} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{90 \cdot 89 \cdot 88} = \frac{1}{11748};$$

en el juego a la cuaterna es de

$$\frac{C_4^{86}}{C_5^{90}} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{511038},$$

y en el juego a la quinta, de

$$\frac{1}{C_5^{90}} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86} = \frac{1}{43949268}.$$

En cambio, a los que ganan pagan solamente 5500, 75 000 y 1 000 000 de veces más. El lector puede calcular por sí mismo cuáles son las pérdidas de los participantes de la lotería bajo estas condiciones.

LA COMPRA DE LOS PASTELES

En una confitería se vendían 4 tipos de pasteles: de crema, cañones, polvorones y hojaldrados. ¿De cuántas maneras se pueden comprar 7 masas?

Este problema tiene otra forma que los ya resueltos. No es un problema sobre arreglos con repetición, ya que el orden en que se colocan los pasteles en la caja es indiferente. Por esto, se halla más próximo a los problemas de combinaciones. Pero se diferencia a su vez de éstos en que en las disposiciones pueden figurar elementos repetidos (por ejemplo, se pueden comprar 7 cañones). Estos problemas se llaman problemas sobre combinaciones con repetición.

Para resolver nuestro problema procederemos del siguiente modo. Cifremos cada compra mediante ceros y unidades. Más precisamente, escribamos primeramente tantas unidades cuantos pasteles de crema han sido comprados. Después, para separar los pasteles de crema de los cañones, escribamos un cero, y después tantas unidades cuantos cañones se han adquirido. Luego escribimos nuevamente un cero (si no se ha comprado ningún cañón, en la escritura habrá dos ceros seguidos). Escribamos ahora tantas unidades cuantos polvorones fueron comprados, después nuevamente un cero y, por último, tantas unidades cuantos pasteles de hojaldre se compraron. Por ejemplo, si se han adquirido 3 pasteles de crema, 1 cañón, 2 polvorones y 1 pastel de hojaldre, obtenemos la siguiente escritura: 1110104101. Si, en cambio, fueron comprados 2 pasteles de crema y 5 polvorones, se obtiene la escritura 1100111110. Está claro que a distintas compras les corresponden diferentes disposiciones de 7 unidades y 3 ceros. Recíprocamente, a cada disposición de 7 unidades y 3 ceros le corresponde alguna compra. Por ejemplo, a la disposición 0111041110 le corresponde la compra de 3 cañones y 4 polvorones.

Afís, pues, el número de compras diferentes es igual al de permutaciones con repetición que pueden ser formadas de 7 unidades y 3 ceros.

Este número, como fue demostrado en la pág. 28, es igual a

$$P(7, 3) = \frac{10!}{7!3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 4} = 120.$$

Podríamos haber llegado al mismo resultado también por otro camino, a saber: dispongamos en cada compra los pasteles en el orden siguiente: pasteles de crema, cañones, polvorones y de hojaldre, y después numerémoslos. Pero al efectuar esto, agregaremos 1 a los números de los cañones, 2 a los de los polvorones, y 3 a los de los pasteles hojaldrados (a los números de los de crema no agregaremos nada). Por ejemplo, suponemos que se han comprado 2 pasteles de crema, 3 cañones, 1 polvorón y 1 pastel de hojaldre. Entonces estos pasteles se numerarán así: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Está claro que el mayor número será aquí igual a 10 (el último pastel hojaldrado obtiene el número $7 + 3 = 10$), y el menor, a 1 (éste es el que obtiene el primer pastel de crema). Aquí no se repite ningún número. Recíprocamente, a cada sucesión creciente de 7 números del 1 al 10 le corresponde cierta compra. Por ejemplo, a la sucesión 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 le corresponde la compra de 4 cañones y 3 polvorones. Para convencerse de esto, hay que restar de los números dados los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obtendremos los números 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, es decir, 4 unidades y 3 «dores». Pero 1 era el número que sumábamos a los de los cañones, y 2, a los de los polvorones. Por consiguiente, tenemos 4 cañones y 3 polvorones.

Obtenemos, en nuestro caso, sólo sucesiones crecientes de números y, por lo tanto, cada sucesión queda totalmente determinada por sus integrantes. Por esto, el número de estas sucesiones de 7 términos es igual al de 7-combinaciones de 10 números (del 1 al 10). Dicho número se expresa por la fórmula

$$C_7^{10} = \frac{10!}{7!13!} = 120.$$

Hemos obtenido el mismo resultado.

COMBINACIONES CON REPETICION

Ya hemos expresado que el problema analizado pertenece al tipo de problemas sobre combinaciones con repetición. El enunciado general de estos problemas es como sigue: se tienen objetos de n tipos diferentes. ¿Cuántas k -disposiciones se pueden formar a partir de éstos, si no se tiene en cuenta el orden de los elementos en la disposición (en otras palabras, distintas disposiciones deben diferenciarse por lo menos en un objeto)?

Este problema se resuelve, en caso general, de forma exactamente igual a la que lo hicimos para el problema de los pasteles. Es decir, hay que cifrar cada disposición mediante ceros y unidades: escribir para cada tipo tantas unidades como objetos de este tipo figuren en la disposición, y separar los distintos tipos unos de otros mediante ceros (aquí, si los objetos de algún tipo no figuran en la disposición, hay que escribir cero o más ceros seguidos). Obtendremos así tantas unidades cuantos objetos figuren en la disposición, es decir k . El número de ceros será una unidad menor que el de tipos de objetos, es decir, $n - 1$. De esta forma, obtenemos permutaciones con repetición de k unidades y $n - 1$ ceros. A distintas disposiciones les corresponderán distintas permutaciones con repetición, y a cada una de estas últimas le corresponderá su disposición. Así, pues, el número C_h^n de k -combinaciones con repetición de elementos de n tipos¹ es igual al número $P(k, n - 1)$ de permutaciones con repetición de $n - 1$ ceros y k unidades. Pero

$$P(k, n - 1) = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!}.$$

Por esto,

$$\bar{C}_h^n = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!} = C_h^{n+k-1}.$$

¹ Se utilizan también las notaciones $(CR)_h^n$ y $C_{n,h}$. En español se dice «combinaciones con repetición de n elementos tomados de h en h », o bien «tomados de n en h ». Véase la nota al pie de la pág. 10 (N. del T.).

Esta misma fórmula se puede demostrar también de otro modo. En cada combinación debemos distribuir los elementos según los tipos (primero todos los del primer tipo, después los del segundo, etc.). Luego, hay que numerar todos los elementos de la combinación, pero a los números de los del segundo tipo debe agregarse 1, a los del tercero, 2, etc. Entonces, de cada combinación con repetición se obtiene otra, sin repetición, formada por los números 1, 2, ..., $n + k - 1$, habiendo k elementos en cada combinación. De aquí se deduce, nuevamente, que

$$\bar{C}_h^n = C_h^{n+k-1} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}. \quad (8)$$

Hay problemas en los cuales a las combinaciones con repetición se impone una condición complementaria: en éstas deben forzosamente figurar elementos de r tipos prefijados, siendo $r \leq n$. Estos problemas se reducen fácilmente al que acabamos de resolver. Para asegurar la presencia de elementos de los r tipos dados, tomemos desde el primer momento un elemento de cada uno de estos tipos. Así quedarán ocupados r lugares en la k -combinación. Los $k - r$ lugares restantes pueden ser llenados por elementos cualesquiera, pertenecientes, por hipótesis, a n tipos. Por esto, habrá tantas disposiciones del tipo buscado como combinaciones con repetición de elementos de n tipos, con $k - r$ elementos cada una,

$$\bar{C}_{h-r}^n = C_{h-r}^{n+k-r-1}.$$

En particular, si $n \leq k$ y se exige que en la k -combinación con repetición figure por lo menos un elemento de cada uno de los n tipos, se obtienen C_{h-n}^{k-1} disposiciones.

DE NUEVO EL CAMPEONATO DE FUTBOL

Hemos analizado problemas sobre arreglos, permutaciones y combinaciones. En muchos casos hay que vérselas con disposiciones de diferentes tipos. Consideremos el siguiente problema:

Llamemos a dos variantes del resultado del campeonato de la URSS de fútbol *coincidentes en lo fundamental*, si en estos resultados coinciden los poseedores de las medallas de oro, de plata y de bronce, así como también los cuatro equipos que abandonan la liga superior. *Hallar el número de resultados, no coincidentes en lo fundamental, del campeonato* (igual que antes, consideramos que en el campeonato participan 17 equipos).

Ya sabemos que las medallas se pueden distribuir de $A_3^{17} = 17 \cdot 16 \cdot 15$ formas (véase la pág. 23). Después de esto, quedan 14 equipos, de los cuales 4 deben abandonar la liga superior. Como aquí ya no tiene importancia el orden de los equipos que abandonan, esto puede tener lugar de $C_4^{14} = \frac{14!}{4! 10!}$ maneras. Según la regla del producto, obtenemos que el número de resultados, coincidentes en lo fundamental, del campeonato, es igual a

$$A_3^{17} \cdot C_4^{14} = 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot \frac{14!}{4! 10!} = \frac{17!}{4! 10!} = 4\,084\,080.$$

A este mismo resultado se puede llegar por otro camino. El número total de distintos resultados del campeonato (sin tener en cuenta los casos en que tiene lugar el reparto de unos u otros lugares) es igual a $P_{17} = 17!$. Pero las permutaciones de los equipos que ocuparon los lugares desde el 4º al 13º, así como también las de los que ocuparon los lugares desde el 14º hasta el 17º, conducen a resultados del campeonato que coinciden en lo fundamental. El número de estas permutaciones es igual a $10! \cdot 4!$. Por lo tanto, el número de resultados diferentes se expresa por la fórmula $\frac{17!}{10! 4!}$.

Supongamos que se quiere transmitir el resultado del campeonato mediante un telegrama formado por k puntos y rayas. ¿Cuál es el menor número de símbolos necesarios para hacerlo? Ya sabemos que de k puntos y rayas se pueden formar 2^k distribuciones diferentes. Por esto, el menor número de símbolos que hacen posible la transmisión de la información requerida debe ser

tal que se cumpla la desigualdad $2^k \geq 4\,084\,080$.

Resolviéndola, obtenemos que $k \geq 22$. Así, pues, para transmitir los resultados del campeonato mediante puntos y rayas, es necesario utilizar no menos de 22 símbolos.

Se sobreentiende que estos cálculos no se utilizan para transmitir los resultados de los campeonatos. Pero es fácil imaginarse un caso en que la transmisión de la información esté acompañada de grandes dificultades técnicas (por ejemplo, al transmitir una fotografía desde una nave cósmica) y en que cada signo valga «su peso en oro». Entonces hay que considerar las diferentes posibilidades de esta transmisión y escoger las más económicas. Estos problemas son estudiados en la disciplina matemática denominada *teoría de la información*.

PROPIEDADES DE LAS COMBINACIONES¹

Los números C_n^k poseen toda una serie de propiedades notables. Estas pueden ser demostradas de diferentes maneras. En algunos casos lo más cómodo es aplicar directamente la fórmula

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (9)$$

Sin embargo, con frecuencia se logra obtener la demostración a partir de consideraciones combinatorias: se calcula el número de distribuciones de un tipo dado y se dividen éstas en clases que no posean elementos comunes. Después, se halla cuántas distribuciones figuran en cada clase. Sumando los números obtenidos, obtenemos nuevamente el número de todas las distribuciones

¹ El resto del capítulo puede ser omitido en una primera lectura. Sin embargo, las igualdades $C_n^k = C_n^{n-k}$ y $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ se encontrarán con frecuencia en lo sucesivo.

del tipo estudiado. Esto nos da, precisamente, la relación buscada.

Comencemos por la fórmula más sencilla:

$$C_h^n = C_{n-h}^n. \quad (10)$$

Esta se desprende directamente de la (9). Si sustituimos en esta última k por $n - k$, a su vez $n - k$ se sustituirá por $n - (n - k) = k$; como resultado, los factores del denominador se intercambian de lugar. Pero la igualdad (10) es fácil de demostrar también sin recurrir a la expresión explícita del número de combinaciones. Si se escoge alguna k -combinación de n elementos diferentes, nos quedará una combinación complementaria de $n - k$ elementos, siendo a su vez la k -combinación inicial complementaria de la $(n - k)$ -combinación obtenida. De esta manera, las k -combinaciones y las $(n - k)$ -combinaciones forman pares mutuamente complementarios y, por ello, el número de estas combinaciones es el mismo. Esto significa que $C_k^n = C_{n-k}^n$.

Casi con la misma sencillez se demuestra la relación

$$C_h^n = C_{h-1}^{n-1} + C_h^{n-1}. \quad (11)$$

Para esto, formemos k -combinaciones de los n elementos a_1, \dots, a_{n-1}, a_n y dividámoslas en dos clases. En la primera figurarán las combinaciones que contengan al elemento a_n ; en la segunda, las que no lo contengan. Si eliminamos el elemento a_n de cualquiera de las combinaciones de la primera clase, nos quedará una $(k - 1)$ -combinación, formada por los elementos a_1, \dots, a_{n-1} . El número de éstas es igual a C_{k-1}^{n-1} . Por esto, en la primera clase habrá C_{k-1}^{n-1} distribuciones. Las combinaciones de la segunda clase son k -combinaciones formadas por los $(n - 1)$ elementos a_1, \dots, a_{n-1} . Por esto, su número es igual a C_k^{n-1} . Por cuanto cualquier k -combinación formada a partir de los elementos a_1, \dots, a_n pertenece a una clase, y sólo a una, y el número total de estas combinaciones es igual a C_k^n , obtenemos la igualdad (11).

En forma similar se demuestra la relación

$$C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n = 2^n. \quad (12)$$

Para esto, recordemos que 2^n es el número de todos los n -arreglos con repetición formados por elementos de dos tipos. Dividamos estos arreglos en clases, haciendo pertenecer a la clase k -ésima aquellos en los que figuran k elementos del primer tipo y $n - k$ del segundo. Los arreglos de la k -ésima clase son ni más ni menos que las permutaciones posibles formadas por k elementos del primer tipo y $n - k$ del segundo. Ya sabemos que el número de tales permutaciones es igual a $P(k, n - k)$, siendo, además, $P(k, n - k) = C_k^n$ (véanse las págs. 28 y 30). Por consiguiente, el número total de arreglos de todas las clases es igual a $C_0^n + C_1^n + \dots + C_n^n$. Por otro lado, este mismo número es igual a 2^n . Con esto queda demostrada la relación. (12).

En forma totalmente análoga se demuestra que

$$\sum_{n_1+n_2+n_3=n} P(n_1, n_2, n_3) = 3^n, \quad (13)$$

donde la suma se toma por todas las particiones del número n en tres sumandos (teniendo en cuenta también el orden de los sumandos, es decir, en la suma figuran, por ejemplo, los términos $P(n_1, n_2, n_3)$ y $P(n_2, n_3, n_1)$). Para demostrarlo, debemos considerar todos los n -arreglos formados por elementos de tres tipos y separarlos en clases de una misma composición (es decir, tomar arreglos con un mismo número de elementos del primer tipo, del segundo y del tercero).

En general, tiene lugar la igualdad

$$\sum_{n_1+\dots+n_k=n} P(n_1, \dots, n_k) = k^n, \quad (14)$$

donde la suma se toma por todas las particiones del número n en k sumandos (teniendo en cuenta el orden de éstos).

Consideremos ahora las m -combinaciones con repetición formadas por elementos de $n+1$ tipos, por ejemplo, por las $n+1$ letras a, b, c, \dots, x . El número de estas combinaciones es igual a $C_{n+1}^{m+1} = C_m^{n+m}$. Dividamos todas estas combinaciones en clases, haciendo pertenecer a la clase k -ésima las combinaciones en las que la letra a figura k veces. Los $m-k$ lugares restantes estarán ocupados por las letras que quedan: b, c, \dots, x , cuyo número es igual a n . Por esto, en la clase k -ésima habrá tantas combinaciones cuantas $(m-k)$ -combinaciones con repetición se pueden formar a partir de elementos de n tipos, es decir, $C_{m-k}^{n+m-k-1}$. En consecuencia, el número total de todas las combinaciones es igual a

$$C_m^{n+m-1} + C_{m-1}^{n+m-2} + \dots + C_1^n + C_0^{n-1}.$$

Por otro lado, hemos visto que este número es igual a C_m^{n+m} . De esta forma queda demostrada la igualdad

$$C_0^{n-1} + C_1^n + C_2^{n+1} + \dots + C_m^{n+m-1} = C_m^{n+m}. \quad (15)$$

Sustituyendo aquí n por $n+1$ y m por $m-1$ y aplicando la igualdad (10), se obtiene que

$$C_n^n + C_{n+1}^{n+1} + C_{n+2}^{n+2} + \dots + C_{n+m-1}^{n+m-1} = C_{n+1}^{n+m}. \quad (16)$$

Para $n=1, 2, 3$, obtenemos los siguientes casos particulares de la fórmula (16):

$$1+2+\dots+m = \frac{m(m+1)}{2}, \quad (17)$$

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + m(m+1) = \frac{m(m+1)(m+2)}{3}, \quad (18)$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + m(m+1)(m+2) = \frac{m(m+1)(m+2)(m+3)}{4}. \quad (19)$$

Mediante las fórmulas (17)–(19) es fácil hallar la suma de los cuadrados y la de los cubos de los números naturales del 1 al m . La fór-

mula (18) se puede escribir como sigue:

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 + 1 + 2 + \dots + m = \frac{m(m+1)(m+2)}{3}.$$

Pero, en virtud de la (17), se cumple que $1+2+\dots+m = \frac{m(m+1)}{2}$, por lo cual

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 = \frac{m(m+1)(m+2)}{3} - \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}. \quad (20)$$

En forma totalmente análoga se deduce, de la fórmula (9), que

$$1^3 + 2^3 + \dots + m^3 = \frac{m^2(m+1)^2}{4}. \quad (21)$$

Dejamos que el lector obtenga, por este método, las fórmulas para las sumas de potencias más elevadas de los números naturales.

Las m -combinaciones con repeticiones formadas por elementos de n tipos pueden ser clasificadas tomando como base el número de elementos de diferente tipo que figuran en la combinación dada. En otras palabras, en la primera clase se hallarán las combinaciones que están formadas por elementos iguales; en la segunda, las que lo están por elementos de dos tipos, ..., en la n -ésima, por elementos de todos los n tipos (se sobreentiende que si es $m < n$, se obtendrán solamente m clases).

Calculemos cuántas combinaciones figuran en cada clase. La elección de una combinación perteneciente a la k -ésima clase se puede efectuar en dos etapas. Primeramente escogemos qué k tipos de elementos figuran en la combinación. Como el número total de tipos es igual a n , esta elección se puede hacer de C_n^k maneras. Después de que los tipos estén elegidos, debemos establecer las m -combinaciones con repetición formadas por los elementos de estos k tipos, en las cuales estén representados todos ellos. Pero hemos demostrado (véase la pág. 35) que el

número de estas combinaciones con repetición es igual a $C_{m-1}^{m-1} = C_{m-1}^{m-1}$.

Según la regla del producto, de aquí se deduce que en la k -ésima clase figuran $C_k^m C_{k-1}^{m-1}$ combinaciones. Sumando los números de combinaciones de cada clase, obtenemos la cantidad total de m -combinaciones con repetición, formadas por elementos de n tipos, es decir, C_m^{m+n-1} . Queda así demostrada la igualdad

$$C_1^n C_0^{m-1} + C_2^n C_2^{m-1} + \dots \\ \dots + C_n^n C_{n-1}^{m-1} = C_m^{m+n-1}. \quad (22)$$

Si es $m < n$, el último término de la suma será $C_n^m C_{m-1}^{m-1}$. La igualdad obtenida adquiere una expresión más cómoda si se sustituye en cada sumando C_k^n por C_{n-k}^n . Nos quedará entonces:

$$C_{n-1}^n C_0^{m-1} + C_{n-2}^n C_1^{m-1} + \dots \\ \dots + C_0^n C_{n-1}^{m-1} = C_m^{m+n-1}. \quad (23)$$

Aquí, en cada sumando del primer término, la suma de los índices superiores es igual a $n + m - 1$, y la de los inferiores, a $n - 1$. Los índices superiores son constantes, y los inferiores varían. De otra forma, esta igualdad se puede escribir así:

$$C_0^n C_n^{n-p} + C_1^n C_{n-1}^{n-p} + \dots + C_p^n C_0^{n-p} = C_m^n. \quad (23')$$

Ahora deduciremos una fórmula análoga, en la cual al sumar varían también los índices superiores. Para esto, tomemos p vocales distintas y $n - p$ consonantes diferentes y formemos, a partir de éstas, todas las m -combinaciones con repetición posibles. Dividamos estas combinaciones en clases, incluyendo en la k -ésima clase las combinaciones que contienen k vocales y $m - k$ consonantes. Calculemos el número de combinaciones que figuran en la k -ésima clase. Cada elemento de ésta se divide en una k -combinación (con repetición), formada por p vocales, y una $(m - k)$ -combinación (con repetición), formada por $n - p$ consonantes. Por esto, en la

k -ésima clase habrá $C_k^{k+p-1} C_{k-m}^{m+n-p-k-1}$ combinaciones. Por lo tanto, la cantidad total de combinaciones analizadas es igual a

$$C_0^{p-1} C_m^{m+n-p-1} + C_1^p C_{m-1}^{m+n-p-2} + \dots \\ \dots + C_m^{m+p-1} C_0^{n-p-1}.$$

Por otro lado, estas combinaciones nos dan todas las m -combinaciones con repetición que se pueden formar de elementos de n tipos diferentes, por lo cual su número es igual a C_m^{m+n-1} . Obtenemos así la identidad

$$C_0^{p-1} C_m^{m+n-p-1} + C_1^p C_{m-1}^{m+n-p-2} + \dots \\ \dots + C_m^{m+p-1} C_0^{n-p-1} = C_m^{m+n-1}. \quad (24)$$

Escribamos esta igualdad de forma que al sumar varíen solamente los índices superiores. Para esto, hay que aplicar la identidad $C_q^r = C_{r-q}^r$ a todos los términos. Obtenemos entonces:

$$C_{p-1}^{p-1} C_m^{m+n-p-1} + C_{p-1}^p C_{m-p-1}^{m+n-p-2} + \dots \\ \dots + C_{p-1}^{m+p-1} C_{n-p-1}^{n-p-1} = C_{n-1}^{m+n-1}.$$

Esta fórmula puede ser escrita de otro modo como sigue¹:

$$C_p^{p-m-p} C_p^{m-1} + C_{p-1}^{p-m-p} C_{n-1}^{m-1} + \dots \\ \dots + C_p^{m-n+p} C_{n-p}^{n-p} = C_{n+1}^{m+1}. \quad (24')$$

Podemos apreciar que aquí, en la suma, los índices inferiores permanecen constantes, mientras que los superiores varían, siendo la suma de los primeros igual a n , y la de los últimos, a m .

Destaquemos un caso particular de la fórmula (23), que obtuvimos antes. Si hacemos en ella $n - p = m$, obtendremos

$$C_0^p C_0^m + C_1^p C_1^m + \dots + C_p^p C_m^m = C_p^{m+m}. \quad (25)$$

En particular, para $p = m$ nos da la igualdad $(C_0^m)^2 + (C_1^m)^2 + \dots + (C_p^m)^2 = C_p^{2p}$. (26)

¹ Sustituimos p por $p + 1$, n por $n + 2$ y m por $m - n$.

Las identidades obtenidas pueden ser generalizadas. Para esto, tomemos un conjunto formado por elementos de q tipos: n_1 elementos del primer tipo, n_2 del segundo, . . . , n_k del k -ésimo, siendo los elementos de un tipo diferentes entre sí (por ejemplo, el tipo se determina por el color del objeto, y los elementos de un mismo color tienen distinta forma).

Formaremos, partiendo de los elementos de este conjunto, todas las m -combinaciones posibles, y las clasificaremos por su composición, es decir, según el número de elementos del primero, segundo, . . . , q -ésimo tipo. Entonces cada clase se caracteriza por los números naturales (m_1, m_2, \dots, m_q) , que satisfacen a las desigualdades $0 \leq m_i \leq n_i$. Esta clase está constituida por m_1 elementos del primer tipo, m_2 del segundo, . . . , m_q del q -ésimo, siendo, además, $m_1 + m_2 + \dots + m_q = m$. Denotaremos esta clase mediante $A(m_1, \dots, m_q)$.

De la regla del producto se desprende que la clase $A(m_1, \dots, m_q)$ está formada por $C_{m_1}^{n_1} C_{m_2}^{n_2} \dots C_{m_q}^{n_q}$ combinaciones. Sumando el número de combinaciones de todas las clases, obtenemos la identidad

$$\sum C_{m_1}^{n_1} C_{m_2}^{n_2} \dots C_{m_q}^{n_q} = C_m^n, \quad (27)$$

donde $n = n_1 + n_2 + \dots + n_q$, y la suma se toma por todas las distribuciones posibles de los números naturales (m_1, m_2, \dots, m_q) , siendo $m_1 + m_2 + \dots + m_q = m$.

Si se toman combinaciones con repetición, se obtiene una identidad análoga:

$$\sum C_{m_1}^{n_1+m_1-1} C_{m_2}^{n_2+m_2-1} \dots \dots C_{m_q}^{n_q+m_q-1} = C_{m+n}^{n+m}, \quad (28)$$

donde también es $n = n_1 + n_2 + \dots + n_q$, y la suma se toma por las mismas agrupaciones de los números (m_1, m_2, \dots, m_q) .

Otra propiedad de las combinaciones se establece de la siguiente manera. Partimos de la

identidad

$$C_h^n C_{m-h}^{n-k} = C_h^m C_m^k, \quad (29)$$

la cual se comprueba fácilmente por razonamientos combinatorios. Para esto, hay que tomar n elementos diferentes, escoger k de éstos, y de los $n-k$ restantes escoger aún $m-k$. Se obtiene así una m -combinación de n elementos. Para un k fijo, este proceso se puede efectuar de $C_h^n C_{n-h}^{n-k}$ maneras. No es difícil comprobar que en nuestro caso cada una de las C_m^k combinaciones se obtiene de C_h^n maneras. De aquí se desprende, precisamente, la igualdad (29).

Escribamos la identidad (29) para $k=0, \dots, m$ y sumemos las igualdades obtenidas. Como, por la fórmula (12), se comprueba

$$C_0^n + C_1^m + \dots + C_m^m = 2^m,$$

se obtiene que

$$C_0^n C_m^n + C_1^n C_{m-1}^{n-1} + \dots + C_m^n C_0^{n-m} = 2^m C_m^n,$$

o bien

$$C_0^n C_{n-m}^n + C_1^n C_{n-1}^{n-1} + \dots \dots + C_m^n C_{n-m}^{n-m} = 2^m C_m^n. \quad (30)$$

CASO PARTICULAR DE LA FÓRMULA DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

Muchas propiedades de las combinaciones se deducen a base de la fórmula de inclusiones y exclusiones (véase la pág. 19). Nos será de utilidad un caso particular de ésta. Supongamos que el número $N(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ de elementos que poseen las propiedades $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ depende no de estas propiedades, sino solamente de su cantidad, es decir, supongamos que

$$N(\alpha_1) = \dots = N(\alpha_n),$$

$$N(\alpha_1 \alpha_2) = N(\alpha_1 \alpha_3) = \dots = N(\alpha_{n-1} \alpha_n),$$

$$N(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = N(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_4) = \dots = N(\alpha_{n-2} \alpha_{n-1} \alpha_n),$$

etc. Entonces, en la suma $N(\alpha_1) + \dots + N(\alpha_n)$ todos los términos son iguales a un mismo núme

ro, que denotaremos por $N^{(1)}$. Como hay n sumandos aquí, esta suma será igual a $nN^{(1)} = C_1^n N^{(1)}$. De forma totalmente igual se demuestra que

$$N(\alpha_1\alpha_2) + N(\alpha_1\alpha_3) + \dots + N(\alpha_{n-1}\alpha_n) = C_2^n N^{(2)},$$

donde $N^{(2)} = N(\alpha_1\alpha_2)$, y, en general, que

$$N(\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_k) + \dots + N(\alpha_{n-k+1} \dots \alpha_n) = C_k^n N^{(k)} \quad (31)$$

(se sobreentiende que la suma (31) se toma por todas las combinaciones posibles de n propiedades, tomadas de a k).

Por esto, en el caso considerado la fórmula de inclusiones y exclusiones adquiere la forma

$$N^{(0)} = N - C_1^n N^{(1)} + C_2^n N^{(2)} - \dots + (-1)^n C_n^n N^{(n)}. \quad (32)$$

SUMAS ALTERNADAS DE COMBINACIONES

Ahora pasaremos a la deducción de las propiedades ulteriores de las combinaciones. Estas son similares a las que demostramos antes, pero se diferencian de las últimas en que los signos de los sumandos varían: después de un «más» va un «menos», luego nuevamente un «más», etc.

La más sencilla de estas fórmulas es

$$C_0^n - C_1^n + C_2^n - \dots + (-1)^n C_n^n = 0. \quad (33)$$

Esta identidad se deduce de la igualdad (11). Para demostrarla, hay que tener en cuenta que $C_0^n = C_0^{n-1} = 1$. Sustituycamos el primer sumando por C_0^{n-1} y observemos que, en virtud de la fórmula (11), es $C_0^{n-1} - C_1^n = -C_1^{n-1}$. Tenemos ahora que $-C_1^{n-1} + C_2^n = C_2^{n-1}$, etc. En fin de cuentas todos los sumandos se simplifican entre sí.

Esta fórmula se puede demostrar también mediante razonamientos combinatorios. Escribamos todas las combinaciones de n elementos a_1, \dots, a_n y efectuemos la siguiente transfor-

mación: a la combinación que no contiene la letra a_1 se la agregaremos, y la eliminaremos de las combinaciones que la contienen. Es fácil comprobar que entonces obtendremos nuevamente todas las combinaciones, tomadas una sola vez cada una. Pero en esta transformación todas las combinaciones que tienen un número par de elementos se transforman en otras con número impar de éstos, y viceversa. Por consiguiente, hay tantas combinaciones con número par de elementos como con número impar de éstos (aquí incluimos también la combinación vacía, que no contiene ningún elemento). Esto se expresa, precisamente, por la fórmula (33).

Demostremos ahora la fórmula más compleja

$$C_0^m C_m^n - C_1^m C_{m-1}^{n-1} + C_2^m C_{m-2}^{n-2} - \dots + (-1)^m C_m^m C_0^{n-m} = 0. \quad (34)$$

Para esto, consideremos las m -combinaciones formadas a partir de los n elementos a_1, \dots, a_n . Designemos por (a_1, \dots, a_k) la propiedad de la combinación consistente en que en ésta figuran forzosamente los elementos a_1, \dots, a_k . El número $N(a_1, \dots, a_k)$ de tales combinaciones es igual a C_{m-k}^{n-k} (en éstas hay k lugares ocupados por los elementos a_1, \dots, a_k , habiendo $n-k$ pretendientes a los $m-k$ lugares restantes). El número total de combinaciones es igual a C_m^n , y no existen combinaciones que no posean ninguna de las propiedades $(a_1), \dots, (a_n)$ (en cada m -combinación figuran algunos elementos). Por esto, en nuestro caso será $N = C_m^n$, $N^{(0)} = 0$, $N^{(k)} = C_{m-k}^{n-k}$. Sustituyendo estos valores en la fórmula (32), obtenemos la identidad (34).

De forma totalmente análoga se demuestra la relación

$$C_0^m C_m^{n+m-1} - C_1^m C_{m-1}^{n+m-2} + C_2^m C_{m-2}^{n+m-3} - \dots + (-1)^n C_n^m C_0^{n+m-n} = 0, \text{ si } m \geq n,$$

$$C_0^m C_m^{n+m-1} - C_1^m C_{m-1}^{n+m-2} + \dots + (-1)^m C_m^m C_0^{n-1} = 0, \quad (35)$$

si $m < n$.

Precisamente, consideremos las m -combinaciones con repetición, formadas por elementos de n tipos a_1, a_2, \dots, a_n y denotemos mediante (a_k) , $1 \leq k \leq n$, la propiedad que consiste en que entre los elementos de la combinación hay elementos del tipo a_k (y también, puede ser, elementos de otros tipos). Entonces $N(a_1, \dots, a_k)$ es el número de combinaciones en las cuales figuran, con seguridad, los elementos de las clases a_1, \dots, a_k . De cada una de estas combinaciones se puede quitar un elemento de cada una de las clases a_1, \dots, a_k . Como resultado, se obtiene cierta $(m-k)$ -combinación con repetición, formada por los elementos de n tipos a_1, \dots, a_n . Recíprocamente, agregando a una $(m-k)$ -combinación con repetición, formada a partir de los elementos de los tipos a_1, \dots, a_n , un elemento de cada una de las clases a_1, \dots, a_k , obtenemos una m -combinación en la cual están representados obligatoriamente estas últimas clases. De aquí se desprende que el número $N(a_1, \dots, a_k)$ es igual al de $(m-k)$ -combinaciones con repetición que se pueden formar a partir de los elementos de n tipos, es decir, que $N(a_1, \dots, a_k) = C_{m-k}^{n+m-k-1}$. Ahora bien, el número total de m -combinaciones con repetición es igual a C_m^{n+m-1} , y no existe ninguna que no posea ninguna de las propiedades (a_k) , $1 \leq k \leq n$. Sustituyendo los valores hallados $N^{(0)} = 0$, $N = C_m^{n+m-1}$, $N^{(k)} = C_{m-k}^{n+m-k-1}$ en la fórmula (32), obtenemos la identidad (35).

Demostremos, por último, la identidad

$$n^m - C_1^n (n-1)^m + C_2^n (n-2)^m - \dots \\ \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^n \cdot 1^m = 0, \quad (36)$$

que es válida cuando $m < n$.

Con este fin, consideremos los m -arreglos con repetición de elementos de n tipos, y designemos mediante (a_k) la propiedad de un arreglo consistente en que en éste no figuran los elementos del tipo a_k .

Entonces $N(a_1, \dots, a_k)$ es el número de m -arreglos con repetición que no contienen los elementos de las clases a_1, \dots, a_k , es decir, que están formados por elementos de los $n-k$ tipos a_{k+1}, \dots, a_n . El número de estos arreglos es igual a $(n-k)^m$. De este modo, tenemos que

$$N^{(k)} = N(a_1, \dots, a_k) = (n-k)^m.$$

El número total de arreglos es igual a n^m .

Por último, no existen arreglos que no posean ninguna de las propiedades $(a_1), \dots, (a_n)$. En efecto, si un arreglo no posee ninguna propiedad (a_k) , contendrá elementos de todos los n tipos.

Pero esto es imposible, puesto que el número m de elementos de los arreglos es menor que n . Por esto, $N^{(0)} = 0$, y obtenemos la identidad (36).

Hemos demostrado aquí varias relaciones que satisfacen los números C_n^m . Se las puede demostrar también por otros métodos. En el capítulo V nos referiremos al método geométrico de demostración de estas relaciones, y en el VII exponemos el método más poderoso de demostración: el de las funciones generatrices. Mediante este método se pueden demostrar no sólo todas las relaciones expuestas en este capítulo, sino también toda una serie de otras, de gran interés.

PROBLEMAS COMBINATORIOS CON LIMITACIONES.

Hasta ahora hemos estudiado problemas en los que no se imponía ninguna condición complementaria sobre el orden de los elementos en las distribuciones. O bien (como en los arreglos y en las permutaciones) se admitía cualquier orden de los elementos, o bien (como en las combinaciones) el orden no se tomaba en cuenta. Ahora analizaremos problemas en los que se imponen algunas limitaciones sobre el orden de los elementos.

LOS LEONES Y LOS TIGRES

Un domador de fieras quiere sacar a la arena del circo 5 leones y 4 tigres. Un tigre no puede ir detrás de otro. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las fieras?

Ubiquemos primeramente todos los leones de forma que entre dos de ellos haya un intervalo. Esto se puede hacer de $5! = 120$ formas. El número de intervalos es igual a 4. Si agregamos a éstos dos lugares más: delante de todos los leones y detrás de ellos, se obtienen 6 lugares, en los cuales se pueden colocar los tigres, no estando ningún par de tigres juntos. Como el orden de los tigres tiene importancia, el número de formas de distribuirlos es igual al de arreglos de 6 elementos tomados de a 4, es decir, a $A_4^6 = 360$.

Combinando cada manera de distribución de los leones con uno de los modos de ubicar los tigres, obtenemos $120 \cdot 360 = 43\ 200$ formas de sacar las fieras a la arena.

Si el domador tuviese n leones y k tigres, podría resolver su problema de

$$P_n A_k^{n+1} = \frac{n! (n+1)!}{(n-k+1)!}$$

formas. Esto es posible solamente bajo la condición de que $k \leq n+1$, de otro modo dos tigres quedarán forzosamente uno al lado del otro.

LA CONSTRUCCION DE LA ESCALERA

Se construye una escalera que conduce del punto A al B (fig. 8). La distancia AC es igual a 4,5 m, y la CB, a 1,5 m. La altura de cada escalón es igual a 30 cm, y su ancho, a un múltiplo entero de 50 cm. ¿De cuántas maneras se puede construir la escalera?

De las condiciones dadas se aprecia que la escalera debe tener 5 escalones. Además, como $4,5 : 0,5 = 9$, tenemos 10 lugares en donde se puede hacer un escalón. De esta manera, hay que escoger 5 lugares entre 10. Esto se puede hacer de

$$C_{10}^5 = \frac{10!}{5! 5!} = 252$$

formas.

En general, si debe haber k escalones, y en el segmento AC caben n escalones, la escalera se puede construir de C_n^k modos.

Este problema es similar al del domador: éste no quería colocar dos tigres uno al lado del otro, y el constructor de la escalera no puede hacer escalones de altura doble. Pero entre ambos problemas hay una diferencia fundamental. Al domador le era importante el orden en el que iban los tigres: una cosa es poner delante de




Fig. 8.

todos al tigre Shaj, y otra, al tigre Akbar. Y para el constructor de la escalera todos los lugares donde hay una elevación son iguales. Además, el domador debía tener en cuenta también el orden de distribución de los leones, mientras que

al constructor de la escalera le eran iguales todos los lugares en los que se puede hacer una elevación. Por esto, el constructor tiene menores posibilidades de elección que el domador. Si la escalera tuviese una altura de 1,2 m y una longitud de 2,5 m, habría 4 escalones y 6 lugares en donde éstos se pueden construir. La respuesta sería entonces de $C_4^6 = 15$. Por su parte el domador, en el mismo caso, obtendría 43 200 variantes. Esto es comprensible, puesto que podría cambiar de lugar entre sí a 5 leones de $5! = 120$ formas, y a 4 tigres de $4! = 24$ maneras, habiendo en total $120 \cdot 24 = 2880$ formas. Y $15 \cdot 2880 = 43\ 200$.

El problema de la escalera se puede enunciar como sigue:

¿De cuántas formas se pueden distribuir n ceros y k unidades de modo que no haya dos unidades juntas?

En efecto, cada escalera se puede cifrar medianamente una sucesión de ceros y unidades: el cero indica el lugar en que la quebrada va hacia la derecha, y el 1, el lugar en que va hacia arriba. Por ejemplo, para la escalera representada en la fig. 8, obtenemos la sucesión 100101001010010. Además, como no hay escalones de altura doble en la escalera, en la sucesión no puede haber dos unidades seguidas. Así, pues, el número de sucesiones de n ceros y k unidades, en las cuales no hay ningún par de unidades juntas, es igual al de escaleras, es decir, a C_k^{n+1} .

EL ESTANTE DE LIBROS

En un estante hay 12 libros. ¿De cuántas formas se pueden escoger 5 de éstos de modo que no haya dos juntos?

Este problema se reduce al que acabamos de resolver. Cifremos cada elección de los libros mediante una sucesión de ceros y unidades. Precisamente, a cada libro dejado le pondremos en correspondencia un 0, y a cada uno tomado, un 1. Como resultado, se obtiene una sucesión

de 5 unidades y 7 ceros. Además, como no se pueden tomar libros que estaban juntos, en la sucesión obtenida no habrá dos unidades seguidas. Pero el número de sucesiones formadas por 5 unidades y 7 ceros, en los que no hay dos unidades juntas, es igual a $C_6^8 = 56$.

En general, si hay n libros en el estante y se escogen k de ellos de forma que no haya dos juntos, esto se puede efectuar de C_k^{n-k+1} maneras. De aquí se aprecia que el problema se puede resolver sólo si $2k - 1 \leq n$.

LOS CABALLEROS DEL REY ARTURO

A la mesa redonda del rey Arturo hay sentados 12 caballeros. Entre ellos, cada uno está enemistado con sus vecinos. Hay que escoger 5 caballeros para liberar a una princesa encantada. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto, procediendo de modo que entre los caballeros elegidos no haya enemigos?

Este problema es similar al del estante de libros, pero se diferencia del último en que los caballeros no están en fila, sino en círculo. Pero es fácil reducirlo al caso en que los caballeros estén sentados en fila. Para esto tomemos a alguno de ellos, digamos, a sir Lancelot. Todas las distribuciones escogidas de caballeros se dividen en dos clases: en algunas de ellas participa sir Lancelot, y en otras, no. Calculemos cuántas distribuciones hay en cada clase.

En caso de que sir Lancelot vaya a liberar a la princesa encantada, ni su vecino de la derecha ni el de la izquierda tomarán parte en la expedición. Quedan 9 caballeros, de los cuales hay que escoger a 4 acompañantes para sir Lancelot. Como los vecinos de éste no participan en la expedición, hay que cuidar solamente de que entre los 4 caballeros elegidos no haya enemigos, es decir, de que no haya dos que estén sentados juntos. Pero la eliminación de sir Lancelot y de sus dos vecinos rompe la cadena de caballeros, y se puede considerar que éstos no



están sentados a una mesa redonda, sino en una fila. Pero en este caso se pueden elegir 4 caballeros de entre 9, en la forma exigida, de $C_4^9 = 15$ formas. Así, pues, en la primera clase figuran 15 disposiciones.

Calculemos ahora cuántas disposiciones hay en la segunda clase. Como sir Lancelot no participa en la expedición, se lo puede eliminar de inmediato del número de caballeros de la mesa redonda. Entonces la cadena de caballeros y de sus interrelaciones se rompe nuevamente, quedando 11 caballeros dispuestos en fila. De ellos hay que escoger 5 participantes de la expedición de manera que entre los elegidos no haya dos que estuviesen sentados juntos. Esto se puede efectuar de $C_5^9 = 21$ modos. De esta forma, el número total de maneras es igual a $15 + 21 = 36$.

En general, si a la mesa redonda hay sentados n caballeros y hay que escoger k de ellos de modo que entre ellos no haya ningún par de vecinos, esto se puede efectuar de $C_{k-1}^{n-k-1} + C_k^{n-k}$ maneras.

Esta afirmación se demuestra análogamente a como lo hicimos más arriba. Todas las dispo-

siciones de caballeros se dividen en dos clases, según participe o no en ellas el caballero Lancelot. Las disposiciones en que éste participa sumarán C_{k-1}^{n-k-1} , y habrá C_k^{n-k} en las cuales no participe. Se verifica fácilmente que

$$C_{k-1}^{n-k-1} + C_k^{n-k} = \frac{n}{n-k} C_k^{n-k}.$$

Por ejemplo, para $n=12$, y $k=5$, se obtiene $\frac{12}{7} \cdot C_5^7 = \frac{12}{7} \cdot 21 = 36$.

LA CHICA ESTA APURADA: TIENE UNA CITA

Hace un tiempo, en las pantallas de la URSS se exponía una comedia cinematográfica con este nombre. En ella se narraban las tribulaciones de dos veraneantes que se olvidaron los pasaportes en sus casas. Decidieron enviarlos los pasaportes por correo. Pero la chica que trabajaba en el correo tenía una cita, y en su apuro confundió los sobres: el pasaporte de uno quedó en el sobre con la dirección del otro, y el de este último, en el sobre con la dirección del primero. Por suerte no le tocó trabajar a la vez con 5 cartas, pues entonces no a dos, sino a cinco infelices les habría tocado dormir en los duros bancos del parque del balneario...

A propósito, esto no es del todo cierto, ya que podría haber puesto, casualmente, algunos pasaportes en los sobres necesarios. Calculemos en cuántos casos ella habría hecho una confusión total, es decir, que ninguno hubiese recibido su pasaporte.

Este problema se puede enunciar de la siguiente manera. Se toman todas las permutaciones posibles de los 5 números 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuántas de todas no hay ningún número en su lugar? La resolución se efectúa por el método de las inclusiones y exclusiones (véase la pág. 19). Denotemos mediante (α) la propiedad de la permutación que consiste en que el número α se halla en su lugar, y median-

te N_α denotemos la cantidad de permutaciones que poseen dicha propiedad. Análogamente, $N_{\alpha\beta}$ indicará la cantidad de permutaciones que poseen a la vez las propiedades (α) y (β), es decir, tales que tanto α como β se hallan en sus lugares. Un significado análogo tienen las notaciones $N_{\alpha\beta\gamma}$, etc. Por último, denotemos mediante $N^{(0)}$ el número de permutaciones que no poseen ninguna de las propiedades (1), (2), (3), (4), (5), es decir, de las permutaciones en las que ningún número se halla en su lugar. En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, tendremos que

$$N^{(0)} = N - N_1 - N_2 - N_3 - N_4 - N_5 + N_{12} + \dots \\ \dots + N_{45} - N_{123} - \dots - N_{315} + \\ + N_{1234} + \dots + N_{2345} - N_{12345}, \quad (1)$$

donde $N = P_5$ es el número total de todas las permutaciones de 5 elementos (véase la pág. 20).

En nuestro caso, el problema se simplifica porque las propiedades (1), (2), (3), (4), (5) son totalmente similares. Por esto queda claro que $N_1 = N_2 = \dots = N_5$. Análogamente, tendremos que $N_{12} = N_{23} = \dots = N_{45}$, pues da lo mismo que se queden en su lugar los números 1 y 2, o los 3 y 4. Pero el número de pares que se pueden escoger de los números 1, 2, 3, 4, 5, es igual a C_2^5 (las propiedades (1, 2) y (2, 4) coinciden, por lo cual el orden de los números tomados en el par no nos interesa).

Análogamente tendremos C_3^5 ternas, C_4^5 cuaternas y C_5^5 grupos de cinco. Por esto, la fórmula (1) se puede escribir como sigue:

$$N^{(0)} = N - C_1^5 N^{(1)} + C_2^5 N^{(2)} - C_3^5 N^{(3)} + \\ + C_4^5 N^{(4)} - C_5^5 N^{(5)}. \quad (2)$$

Aquí, para simplificar, se ha designado por $N^{(k)}$ la cantidad de permutaciones en las que k cifras dadas quedan en sus lugares. Para concluir la resolución del problema, nos queda hallar los valores de $N^{(k)}$, $k = 1, 2, 3, 4, 5$.

$N^{(1)}$ designa la cantidad de permutaciones en las que quedó en su lugar un número prefijado, por ejemplo, el 1. Pero si el 1 queda en su lugar,



los restantes se pueden permutar entre sí de $P_4 = 24$ maneras. Por ende, $N^{(1)} = P_4$. Análogamente, si los números 1 y 2 se quedan en sus lugares, los tres números restantes se pueden intercambiar de $P_3 = 6$ formas. Por esto, $N^{(2)} = P_3 = 6$. Análogamente se obtiene que

$$N^{(3)} = P_2 = 2, \quad N^{(4)} = P_1 = 1 \text{ y } N^{(5)} = P_0 = 1.$$

Sustituyendo los valores hallados de $N^{(1)}$, $N^{(2)}$, $N^{(3)}$, $N^{(4)}$, $N^{(5)}$ en la fórmula (2), resulta

$$N^{(0)} = P_5 - C_1^5 P_4 + C_2^5 P_3 - C_3^5 P_2 + C_4^5 P_1 - C_5^5 P_0 = \\ = 120 - 5 \cdot 24 + 10 \cdot 6 - 10 \cdot 2 + 5 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 44.$$

Así, pues, en 44 casos de 120 ningún destinatario recibirá su pasaporte.

En forma totalmente análoga se puede hallar en cuántos casos recibirá su pasaporte exactamente un destinatario. Si el afortunado fuese el primer destinatario, los otros 4 recibirían pasaportes ajenos. Esto puede suceder de

$$P_1 - C_1^4 P_3 + C_2^4 P_2 - C_3^4 P_1 + C_4^4 P_0 = 9$$

maneras. Pero como el afortunado puede ser cualquier destinatario, el número total de formas

en que una persona exactamente recibirá la carta dirigida a él es igual a $5 \cdot 9 = 45$.

Proponemos que el lector verifique por sí mismo que exactamente dos personas recibirán su carta en 20 casos, tres, en 10, cuatro, en 0, y cinco, en 1 caso. El resultado para cuatro se explica porque si cuatro recibiesen la carta dirigida a ellos, la restante estaría también dirigida a la dirección correcta.

De modo que las 120 permutaciones distintas de 5 elementos se dividen en 44 permutaciones en las cuales ningún elemento queda en su lugar, 45 en las que exactamente uno no cambia su lugar, 20 en las que no cambian de lugar dos elementos, 10 que dejan fijas a tres elementos, y 1 en la que todos quedan en sus lugares.

LA SESIÓN DE TELEPATÍA

Algunos afirman que pueden leer los pensamientos a distancia. Para verificar esto, se hacían los siguientes experimentos. En una pieza levantaban, en cierto orden, las llamadas figuras de Zener (fig. 9). El telépata debía adivinar en qué orden eran levantadas dichas figuras.




Fig. 9.

Supongamos que las figuras se levantan sin repetición. Entonces, el número total de permutaciones posibles de estas figuras es igual a $5! = 120$. Al efectuar la sesión, se escoge una de estas permutaciones. El telépata nombra otra



permutación de estas figuras, y su éxito es tanto mayor cuantas más figuras adivine. De los cálculos, efectuados en las págs. 45-46, se deduce que si se adivina al azar los resultados serían aproximadamente los siguientes: en 44 casos de 120 no se adivinaría ninguna figura, en 45, una, en 20, dos, en 10, tres, y en un caso, las cinco figuras. El promedio, al adivinar al azar, de las figuras denominadas correctamente, es igual a

$$\frac{45 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 3 + 5}{120} = 1,$$

es decir, se nombra una figura de entre cinco. Para n figuras distintas, en promedio se adivinará una figura de entre n . Si se adivina sistemáticamente un mayor número de éstas, hay que investigar metódicamente la causa: si tiene lugar (como sucede con frecuencia) un engaño, o si en efecto la persona estudiada posee aptitudes especiales.

Analícemos si varía el número promedio de figuras adivinadas, cuando se admiten repeticiones. En este caso, en lugar de permutaciones tendremos arreglos con repetición. Pero el número

de tales arreglos de n elementos, de los cuales ni uno se halla en su lugar «legítimos», es igual a $(n-1)!$. Efectivamente, en el primer lugar puede estar cualquier elemento, a excepción del primero, en el segundo, cualquier elemento, a excepción del segundo, etc. En otras palabras, para cada lugar hay $n-1$ candidatos. Según la regla del producto, de aquí se deduce que el número de combinaciones posibles es igual a $(n-1)!$.

Hallemos en cuántos casos quedará en su lugar exactamente un elemento. Si ocupa su lugar, digamos, el primer elemento, quedarán aún $n-1$ lugares que deben ser ocupados. Además, hay que tener en cuenta que cada lugar es pretendido por $n-1$ candidatos (todos los elementos, a excepción del «propietario legítimo» de este lugar). Por consiguiente, el número de arreglos en los que el primer elemento, y sólo éste, se halla en su lugar, es igual a $(n-1)^{n-1}$. Pero como en su lugar puede estar cualesquiera de los n elementos, el número de arreglos en los que no se ha movido exactamente un elemento es igual a $n(n-1)^{n-1}$. En forma totalmente igual se demuestra que el número de arreglos en los que no se han movido exactamente k elementos es igual a $C_k^n (n-1)^{n-k}$.

Por ejemplo, en el caso de cinco elementos diferentes, se obtiene el siguiente resultado: el número de arreglos con repetición en los que se han desplazado todos los elementos es igual a $4^5 = 1024$; el de arreglos en que exactamente un elemento se halla en su lugar, a $5 \cdot 4^4 = 1280$; el de aquellos en que exactamente dos elementos quedarán en sus lugares, a $10 \cdot 4^3 = 640$; tres, a $10 \cdot 4^2 = 160$; cuatro, a $5 \cdot 4 = 20$, y cinco, a $1 \cdot 4^0 = 1$. En total, tenemos

$$1024 + 1280 + 640 + 160 + 20 + 1 = 3125$$

arreglos, lo cual concuerda con la fórmula

$$\bar{A}_5^5 = 5^5 = 3125.$$

En promedio se adivinará, si se adivina al azar,

$$\frac{1280 + 620 \cdot 2 + 160 \cdot 3 + 20 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{5} = 1$$

elemento. La respuesta resultó ser la misma: al adivinar al azar se puede acertar una figura de entre cinco, sin que esto dependa de si se admite repetición de figuras o no. Sin embargo, la distribución del número de figuras adivinadas ya será otra. Esta se indica en la tabla siguiente:

Cantidad de figuras acertadas	Sin repeticiones	Con repeticiones
0	0,368	0,328
1	0,375	0,410
2	0,167	0,205
3	0,083	0,051
4	0	0,006
5	0,009	0,000

PROBLEMA GENERAL DEL DESPLAZAMIENTO¹

En forma completamente análoga a lo efectuado con los problemas estudiados más arriba, se resuelve el problema general sobre el desplazamiento: *hallar el número D_n de permutaciones de n elementos, en las cuales ningún elemento se queda en la posición inicial*. La respuesta se expresa por la fórmula

$$D_n = P_n - C_1^n P_{n-1} + C_2^n P_{n-2} - \dots + (-1)^n C_n^n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]. \quad (3)$$

El lector que conoce la teoría de las series reconocerá en la expresión entre paréntesis a una suma parcial del desarrollo de e^{-1} .

Generalizando la fórmula (3) para el caso $n=0$, se obtiene que es natural convenir en que $D_0 = 1$.

El número de permutaciones en las cuales exactamente r elementos permanecen en sus

¹ Este apartado se puede omitir en caso de que no se quiera profundizar en la cuestión.

lugares iniciales y los $n - r$ restantes cambian su posición, se expresa por la fórmula

$$D_{n,r} = C_r^n D_{n-r}. \quad (4)$$

En efecto, hay que elegir primeramente qué r elementos quedan en sus lugares. Esto se puede hacer de C_r^n maneras. Los $n - r$ elementos restantes pueden ser intercambiados, después de esto, de cualquier manera, siempre que ninguno de ellos ocupe su lugar inicial. Esto se puede hacer de D_{n-r} modos. Según la regla del producto, se obtiene que el número total de permutaciones requeridas es igual a $C_r^n D_{n-r}$.

Dividamos todas las permutaciones en clases, según la cantidad de elementos que permanecen fijos en la permutación dada. Como el número total de permutaciones es igual a $n!$, se obtiene la siguiente identidad:

$$n! = \sum_{r=0}^n D_{n,r} = \sum_{r=0}^n C_r^n D_{n-r}. \quad (5)$$

Otra identidad que relaciona a $n!$ con los números $D_{n,r}$ se obtiene de la siguiente manera. Tomemos todas las $n!$ permutaciones de los elementos a_1, \dots, a_n y calculemos cuántos números en éstas quedaron en sus lugares. Este cálculo se puede efectuar de dos maneras. En primer lugar, obsérvese que si, por ejemplo, el elemento a_1 se halla en su lugar, los restantes se pueden permutar de $P_{n-1} = (n-1)!$ modos. Por esto, en $(n-1)!$ permutaciones el elemento a_1 se hallará en el primer lugar. De igual manera, en $(n-1)!$ permutaciones el elemento a_2 se hallará en el segundo lugar, etc. En total, obtenemos $n(n-1)!$ elementos que se hallan en sus lugares. Pero el número de estos elementos puede ser calculado de otro modo. La cantidad de permutaciones de la r -ésima clase, es decir, tales que r elementos de éstas se hallan en sus lugares, es igual a $D_{n,r}$. Cada permutación de este tipo nos da r elementos fijos. Por esto, la cantidad total de elementos fijos en las permutaciones de la r -ésima clase es igual a $rD_{n,r}$,

obteniéndose, en total $\sum_{r=0}^n rD_{n,r}$ elementos fijos.

Queda con esto demostrada la identidad

$$n! = \sum_{r=0}^n rD_{n,r} = \sum_{r=0}^n rC_r^n D_{n-r}. \quad (5')$$

La fórmula de inclusiones y exclusiones permite resolver también el siguiente problema: *hallar el número de permutaciones de n elementos, en las cuales r elementos prefijados se han desplazado* (y los restantes pueden estar tanto desplazados, como quedarse en sus lugares iniciales). La respuesta se expresa mediante la fórmula

$$n! - C_1^n (n-1)! + C_2^n (n-2)! - \dots + (-1)^r (n-r)!. \quad (6)$$

SUBFACTORIALES ¹

Algunos autores denominan los números D_n *subfactoriales*. Las subfactoriales poseen muchas propiedades comunes con las factoriales ordinarias. Por ejemplo, para las últimas se cumple la igualdad

$$n! = (n-1) \{ (n-1)! + (n-2)! \}. \quad (7)$$

En efecto,

$$(n-1) \{ (n-1)! + (n-2)! \} = (n-1)(n-2)! n = n!.$$

Demostremos que la misma igualdad tiene lugar también para las subfactoriales D_n , es decir, que

$$D_n = (n-1) \{ D_{n-1} + D_{n-2} \}. \quad (8)$$

Para esto, sustituyamos D_{n-1} y D_{n-2} por sus desarrollos según la fórmula (3). Obtenemos, separando en la expresión de D_{n-1} el último sumando, que

$$(n-1) [D_{n-1} + D_{n-2}] = (n-1) [(n-1)! + (n-2)!] \times \\ \times \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-2}}{(n-2)!} \right] + \\ + (-1)^{n-1} (n-1).$$

¹ Este párrafo puede ser omitido en la primera lectura.

Pero, en virtud de la fórmula (7),

$$(n-1)[(n-1) + (n-2)] = n!$$

Además,

$$(-1)^{n-1}(n-1) = n! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{(-1)^n}{n!} \right].$$

Por esto,

$$\begin{aligned} (n-1)[D_{n-1} + D_{n-2}] &= \\ = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-2}}{(n-2)!} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{(-1)^n}{n!} \right] = D_n. \end{aligned}$$

La relación (8) demostrada se puede, reemplazando los razonamientos de Euler, deducir mediante consideraciones puramente combinatorias. Tomemos todas las permutaciones en las que todos los elementos han sido desplazados. El primer lugar, en éstas, lo puede ocupar cualquier elemento, a excepción del primero. Como el número de elementos restantes es igual a $n-1$, las D_n permutaciones quedan divididas en $n-1$ grupos, según qué elemento ocupó el primer lugar. Está claro que en todos los grupos habrá igual cantidad de elementos.

Calculemos cuántos elementos hay en uno de estos grupos, por ejemplo, en aquél donde el primer lugar ha sido ocupado por el segundo elemento. Este grupo se divide en dos partes: las permutaciones en las que el primer elemento se halla en el segundo lugar, y todas las restantes. Si el primer elemento ocupó el segundo lugar (y el segundo, como se recordará, el primer lugar), los $n-2$ elementos restantes se pueden intercambiar de cualquier manera, siempre que ninguno de ellos ocupe su lugar. Esto se puede hacer de D_{n-2} maneras. Por lo tanto, la primera parte contiene D_{n-2} permutaciones.

Demostremos que la segunda parte está formada por D_{n-1} permutaciones. En efecto, en ésta figurarán todas las permutaciones en las que el primer elemento no se halle en el segundo lugar, y los demás no estén en sus lugares. Si se considera por un momento que el segundo lugar es «legítimo» para el primer elemento, se obtendrá

que los elementos primero, tercero, cuarto, . . . , n -ésimo no se hallan en sus lugares. Como el número de estos elementos es igual a $n-1$, en la segunda parte habrá D_{n-1} permutaciones. Pero entonces, todo el grupo está formado por $D_{n-2} + D_{n-1}$ permutaciones. Como todo el conjunto de permutaciones que desplazan a todos los elementos está formado por $n-1$ grupos, en aquél habrá $(n-1)[D_{n-2} + D_{n-1}]$ permutaciones. Con esto, queda demostrada la igualdad (8).

De la fórmula (8) se deduce que

$$D_n - nD_{n-1} = -[D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}].$$

Por esto, al variar n , la expresión $D_n - nD_{n-1}$ sólo cambia de signo. Aplicando esta relación varias veces, obtenemos que

$$D_n - nD_{n-1} = (-1)^{n-2} [D_2 - 2D_1].$$

Pero $D_2 = 1$, y $D_1 = 0$, por lo cual

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n. \quad (9)$$

Esta fórmula nos recuerda la relación $n! = n(n-1)!$ para las factoriales.

Escribamos los valores de las subfactoriales para los primeros 12 números naturales

n	D_n	n	D_n	n	D_n	n	D_n
1	0	4	9	7	1854	10	1 334 961
2	1	5	44	8	14 833	11	14 684 570
3	2	6	265	9	133 496	12	176 214 841

LA CARAVANA DEL DESIERTO

Por el desierto va una caravana formada por 9 camellos. La travesía dura muchos días y, al fin, a todos les aburre ver delante de sí al mismo camello. ¿De cuántas maneras se pueden intercambiar los camellos de forma que delante de cada uno vaya otro distinto del anterior?

Estas permutaciones existen con seguridad. Por ejemplo, se pueden disponer todos los camellos en orden inverso, de forma que el último resulte primero, etc. En general, como dice el proverbio árabe, «cuando la caravana vuelve hacia atrás, el camello rengo queda delante».

Para resolver el problema, numeremos los camellos en su orden inicial desde el final de la caravana hacia el principio con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De este modo, el último camello obtiene el número uno, el penúltimo, el 2, etc. Debemos hallar todas las permutaciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en las cuales no se encuentre ningún par (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 9). Para resolver el problema, apliquemos nuevamente la fórmula de inclusiones y exclusiones.

Calculemos, ante todo, en cuántas permutaciones figura el par (1, 2). Podemos considerar en estas permutaciones que este par es un solo elemento. Por esto, la cantidad total de elementos no será 9, sino 8, y el número de permutaciones que contiene a (1, 2) es igual a P_8 . El mismo resultado se obtiene para todos los 8 pares.

Ahora tomemos las permutaciones que contienen dos pares prefijados. En este caso, unimos los elementos que figuran en cada uno de estos pares. Si ambos pares contienen un mismo elemento (por ejemplo, los pares (1, 2) y (2, 3)), uniremos los tres elementos. En caso contrario (por ejemplo, para los pares (1, 2) y (5, 6)) unimos los elementos de a dos. En ambos casos, después de unirlos obtenemos 7 elementos nuevos (una parte de ellos es un par, o bien una terna de los iniciales), los cuales pueden ser permutados entre sí de P_7 maneras. Y dos pares pueden ser elegidos de entre ocho de C_2^8 formas.

De igual modo se demuestra que la cantidad de permutaciones que contienen k pares dados es igual a P_{9-k} . Además, k pares pueden ser escogidos de C_k^8 maneras. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene que la cantidad de permutaciones que no contienen ningún par dado es igual a

$$\begin{aligned}
 & P_9 - C_1^8 P_8 + C_2^8 P_7 - C_3^8 P_6 + C_4^8 P_5 - \\
 & - C_5^8 P_4 + C_6^8 P_3 - C_7^8 P_2 + C_8^8 P_1 = \\
 & -8! \left[9 - \frac{8}{1!} + \frac{7}{2!} - \frac{6}{3!} + \frac{5}{4!} - \frac{4}{5!} + \frac{3}{6!} - \frac{2}{7!} + \frac{1}{8!} \right] = \\
 & = 448\ 329.
 \end{aligned}$$

De forma totalmente análoga se demuestra que la cantidad de permutaciones de n números 1, 2, 3, ..., n que no contienen ningún par (1, 2), (2, 3), ..., (n-1, n) se expresa mediante la fórmula

$$\begin{aligned}
 E_n &= P_n - C_1^{n-1} P_{n-1} + C_2^{n-1} P_{n-2} - C_3^{n-1} P_{n-3} + \dots \\
 & \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1} P_1 = \\
 & = (n-1)! \left[n - \frac{n-1}{1!} + \frac{n-2}{2!} - \frac{n-3}{3!} + \dots \right. \\
 & \left. \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \right]. \quad (10)
 \end{aligned}$$

Expresemos la respuesta obtenida mediante subfactoriales. Para esto, dividamos cada sumando del segundo miembro en dos:

$$\frac{(-1)^k (n-k)}{k!} = \frac{(-1)^k n}{k!} + \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Obtenemos entonces que

$$\begin{aligned}
 E_n &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{(-1)^n}{n!} \right] + \\
 & + (n-1)! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^{n-2}}{(n-2)!} + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \right]
 \end{aligned}$$

(en ambos paréntesis hemos agregado un término, el último; es evidente que estos términos se simplificarán entre sí, puesto que después de abrir paréntesis se transforman respectivamente en $(-1)^n$ y $(-1)^{n-1}$). Pero el primer sumando no es otra cosa que D_n , y el segundo, D_{n-1} . Por esto,

$$E_n = D_n + D_{n-1}. \quad (11)$$

Así, pues, el número de permutaciones de 1, 2, 3, ..., en las cuales no figura ningún par (1, 2), (2, 3), ..., (n-1, n) es igual a $D_n + D_{n-1}$.

En forma totalmente análoga se demuestra que la cantidad de permutaciones de n elementos, en las cuales no figuran $r \leq n-1$ pares prefijados, es igual a

$$P_n - C_1^r P_{n-1} + C_2^r P_{n-2} - \dots + (-1)^r C_r^r P_{n-r}. \quad (12)$$

Si el número de pares prohibidos es mayor que $n-1$, se obtiene otra respuesta. Suponga-

mos, por ejemplo, que además de los pares $(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$, en la permutación no debe figurar el par $(n, 1)$. Razonando en forma análoga a como lo hicimos más arriba, se obtiene que la respuesta se expresa mediante la fórmula

$$E_n = P_n - C_1^n P_{n-1} + C_2^n P_{n-2} - \dots \\ \dots + (-1)^k C_k^n P_{n-k} + \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^n P_1 = \\ = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \right] = nD_{n-1}. \quad (13)$$


En efecto, en este caso el número de pares prohibidos es igual a n , y no puede haber un caso en que en la permutación figuren todos los n pares. En efecto, por ejemplo, si en ésta se hallan los pares $(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$, el primer elemento será el 1, y el último, el n , por lo cual el par $(n, 1)$ no figurará en la permutación. Por esto, el último término de la fórmula (13) es igual a $(-1)^{n-1} C_{n-1}^n P_1$, y no a $(-1)^n C_n^n P_0 = (-1)^n$.

Sería interesante dar a la última respuesta $F_n = nD_{n-1}$ una fundamentación puramente combinatoria.

UN PASEO EN CALESITA

En una calesita pasean n niños. Estos decidieron cambiar de lugar, de forma que delante de cada uno quede otro distinto del que había antes. ¿De cuántas maneras pueden efectuar esto?

Este problema es similar al que resolvimos más arriba, sobre la caravana. Pero ahora el número de pares prohibidos es igual a n : no deben figurar los pares $(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$ y $(n, 1)$. Además, las permutaciones que se obtienen una de otra cambiando a los niños en círculo no se considerarán diferentes: cuando comience a girar la calesita no se podrán distinguir entre sí. Por esto, de los k elementos se pueden obtener solamente $P_{k-1} = (k-1)!$ permutaciones esencialmente distintas. Por último,



en el nuevo problema puede haber permutaciones, en las cuales figuren todos los n pares. Tal será, por ejemplo, la permutación inicial. Teniendo en cuenta todo esto, se obtiene, según la fórmula de inclusiones y exclusiones, que el número de permutaciones buscado es igual a

$$Q_n = P_{n-1} - C_1^n P_{n-2} + C_2^n P_{n-3} - \dots \\ \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^n P_0 + (-1)^n C_n^n. \quad (14)$$

Es fácil comprobar que esta expresión se puede escribir en la forma

$$Q_n = D_{n-1} - D_{n-2} + D_{n-3} - \dots + (-1)^{n-3} D_2. \quad (15)$$

En efecto, de la fórmula (14), en virtud de la igualdad $C_k^n - C_{k-1}^{n-1} = C_k^{n-1}$, se deduce que, para $n \geq 1$,

$$Q_n + Q_{n-1} = P_{n-1} - C_1^{n-1} P_{n-2} + C_2^{n-1} P_{n-3} - \dots \\ \dots + (-1)^n,$$

y esta expresión es igual a D_{n-1} (véase la pág. 49). De este modo, $Q_n + Q_{n-1} = D_{n-1}$. Además, de la fórmula (14) se deduce que $Q_2 = 0$. Tenemos,

pues, que

$$Q_n + Q_{n-1} = D_{n-1},$$

$$-Q_{n-1} - Q_{n-2} = -D_{n-2},$$

$$Q_{n-2} + Q_{n-3} = D_{n-3},$$

$$(-1)^{n-3} Q_3 = (-1)^{n-3} D_2.$$

Sumando estas igualdades, se obtiene la relación (15).

EN LA COLA DEL CINE

En la caja del cine hay una cola de $m+k$ personas; m de ellas tienen billetes de 1 rublo, y k , monedas de 50 kopeks¹. El billete cuesta 50 kopeks, y al comienzo de la venta la caja está vacía. ¿De cuántas maneras se pueden hallar en la cola las personas con rublos y con monedas de 50 k. de forma que la cola pase sin contratiempos, es decir, que nadie deba esperar su cambio?

Por ejemplo, si $m = k = 2$, habrá solamente dos casos propicios: $crcr$ y $crrr$, donde c indica una moneda de 50 k. (la mitad de un rublo) y r , un rublo. En cambio, en los cuatro casos $rrcc$, $rcrc$, $rcrr$ y $rrcc$ surgirá una detención: en los primeros tres casos ya el primer espectador no podrá recibir su cambio, y en el último, se detendrá en la caja el tercer espectador.

Para pequeños valores de m y k se puede resolver el problema analizando directamente todos los casos posibles. Pero si m y k son relativamente grandes, no nos ayudará este método. Es que el número de permutaciones diferentes que se pueden formar de m rublos y k monedas de 50 k. es igual, como se sabe, a

$$P(m, k) = \frac{(m+k)!}{n! k!}$$

Por ejemplo, para $m = k = 20$, tendríamos que

$$P(20, 20) = \frac{40!}{20! 20!},$$



que es un número mayor que los cien mil millones.

Deduzcamos la fórmula que expresa el número de las distribuciones buscadas a partir de m y k . Debemos, pues, hallar el número de permutaciones de m letras « r » y k letras « c », que posean la siguiente propiedad: para todo r , $1 < r \leq m+k$, el número de letras « c » en los primeros r términos de la permutación no es menor que el de letras « r » (debe haber una cantidad no menor de monedas de 50 k. que de rublos, de otra forma la cola se detendrá).

Está claro que para que se pueda resolver el problema es necesario que se cumpla la condición $m \leq k$; de otro modo, la cola se detendrá obligatoriamente: no alcanzarán las monedas de 50 k. para dar el cambio a todos los poseedores de rublos. Por esto, partiremos de que $0 \leq m \leq k$. Al igual que en algunos otros problemas combinatorios, aquí es más cómodo buscar el número de casos «no propicios», es decir, de casos en que la cola se detenga. Si hallamos este número, restándolo de la cantidad $P(m, k) = \frac{(m+k)!}{m! k!}$ de todas las permutaciones de m letras

¹ El kopek es la centésima parte del rublo (N. del T.).

«r» y k letras «c», se obtiene la respuesta de nuestro problema.

Ahora demostraremos el siguiente enunciado: el número de casos no propicios para las permutaciones de m letras «r» y k letras «c» es igual a $P(m-1, k+1) = C_{m-1}^{m+k}$, es decir, al número de todas las permutaciones de $m-1$ letras «r» y $k+1$ letras «c». Esto se demuestra como sigue. Tomemos cualquier permutación desfavorable de m letras «r» y k letras «c». Supongamos que la cola se retiene en algún lugar. Entonces, antes de este lugar habrá un número igual de letras «c» y «r» (todas las monedas de 50 k. se invertirán en el cambio a los poseedores de rublos), y en dicho lugar habrá una letra «r»; de otro modo, la cola pasaría sin problemas por éste.

De esta manera, el número del lugar en el cual se detiene la cola tiene la forma $2s+1$, habiendo antes que él s letras «r» y s letras «c». Pongamos ahora delante de nuestra permutación una letra «c» (si la cola entra a protestar, diremos que esto se efectúa con el fin de aliviar el cambio de las monedas). Obtendremos una permutación de m letras «r» y $k+1$ letras «c», siendo «c» la primera letra de esta permutación; entre las primeras $2s+2$ letras habrá igual número de letras «r» y «c» (había s letras «c» y $s+1$ letras «r»; al agregar una letra «c» quedaron iguales cantidades).

Ahora efectuaremos una operación que causará el disgusto de todos los poseedores de rublos y la alegría de los dueños de monedas de 50 k.: en los primeros $2s+2$ lugares cambiaremos el billete de cada poseedor de un rublo por una de 50 k., cambiando también cada una de 50 k. por un rublo. Por ejemplo, si la cola tuviera la forma

c c r c r c r c r c r c c r c c r,

se detendría en el lugar indicado mediante la letra «r». Después de agregar delante una letra «c» y efectuar el cambio indicado, se obtiene una cola del tipo

r r r c r c r c r c r c c c c r c r.

Como en los primeros $2s+2$ lugares había igual cantidad de rublos y de monedas de 50 k., después del cambio la cantidad total de monedas de cada tipo no cambiará, y obtendremos una permutación de m letras «r» y $k+1$ letras «c», estando ahora «r» en el primer lugar. De este modo, hemos hecho corresponder a cada sucesión «desfavorable» de m letras «r» y k letras «c» una sucesión de m letras «r» y $k+1$ letras «c», que comienza a partir de una letra «r».

Demostremos que de esta forma se puede obtener cualquier sucesión de m letras «r» y $k+1$ letras «c», que comience a partir de una «r». En efecto, tomemos tal sucesión. Como se supone que $m \leq k$, en algún lugar el número de letras «c» y «r» se igualará. Si se sustituyen, desde el principio hasta dicho lugar inclusive, todas las letras «c» por «r», y todas las «r» por «c» y se elimina la primera letra «c», obtendremos justamente una distribución desfavorable de rublos y monedas de 50 k. en la cola. Esta se detendrá precisamente en el lugar en que, en la sucesión dada, por primera vez se igualó la cantidad de letras «c» y «r».

Hemos establecido así que el número de distribuciones desfavorables de rublos y monedas de 50 k. en la cola es exactamente igual a la cantidad de todas las permutaciones de m letras «r» y $k+1$ letras «c», que comienzan a partir de la letra «r». Si se elimina la primera letra, se obtienen todas las permutaciones posibles de $m-1$ letras «r» y $k+1$ letras «c». Y el número de estas permutaciones es igual a

$$P(m-1, k+1) = C_{m-1}^{m+k}.$$

Así, pues, el número de permutaciones desfavorables es igual a C_{m-1}^{m+k} . Como la cantidad de todas las permutaciones de m letras «r» y k letras «c» es igual a C_m^{m+k} , el número de las permutaciones favorables se expresa mediante la fórmula

$$C_m^{m+k} - C_{m-1}^{m+k} = \frac{k-m+1}{k+1} C_m^{m+k}. \quad (16)$$

En particular, si $k = m$, es decir, si en la cola hay una cantidad igual de rublos y monedas de 50 k., esta cola pasará en $\frac{1}{k+1} C_k^{2k}$ casos y se detendrá en $\frac{k}{k+1} C_k^{2k}$ casos. De esta manera, cuanto mayor sea k , menor será el porcentaje de casos favorables.

Nuestro problema queda totalmente resuelto. Ahora estudiaremos otro, muy próximo a éste. Precisamente, supongamos que el cajero era previsor y al principio había q monedas de 50 k. en la caja. ¿En cuántos casos pasará la cola sin detenciones, si ésta contiene m poseedores de rublos y k poseedores de monedas de 50 k.?

Está claro que si $m \leq q$, la cola pasará con seguridad sin detenciones: las monedas de 50 k. que había en la caja al principio alcanzarán para todos los poseedores de rublos. Si, en cambio, es $m > k + q$, la cola se detendrá seguramente: el número total de monedas de 50 k. en la caja y en la cola no bastará para dar el cambio a todos los poseedores de rublos. Por esto, nos podemos limitar a considerar el caso en que $q < m \leq k + q$.

Se puede considerar, ahora, que q monedas de 50 k. surgieron en la caja a causa de que al principio de la cola se colocaron q personas nuevas, cada una con una moneda de 50 k. Por esto, el problema se puede enunciar como sigue:

En la cola hay $k + q$ personas con monedas de 50 k. y m con rublos; los primeros q lugares están ocupados por poseedores de monedas de 50 k. ¿En cuántos casos nadie tendrá que esperar su cambio?

Este problema se resuelve en forma totalmente análoga al caso particular $q = 0$, analizado más arriba. Buscaremos el número de casos desfavorables. En cada uno de éstos, habrá una detención en la persona delante de la cual haya una cantidad igual s de rublos y monedas de 50 k., y que tenga en sus manos un rublo. Coloquemos delante de la cola una persona más con una moneda de 50 k. y cambiemos a las primeras,

$2s + 2$ personas los rublos por monedas de 50 k. y viceversa. Obtendremos una permutación de m rublos y $k + q + 1$ monedas de 50 k., estando los primeros $q + 1$ lugares ocupados por rublos. Además, cualquier permutación de este tipo se puede obtener de un solo modo de una distribución desfavorable de rublos y monedas de 50 k. Pero los primeros $q + 1$ rublos pueden ser eliminados, y entonces se obtienen todas las permutaciones posibles de $m - q - 1$ rublos y $k + q + 1$ monedas de 50 k. El número de estas permutaciones es igual a $P(m - q - 1, k + q + 1) = C_{m-q-1}^{m+h}$. Hemos demostrado que en nuestro problema hay C_{m-q-1}^{m+h} permutaciones no propicias. Como el número total de permutaciones es igual a C_k^{m+h} , la cantidad de las propicias se expresará mediante la fórmula

$$C_m^{m+h} - C_{m-q-1}^{m+h}. \quad (17)$$

El método utilizado más arriba permite resolver muchos otros problemas. Por ejemplo, aplicándolo es fácil obtener los siguientes resultados:

Si $m < k$, el número de permutaciones de m letras «r» y k letras «c» tales que delante de cada letra (excepto la primera) haya mayor cantidad de letras «c» que de «r», es igual a

$$C_m^{m+h-1} - C_{m-1}^{m+h-1} = \frac{k-m}{k} C_m^{m+h-1}. \quad (18)$$

El razonamiento se efectúa igual a como lo hicimos más arriba, sólo que sin agregar al comienzo la letra «c».

Esta fórmula es válida para $m < k$. Si fuere $m = k$, el número de permutaciones que poseen la propiedad indicada sería igual a $\frac{1}{k} C_{k-1}^{2k-2}$.

Esto puede comprobarse de la siguiente manera. Cada permutación de este tipo debe comenzar a partir de la letra «c» y terminar con una «r». Si se eliminan dichas letras, se obtiene una permutación de $k - 1$ letras «r» y $k - 1$ «c». Es fácil apreciar que para esta permutación la cola pasará sin tropiezos. Recíprocamente, de cada permutación de $k - 1$ letras «c» y $k - 1$ «r»,

para la cual la cola pase sin retenciones, se obtiene otra que posea la propiedad necesaria, si se agrega al comienzo una letra «c» y al final una «r». Pero el número de permutaciones de $k - 1$ letras «c» y $k - 1$ «r», para las cuales la cola pasa sin problemas, es justamente igual

$$a \frac{1}{k} C_{k-1}^{2k-2}.$$

PROBLEMA DE LAS DOS FILAS

En la combinatoria sucede a menudo que dos problemas, a primera vista muy distintos, se reducen uno al otro. Consideremos el siguiente problema:

¿De cuántas maneras se pueden formar $2n$ personas de distinta altura en dos filas de n personas cada una, de modo que en cada fila se hallen en orden de altura, y que cada persona de la primera fila sea mayor que la que se halla detrás de él en la segunda?

Demostremos que la resolución de este problema se reduce al que ya resolvimos, sobre la cola de la caja. Ubiquemos a las personas en dos filas de la forma requerida, démosle a cada uno de los que se hallan en la primera una moneda de 50 kopeks, y a cada uno de los de la segunda, un rublo, después de lo cual formémoslos en orden de altura en una sola fila. Se obtendrá una cola de n poseedores de monedas de 50 k. y n poseedores de rublos. De las condiciones del problema se deduce que esta cola pasará sin tropiezos. En efecto, supongamos que alguien ocupa el k -ésimo lugar de la segunda fila. Entonces, entre los poseedores de rublos habrá solamente $k - 1$ mayores que él. Y entre los poseedores de monedas de 50 k., habrá por lo menos k personas más altas que él (el que se halla delante de él y todos los que se hallan al lado derecho). Por esto, cuando llegue a la caja, habrá allí por lo menos una moneda de 50 k., con lo cual su vuelto queda asegurado.

Recíprocamente, supongamos que se fija alguna distribución de n personas con monedas de 50 k. y n personas con rublos, en la cual la cola pasa sin detenciones. Sin perder generalidad, se puede suponer que todas las $2n$ personas están ordenadas de acuerdo con su altura. Escojamos ahora a todos los poseedores de monedas de 50 k. y pongámoslos en orden de altura en la primera fila, y a los poseedores de rublos, en la segunda. Dejamos que el lector compruebe que la formación obtenida satisface las condiciones del problema. De aquí se deduce que hay tantas formaciones posibles como permutaciones propicias de n letras «c» y n «r», es decir, $\frac{1}{n+1} C_n^{2n}$.

NUEVAS PROPIEDADES DE LAS COMBINACIONES ¹

Las fórmulas deducidas en los apartados anteriores permiten establecer las propiedades ulteriores del número de combinaciones C_n^m (véase la pág. 35). Para esto, dividamos en clases todas las permutaciones «no propicias» de m letras «r» y k letras «c». Hemos visto que para estas permutaciones la cola se detiene en el lugar con el número $2s + 1$, habiendo delante de él s letras «r» y s letras «c»; en éste hay una letra «r», y la cola pasa, hasta este lugar, sin detenerse. Hagamos pertenecer a la s -ésima clase todas las permutaciones no propicias, para las que tiene lugar la detención en el lugar $2s + 1$. Está claro que s puede adquirir los valores $0, 1, 2, \dots, \dots, m - 1$.

Hallemos cuántas permutaciones figuran en la s -ésima clase. En los primeros $2s$ lugares puede haber permutaciones propicias cualesquiera de s letras «r» y s «c», puesto que hasta el lugar $2s + 1$ la cola no se detuvo. Como vimos, el número de estas permutaciones es igual a $\frac{1}{s+1} C_s^{2s}$. Ahora bien, en el lugar $2s + 1$ se

¹ Este apartado se puede omitir en la primera lectura.

halla la letra «r», y después de ésta, cualquier permutación de las $m-s-1$ letras «r» y $k-s$ letras «c» restantes. El número de estas permutaciones es igual a $P(m-s-1, k-s) = C_{m-s-1}^{m+h-2s-1}$. De este modo, en virtud de la regla del producto, el número de permutaciones desfavorables de la s -ésima clase es igual a

$$\frac{1}{s+1} C_s^{2s} C_{m-s-1}^{m+h-2s-1}.$$

Como el número total de permutaciones desfavorables es igual a C_{m-1}^{m+h} , y el de clases, a $m-1$, se obtiene, para $m \leq k$, la relación $C_0^4 C_{m-1}^{m+h-1} +$

$$+ \frac{1}{2} C_1^2 C_{m-2}^{m+h-3} + \frac{1}{3} C_2^4 C_{m-3}^{m+h-5} + \dots \\ \dots + \frac{1}{m} C_{m-1}^{2m-2} C_0^{h-m+1} = C_{m-1}^{m+h}. \quad (19)$$

Esta relación es un caso particular de la fórmula

$$\sum_{p=0}^{m-1} [C_s^{2s-p} C_{s-p-1}^{2s-p}] C_{m-s-1}^{m+h+p-2s-1} = C_{m-p-1}^{m+h}, \quad (20)$$

donde $p < m \leq p+k$ (en el primer sumando C_s^{-1} se considera igual a cero). La fórmula (20) se demuestra igual que la (19), dividiendo en clases las permutaciones desfavorables de m letras «r» y $k+p$ letras «c», para las cuales hay p letras «c» al comienzo (véase la pág. 53).

Pasemos ahora a las relaciones que se obtienen dividiendo en clases las permutaciones *propicias*, formadas por k letras «r» y k «c». El número de estas permutaciones es igual a $\frac{1}{k+1} C_k^{2k}$. Después de pasar toda la cola, en la caja nuevamente no habrá ni una moneda de 50 k.: todas se habrán gastado en el cambio. Sin embargo, para algunas permutaciones propicias surgirán también antes momentos en que en la caja no haya monedas de 50 k.; sólo el hecho que el siguiente espectador da una moneda de 50 k. salva la cola de una demora. Dividamos todas las permutaciones propicias en clases, haciendo pertenecer a la

s -ésima todas las permutaciones en las que la caja por primera vez se queda sin monedas de 50 k. en el $2s$ -ésimo lugar, $s=1, 2, \dots, k$.

Hallemos el número de permutaciones de la s -ésima clase. Cada una de estas permutaciones se divide en dos partes. Las primeras $2s$ letras forman una permutación de s letras «c» y s «r», tal que delante de cada una de sus letras hay más «c» que «r» (de no ser así, el emparejamiento habría tenido lugar por primera vez no en el $2s$ -ésimo lugar, sino antes). Hemos visto que el número de estas permutaciones es igual a $\frac{1}{s} C_{s-1}^{2s-2}$

(véase la pág. 55). Después de vender los primeros $2s$ billetes, no habrá monedas de 50 k. en la caja. Por esto, para que la cola se suceda sin detenciones, las últimas $k-s$ letras «r» y $k-s$ «c» deben formar una permutación propicia. Pero el número de tales permutaciones es igual a $\frac{1}{k-s+1} C_{k-s}^{2k-2s}$ (véase la pág. 53).

En virtud de la regla del producto, obtenemos que en la clase habrá

$$\frac{1}{s(k-s+1)} C_{s-1}^{2s-2} C_{k-s}^{2k-2s}$$

permutaciones. Y como el número total de permutaciones propicias es igual a $\frac{1}{k+1} C_k^{2k}$, se obtiene la identidad

$$\sum_{s=1}^k \frac{k+1}{s(k+s-1)} C_{s-1}^{2s-2} C_{k-s}^{2k-2s} = C_k^{2k}. \quad (21)$$

Si introducimos la notación

$$\frac{1}{s+1} C_s^{2s} = T_s,$$

la fórmula (21) adquiere la siguiente forma:

$$T_0 T_{k-1} + T_1 T_{k-2} + \dots + T_{k-1} T_0 = T_k. \quad (22)$$

Otra relación entre los números C_m^n se obtiene como sigue. Fijemos un número l , $1 \leq l \leq m$, y dividamos el conjunto de todas las permutaciones propicias en clases, haciendo pertenecer a la s -ésima todas las permutaciones que contienen entre sus primeros l elementos exacta-

mente s letras «e». Entonces, el número de letras «e» entre los primeros l elementos será igual a $l - s$. Como debe haber no menos letras «e» que letras «r», s satisfará las desigualdades $0 \leq 2s \leq l$.

Hallemos el número de permutaciones de la s -ésima clase. Cada permutación de este tipo se divide en dos partes: una la forman las primeras l letras, y la otra, las últimas $k + m - l$. En la primera parte figuran $l - s$ letras «e» y s letras «r». Además, como toda la permutación es propicia, también su parte formada por las primeras l letras será propicia. Y de $l - s$ letras «e» y s «r» se pueden formar $\frac{l-2s+1}{l-s+1} C_s^l$ permutaciones de este tipo.

Después de que pase la primera parte de la permutación, en la caja habrá $l - 2s$ monedas de 50 k. La segunda parte está formada por $k - l + s$ letras «e» y $m - s$ letras «r». El número de permutaciones en las cuales esta parte de la cola pasa sin detenciones se calcula mediante la fórmula (17) de la pág. 54, en la cual hay que sustituir q por $l - 2s$, m por $m - s$ y k por $k - l + s$. De esta fórmula se desprende

que la segunda parte de la permutación se puede escoger de $C_{m-s}^{m+k-l} - C_{m+s-l-1}^{m+k-l}$ maneras. En virtud de la regla del producto, obtenemos que el número de permutaciones de la s -ésima clase es igual a

$$\frac{l-2s+1}{l-s+1} C_s^l \{C_{m-s}^{m+k-l} - C_{m+s-l-1}^{m+k-l}\}.$$

Como el número total de permutaciones propicias de k letras «e» y m letras «r» es igual a $\frac{k-m+1}{k+1} C_m^{m+k}$, se llega a la identidad¹

$$E\left(\frac{l}{2}\right) \sum_{s=0}^{l-2s+1} \frac{l-2s+1}{l-s+1} C_s^l \{C_{m-s}^{m+k-l} - C_{m+s-l-1}^{m+k-l}\} = \frac{k-m+1}{k+1} C_m^{m+k}. \quad (23)$$

(Aquí C_p^r se considera igual a cero para $p < 0$.) El lector puede deducir sin dificultad relaciones análogas, estableciendo unos u otros métodos de separación de las permutaciones en clases.

¹ $E\left(\frac{l}{2}\right)$ designa la parte entera del número $\frac{l}{2}$.

COMBINATORIA DE LAS PARTICIONES

En los problemas sobre arreglos, permutaciones y combinaciones de elementos dados, se formaban distintas disposiciones, y contábamos cuántas se obtenían bajo unas u otras limitaciones. El destino de los elementos que quedaban después de elegir las disposiciones casi no nos interesaba. Otra forma tienen los problemas que analizaremos ahora. En éstos, los elementos se dividen en dos o más grupos, y deben hallarse todas las formas de tal partición.

Aquí pueden encontrarse distintos casos. A veces, juega un papel fundamental el orden de los elementos en los grupos: por ejemplo, cuando el señalero cuelga banderines de señal en varios mástiles, a éste le interesa no sólo en qué mástil quede uno u otro banderín, sino también en qué orden se cuelgan éstos. En otros casos, el orden de los elementos en los grupos no tiene importancia alguna. Cuando el jugador de dominó escoge las fichas del montón, le es indiferente en qué orden le llegarán, y le importa sólo el resultado definitivo.

Los problemas se diferencian también en si tiene o no importancia el orden de los propios grupos. En el dominó, los jugadores están sentados en un orden determinado, e interesa no sólo cómo fueron divididas las fichas, sino también a quién le tocaron qué fichas. Si yo distribuyo fotografías en sobres iguales para mandárselas a mi amigo, es esencial cómo se distribuyen las fotos en los sobres, pero el orden de los propios sobres es totalmente indiferente: en el correo lo mezclarán de todos modos.

También es de importancia el hecho de si diferenciamos o no entre sí a los propios elementos, así como también si diferenciamos o no entre sí a los grupos en que se dividen los elementos. Por último, en algunos problemas ciertos grupos pueden resultar vacíos, es decir, pueden no contener ningún elemento, y en otros problemas estos grupos no se admiten. En correspondencia con todo lo expuesto, surge toda una serie de diferentes problemas combinatorios sobre particiones.

EL JUEGO DEL DOMINO

En el dominó 4 jugadores dividen en partes iguales 28 fichas. ¿De cuántas formas pueden hacerlo?

La división de fichas se puede efectuar como sigue. Primero, dispongamos de alguna forma las 28 fichas en fila. Después, el primer jugador toma las primeras 7 fichas, el segundo las 7 siguientes, el tercero, las 7 que le siguen, y el cuarto se queda con el resto. Está claro que de este modo se pueden obtener todas las posibles divisiones de las fichas.

Como el número de todas las permutaciones posibles de 28 elementos es igual a $28!$, podría parecer que el número total de todas las formas de reparto es igual a $28!$ Pero esto es incorrecto, ya que al primer jugador le es totalmente indiferente qué tomar primero: la ficha 6 : 6 o la 3 : 4; le interesa sólo el resultado definitivo. Por esto, cualquier permutación de las primeras 7 fichas no cambia la esencia de la cuestión. Tampoco la cambia cualquier permutación de las segundas 7, ni de las 7 siguientes, ni de las últimas 7. En virtud de la regla del producto, se obtienen $(7!)^4$ permutaciones de fichas que no cambian el resultado del reparto.

Así, pues, las $28!$ permutaciones se dividen en grupos que contienen $(7!)^4$ permutaciones cada uno, y las de cada grupo conducen a una misma distribución de fichas. De aquí se deduce que el número de formas de distribuir las fichas es igual a $\frac{28!}{(7!)^4}$. Este número es aproximadamente igual a $4,7 \cdot 10^{15}$.

El mismo resultado se puede obtener de otro modo. El primer jugador debe escoger 7 fichas de entre 28. Como el orden de estas fichas es indiferente, tiene C_7^{28} variantes de elección. Después de esto, el segundo jugador debe escoger 7 fichas de entre las 21 restantes. Esto se puede efectuar de C_7^{21} maneras. El tercer jugador escoge de entre 14 fichas, por lo cual dispone de C_7^{14}

posibilidades de elección. Por último, al cuarto jugador le quedan C_1^2 , es decir, una sola elección.

Según la regla del producto, obtenemos que el número total de posibilidades es igual a

$$C_3^3 \cdot C_2^2 \cdot C_1^1 \cdot C_0^0 = \frac{28!}{21! 7!} \cdot \frac{21!}{14! 7!} \cdot \frac{14!}{7! 7!} = \frac{28!}{(7!)^4}.$$

En forma totalmente análoga se demuestra que en el juego de la «*préférences*», en que 32 cartas se dividen entre tres jugadores, dando 10 a cada uno y dejando dos en el montón, el número de repartos diferentes es igual a

$$\frac{32!}{10! 10! 10! 2!} = 2\,753\,294\,408\,504\,640.$$

Es posible que el lector se pregunte si vale la pena gastar el tiempo en el estudio de los juegos de naipes. Aquí nos permitiremos recordar que precisamente el estudio de los juegos de azar sirvió de estímulo para el desarrollo inicial de la combinatoria y de la teoría de las probabilidades. Matemáticos eminentes, como Pascal, Bernoulli, Euler, Chébishev, pulsan las ideas y los métodos de la combinatoria y la teoría de las probabilidades en los problemas sobre los juegos a cara o cruz, a los dados y a los naipes. Muchas ideas de la teoría de los juegos (disciplina matemática que se aplica ampliamente en la economía y la ciencia militar) cristalizaron por primera vez en el estudio de los modelos más sencillos de los juegos de naipes.

LA DISTRIBUCION EN CAJONES

Los problemas del dominó y de la «*préférences*» pertenecen a los problemas combinatorios sobre la distribución de objetos en cajones, cuyo planteamiento general es el siguiente:

Se dan n objetos diferentes y k cajones. Hay que colocar n_1 objetos en el primer cajón, n_2 en el segundo, ..., n_k en el k-ésimo, siendo $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. ¿De cuántas maneras se puede efectuar dicha distribución?

En el problema del dominó el papel de cajones lo desempeñaban los jugadores, siendo las fichas los objetos. Razonando análogamente a como lo hicimos en este problema, obtenemos la respuesta en el caso general: el número de distribuciones diferentes en cajones es igual a

$$P(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}. \quad (1)$$

Esta fórmula la obtuvimos antes, al resolver el siguiente problema, a primera vista nada semejante:

Se dan objetos de k tipos diferentes. ¿Cuántas permutaciones distintas se pueden formar de n_1 objetos del primer tipo, n_2 del segundo, ..., n_k del k-ésimo?

Aquí también la respuesta se expresaba mediante la fórmula

$$P(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!},$$

donde $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ (véase la pág 28). Para establecer el nexo entre estos problemas, numeremos todos los n lugares que pueden ocupar nuestros objetos. A cada permutación le corresponde una distribución de los números de los lugares en k clases. En la primera clase quedan los números de los lugares en los que se hallan objetos del primer tipo; en la segunda, los de los lugares de los objetos del segundo tipo, etc. Con esto se establece una correspondencia entre las permutaciones con repetición y la distribución de números de lugares en «cajones». Queda ahora claro que las fórmulas de solución de ambos problemas deben coincidir.

EL RAMO DE FLORES

En el problema sobre la distribución de elementos en cajones suponíamos conocida la cantidad de objetos que quedaban en cada cajón (por ejemplo, el número de fichas que debía tomar cada jugador). En la mayoría de los pro-

blemas sobre distribuciones de objetos, estas cantidades no se indican.

Dos niños recogieron 10 margaritas, 15 claveles y 14 nomeolvides. ¿De cuántas maneras pueden dividir estas flores?

Está claro que las margaritas se pueden dividir de 14 maneras: el primero puede no tomar ninguna, tomar 1, 2, ..., todas las 10. De igual forma, los claveles se pueden dividir de 16 maneras, y los nomeolvides, de 15. Como las flores de cada tipo pueden distribuirse independientemente de las de los otros tipos, en virtud de la regla del producto se obtienen $14 \cdot 16 \cdot 15 = 2640$ formas de distribuir las flores.

Se sobreentiende que entre estas formas las hay extremadamente injustas, en las cuales, por ejemplo, uno de los niños se queda sin flores. Introduzcamos, por esto, la limitación de que cada niño debe recibir no menos de 3 flores de cada tipo. Entonces las margaritas se pueden distribuir sólo de cinco formas: el primer niño puede quedarse con 3, 4, 5, 6 ó 7 flores. De igual forma, los claveles se pueden dividir de 10 maneras, y los nomeolvides, de 9. En este caso, el número total de modos de distribución es igual a $5 \cdot 10 \cdot 9 = 450$.

En general, si se dispono de n_1 objetos de un tipo, n_2 de otro. . . ., n_k del k -ésimo, se los puede distribuir entre dos personas de

$$(n_1 + 1)(n_2 + 1) \dots (n_k + 1) \quad (2)$$

maneras. En particular, si todos los objetos se diferencian entre sí y su número es igual a k , será $n_1 = n_2 = \dots = n_k = 1$, habiendo, por ende, 2^k formas de distribución.

Si se agrega la limitación complementaria de que cada participante de la distribución debe obtener no menos de s_1 objetos del primer tipo, s_2 del segundo, . . . , s_k del k -ésimo, el número de modos de división se expresa por la fórmula

$$(n_1 - 2s_1 + 1)(n_2 - 2s_2 + 1) \dots (n_k - 2s_k + 1). \quad (3)$$

Dejamos que el lector demuestre estas afirmaciones.

PROBLEMA SOBRE EL NUMERO DE DIVISORES

La fórmula (2) que dedujimos permite resolver el siguiente problema de la teoría de los números:

Hallar cuántos divisores tiene el número natural N . Para resolverlo, descompongamos N en factores primos: $N = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$, siendo p_1, \dots, p_k números primos diferentes. Por ejemplo, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Al desarrollar al número N en dos factores, $N = N_1 N_2$, los factores simples se distribuyen entre N_1 y N_2 . Si en N_i el factor p_j figura m_j veces, $j = 1, \dots, k$, el desarrollo tendrá la forma

$$N = (p_1^{m_1} \dots p_k^{m_k})(p_1^{n_1 - m_1} \dots p_k^{n_k - m_k}).$$

De este modo, el desarrollo de N en dos factores se reduce a dividir n_1 elementos del primer tipo, n_2 del segundo, . . . , n_k del k -ésimo, en dos partes. Y la fórmula (2) demuestra que esto se puede efectuar de $(n_1 + 1) \dots (n_k + 1)$ maneras. Por consiguiente, el número de divisores del número natural $N = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ es igual a $(n_1 + 1) \dots (n_k + 1)$. Este número se designa mediante $\tau(N)$.

LA RECOLECCION DE MANZANAS

Tres niños juntaron 40 manzanas del árbol. ¿De cuántas maneras pueden dividir las, si todas las manzanas se consideran iguales (es decir, si sólo nos interesa cuántas manzanas obtiene cada uno, y no cuáles manzanas le tocan)?

Para resolver este problema procedamos como sigue: agreguemos a las manzanas recolectadas 2 peras iguales, y después permutemos de todas las formas posibles 40 manzanas y 2 peras. Según la fórmula de las permutaciones con repetición, el número de estas permutaciones es igual a

$$P(40, 2) = C_2^{42} = \frac{42!}{40!2!} = 861.$$

Pero a cada permutación le corresponde su forma de distribución de las manzanas. Al primer niño le daremos todas las manzanas, desde la primera hasta la primera pera; al segundo, todas las que quedan entre la primera y la segunda pera; al tercero, todas las que quedan después de la segunda pera. Está claro que en nuestro caso a diferentes permutaciones les corresponden distintas formas de reparto. Así, pues, el número total de maneras de reparto es igual a 864. Aquí puede suceder que a un participante (e inclusive a dos de ellos) del reparto no le toque nada. Por ejemplo, si una de las peras queda al principio en cierta permutación, se queda sin manzanas el primer niño; si queda al final, será el tercero el que no las obtenga. Si ambas peras resultan estar una al lado de la otra, el segundo no obtendrá nada. Dejamos que el lector analice lo que sucede si ambas peras quedan al principio o al final.

En forma totalmente análoga se demuestra que n objetos iguales se pueden distribuir entre k personas de

$$P(n, k-1) = C_{k-1}^{n+k-1} = C_{k-1}^{n+h-1} \quad (4)$$

maneras.

Supongamos ahora que para mayor equitatividad en el reparto se convino que cada participante debe obtener por lo menos r objetos. En este caso, hay que comenzar por dar a cada uno r objetos. Después, quedarán $n - kr$ objetos que pueden ya ser distribuidos arbitrariamente. Esto se puede efectuar, como vimos, de $C_{k-1}^{n-hr+k-1} = C_{k-1}^{n-h(r-1)-1}$ formas.

En particular, si cada uno de los k participantes debe obtener no menos de un objeto, el problema se resuelve de C_{k-1}^{n-1} modos.

El último resultado se puede deducir también por otro método. Dispongamos los n objetos dados en fila. Entonces, entre ellos habrá $n - 1$ intervalos. Si en cualesquiera $k - 1$ de estos intervalos se ponen tabiques de separación, todos los objetos se dividirán en k partes no vacías. Después de esto, la primera parte se

transmite a la primera persona, la segunda a la segunda, etc. Como $k - 1$ tabiques se pueden colocar en $n - 1$ intervalos de C_{k-1}^{n-1} maneras, el número de formas de distribución será igual a C_{k-1}^{n-1} .

LA RECOLECCIÓN DE HONGOS

Si se reparten objetos de distintos tipos, hay que hallar el número de formas de reparto para cada tipo y multiplicar los números obtenidos. Resolvamos, por ejemplo, el siguiente problema:

¿De cuántas maneras se pueden repartir 10 hongos blancos, 15 setas y 8 trufas entre 4 niños?

Aplicando los resultados del apartado anterior, se obtiene la respuesta en la forma

$$C_3^8 C_3^8 C_3^8 C_3^8 = 41\,774\,040.$$

Si, en cambio, cada uno debe recibir por lo menos un hongo de cada tipo, la respuesta será

$$C_3^7 C_3^7 C_3^7 C_3^7 = 1\,070\,160.$$

En el caso en que se dividen n objetos diferentes entre k personas sin limitaciones, cada objeto puede ser entregado de k formas (dándosele a uno de los participantes del reparto). Por esto, el número de soluciones será igual a k^n .

Por ejemplo, 8 pasteles distintos se pueden distribuir entre 5 personas de $5^8 = 390\,625$ maneras.

EL ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS

Yo quiero enviar a mi amigo 8 fotos distintas. ¿De cuántas maneras puedo hacerlo, utilizando 5 sobres diferentes?

Este problema es similar al que resolvimos al final del apartado anterior. Por esto, parecería ser que la respuesta es $5^8 = 390\,625$. Sin embargo, no tiene sentido enviar sobres vacíos, por lo cual se impone una nueva limitación: ningún sobre debe ser vacío. Para tener en cuenta esta limitación, utilicemos la fórmula de inclusiones y ex-

clusiones (la respuesta C_{k-1}^{n-1} es incorrecta, ya que las fotografías son distintas).

Hallemos primeramente en cuántas formas de distribución r sobres dados resultan vacíos (y los demás pueden tanto ser vacíos como contener fotos). En este caso, las fotografías se colocan sin limitaciones en $5-r$ sobres y, en virtud de lo demostrado más arriba, el número de estas distribuciones es igual a $(5-r)^5$.

Pero r sobres se pueden escoger, de entre 5, de C_r^5 maneras. De aquí se deduce, aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, que el número de distribuciones en las que ningún sobre queda vacío es igual a

$$5^5 - C_1^5 \cdot 4^5 + C_2^5 \cdot 3^5 - C_3^5 \cdot 2^5 + C_4^5 \cdot 1^5 = 126\ 020.$$

En forma totalmente análoga se demuestra que si se envían n fotografías distintas en k sobres diferentes, sin que ningún sobre sea vacío, el número de formas de distribución se expresa mediante la fórmula

$$k^n - C_1^k (k-1)^n + C_2^k (k-2)^n - \dots + (-1)^{k-1} C_{k-1}^k \cdot 1^n. \quad (5)$$

Proponemos al lector resolver el siguiente problema:

Se dan n_1 objetos del primer tipo, n_2 del segundo, ..., n_s del s -ésimo. ¿De cuántas maneras se los puede repartir entre k personas de modo que cada una obtenga por lo menos un objeto?

La respuesta es la siguiente:

$$\begin{aligned} & C_{k-1}^{n_1+h-1} C_{k-1}^{n_2+h-1} \dots C_{k-1}^{n_s+h-1} - \\ & - C_1^k C_{k-2}^{n_1+h-2} C_{k-2}^{n_2+h-2} \dots C_{k-2}^{n_s+h-2} + \\ & + C_2^k C_{k-3}^{n_1+h-3} C_{k-3}^{n_2+h-3} \dots C_{k-3}^{n_s+h-3} - \dots \\ & \dots + (-1)^{k-1} C_{k-1}^k. \quad (6) \end{aligned}$$

Por ejemplo, si se reparten 8 manzanas, 10 peras y 7 naranjas entre 4 niños y cada uno debe recibir por lo menos una fruta, el reparto es posible de

$$\begin{aligned} & C_3^4 C_3^3 C_3^0 - C_1^4 C_1^3 C_1^0 C_1^0 + C_2^4 C_2^2 C_2^0 C_2^0 + C_3^4 C_3^1 C_3^1 C_3^0 - C_3^4 = \\ & = 5\ 464\ 800 \end{aligned}$$

maneras.

BANDERAS EN LOS MÁSTILES

Hasta ahora no teníamos en cuenta el orden en que están distribuidos los elementos de una parte dada. En algunos problemas este orden debe ser tomado en consideración.

Se tienen n banderines de señales distintos y k mástiles, en los cuales éstos se cuelgan. El sentido de la señal depende del orden en que están colgados los banderines. ¿De cuántas maneras se los puede colgar, si deben ser utilizados todos ellos, pero algunos mástiles pueden resultar vacíos?

Cada modo de colgar los banderines se puede efectuar en dos etapas. En la primera, intercambiamos de todas las formas posibles los n banderines dados. Esto se puede efectuar de $n!$ maneras. Después, tomamos una de las formas de distribución de n banderines iguales en k mástiles (recordemos que el número de estas formas es igual a C_{k-1}^{n-h-1}). Supongamos que esta forma consiste en que en el primer mástil deben colgarse n_1 banderines, en el segundo, n_2 , ..., en el k -ésimo, n_k , siendo $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Entonces tomamos los primeros n_1 banderines de la permutación dada y los colgamos, en el orden obtenido, en el primer mástil; los siguientes n_2 banderines son colgados en el segundo, etc. Está claro que, utilizando todas las permutaciones de n banderines y todas las formas de distribución de n banderines iguales en k mástiles, obtenemos todas las maneras de resolver el problema planteado. En virtud de la regla del producto, se obtiene que el número de modos de colgar los banderines es igual a

$$n! C_{k-1}^{n+k-1} = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)!} = A_n^{n+k-1}. \quad (7)$$

En general, si se tienen n objetos distintos, el número de formas de distribuirlos en k cajones diferentes, teniendo en cuenta el orden de su disposición en los cajones, es igual a A_n^{n+k-1} .

El mismo resultado puede ser obtenido por otro camino. Agreguemos a los n objetos distri-

buidos $k - 1$ esferas iguales y consideremos todas las permutaciones posibles de los $n + k - 1$ objetos obtenidos. Cada una de estas permutaciones determina una de las formas de distribución. Precisamente, en el primer cajón se colocan todos los objetos que van hasta la primera esfera agregada (si el primer objeto de la permutación es una de las esferas agregadas, el primer cajón quedará vacío). Después, en el segundo cajón se colocan todos los objetos que quedaron entre la primera y la segunda esfera, . . . , en el k -ésimo, todos los que van después de la $(k - 1)$ -ésima esfera. Está claro que entonces se obtienen todas las distribuciones de objetos que poseen las propiedades indicadas. Pero el número de permutaciones de n objetos distintos y $k - 1$ esferas iguales es

$$P(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n \text{ veces}}, k-1) = \frac{(n+k-1)!}{1! \dots 1!(k-1)!} = A_n^{n+k-1}.$$

Análogamente se resuelve el problema en el caso en que en cada mástil debe hallarse por lo menos un banderín (o, lo que es lo mismo, en cada cajón debe haber por lo menos un objeto). Mediante la fórmula deducida en la pág. 61, obtenemos que en este caso disponemos de $n! C_{k-1}^{n-1}$ formas de distribución. Este resultado también puede ser obtenido mediante la elección de los puntos de separación entre $n - 1$ intervalos.

NUMERO TOTAL DE SEÑALES

Hasta ahora hemos considerado que todos los banderines debían ser utilizados para transmitir una señal. Pero puede haber señales para cuya transmisión se utiliza solamente una parte de los banderines, admitiéndose también mástiles vacíos. Hallemos el número total de señales que

pueden ser transmitidas mediante n banderines de señales, colgados en k mástiles.

Dividamos estas señales en clases, según el número de banderines que participen en ellas.

En virtud de la fórmula (7), mediante s banderines dados se pueden transmitir A_s^{n+k-1} señales (el número de mástiles es igual a k). Pero s banderines pueden ser escogidos de entre n de C_n^s maneras. Por esto, el número de todas las señales de la s -ésima clase es igual a $C_n^s A_s^{n+k-1}$. En consecuencia, el número total de señales se expresa mediante la fórmula

$$C_0^n A_0^{n+k-1} + C_1^n A_1^{n+k-1} + C_2^n A_2^{n+k-1} + \dots + C_n^n A_n^{n+k-1}. \quad (8)$$

Por ejemplo, mediante 6 banderines distintos en 3 mástiles se pueden transmitir

$$1 + C_1^6 A_1^3 + C_2^6 A_2^3 + C_3^6 A_3^3 + C_4^6 A_4^3 + C_5^6 A_5^3 + C_6^6 A_6^3 = 42\,079$$

señales.

Si no se admite que algunos mástiles estén vacíos, en lugar de la fórmula (8) obtenemos

$$C_k^n C_{k-1}^{k-1} + C_{k+1}^n C_{k-1}^{k+1} + \dots + C_{k+2}^n C_{k-1}^{k+2} + \dots + C_n^n C_{k-1}^{n-1} \quad (9)$$

maneras.

DIFERENTES ESTADÍSTICAS

Los problemas sobre la distribución de elementos en cajones son de gran importancia para la física estadística. Esta ciencia estudia cómo se distribuyen, según sus propiedades, las partículas físicas; por ejemplo, qué parte de las moléculas de un gas dado tiene, a una temperatura dada, una u otra velocidad. En estos casos, el conjunto de todos los estados posibles se distribuye en un gran número k de pequeñas celdas (estados de fase), de forma que cada una de las n partículas queda en una de las celdas.

El problema sobre a qué estadística se someten unas u otras partículas depende del tipo de éstas.

En la física estadística clásica, creada por Maxwell y Boltzmann, las partículas se consideran diferenciables entre sí. A dicha estadística se someten, por ejemplo, las moléculas de un gas. Ya sabemos que n partículas diferentes se pueden distribuir en k celdas de k^n maneras. Si todas estas k^n maneras tienen igual probabilidad, para una energía dada, se habla de la *estadística de Maxwell-Boltzmann*.

Resultó ser que a esta estadística se someten no todos los objetos físicos. Los fotones, los núcleos atómicos y los átomos con número par de partículas elementales se someten a otra estadística, desarrollada por Einstein y por el científico indio Bose. En la *estadística de Bose-Einstein*, las partículas se consideran indistinguibles entre sí. Por esto, interesa sólo cuántas partículas quedaron en una u otra celda, y no qué partículas han quedado allí. Este problema es similar al del reparto de las manzanas (véase la pag. 61). Ya sabemos que con este planteamiento se obtienen $C_{k-1}^{n+k-1} = C_n^{n+k-1}$ distintas maneras de distribución. En la estadística de Bose-Einstein todas estas formas se consideran igualmente probables.

Sin embargo, para muchas partículas, por ejemplo, tales como los electrones, protones y neutrones, tampoco sirve la estadística de Bose-Einstein. Para éstas puede haber en cada celda no más de una partícula, y distintas distribuciones que satisfagan la condición indicada poseen igual probabilidad. En este caso, puede haber C_k^n distribuciones diferentes. Esta estadística se denomina *estadística de Dirac-Fermi*.

PARTICIONES DE NUMEROS

En la mayoría de los problemas considerados más arriba, los objetos que debían ser distribuidos eran diferentes. Pasemos ahora a problemas en que todos los objetos distribuidos son totalmente iguales. En este caso, se puede decir no que se dividen objetos, sino que se dividen

los números naturales en sumandos (los cuales, claro está, también deben ser números naturales).

Aquí surgen muchos problemas distintos. En unos, se tiene en cuenta el orden de los sumandos, y en otros, no. Se pueden considerar sólo las particiones en un número par de sumandos, o nada más que en un número impar de éstos, en diferentes sumandos, o en una cantidad arbitraria de ellos, etc. El método fundamental de resolución de los problemas sobre la partición es la reducción a problemas sobre la partición de números menores, o sobre la partición en menor número de sumandos.

EL ENVÍO DE LA ENCOMIENDA

Por el envío de una encomienda hay que pagar 18 kopeks. De cuántas formas se la puede pagar con estampillas de valor de 4, 6 y 10 k., si dos formas que se diferencien en el orden de las estampillas se consideran diferentes?

Sea $f(N)$ el número de maneras con que se pueden pegar estampillas de 4, 6 y 10 k. de forma que el costo total de ellas sea igual a N . Entonces, para $f(N)$ es válida la siguiente relación:

$$f(N) = f(N-4) + f(N-6) + f(N-10). \quad (10)$$

En efecto, sea dada alguna forma de pegar las estampillas de costo total N y supongamos que la última estampilla pegada tenía un valor de 4 k. Entonces, todas las estampillas restantes cuestan $N - 4k$. Recíprocamente, agregando a cualquier agrupación de estampillas de costo total $N - 4k$, una de 4 k., se obtiene una agrupación de estampillas, de costo N k. Además, de distintas agrupaciones de costo $N - 4k$ se obtienen diferentes agrupaciones de costo N k. Así, pues, el número de agrupaciones buscadas en que la última estampilla pegada era de costo 4 k., igual a $f(N - 4)$.

¹ La reserva de estampillas de distinto valor se considera ilimitada.

Análogamente se demuestra que el número de agrupaciones que terminan en una estampilla de seis kopeks es igual a $f(N-6)$, y las que lo hacen en una de diez, a $f(N-10)$. Como cualquier agrupación termina en una estampilla de uno de los tipos indicados, en virtud de la regla de la suma se obtiene la relación (10).

La fórmula (10) nos permite reducir el problema de pegar estampillas que sumen N k. a problemas de pegar estampillas que sumen menos. Pero para pequeños valores de N este problema se resuelve con facilidad directamente. Un cálculo sencillo demuestra que

$$f(0)=1, f(1)=f(2)=f(3)=0, f(4)=1, f(5)=0, \\ f(6)=1, f(7)=0, f(8)=1, f(9)=0.$$

La igualdad $f(0)=1$ significa que la suma de 0 k. se puede pagar sólo de una forma: no pegando ninguna estampilla. Las sumas de 1, 2, 3, 5, 7 y 9 k. no pueden ser obtenidas de ningún modo mediante estampillas de 4, 6 y 10 k. Utilizando los valores de $f(N)$ para $N=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, es fácil hallar $f(10)$:

$$f(10)=f(6)+f(4)+f(0)=3.$$

Después de esto hallamos

$$f(11)=f(7)+f(5)+f(1)=0,$$

$$f(12)=f(7)+f(6)+f(2)=2,$$

etc. Por último, obtenemos el valor $f(18)=8$. De este modo, las estampillas pueden ser pegadas de ocho formas. Estas son las siguientes:

$$10, 4, 4; 4, 10, 4; 4, 4, 10; 6, 4, 4, 4; 4, 6, 4, 4; \\ 4, 4, 6, 4; 4, 4, 4, 6; 6, 6, 6.$$

Obsérvese que los valores de $f(N)$ para $N=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ se podrían haber obtenido de otro modo, sin efectuar la verificación directa. Resulta que para $N < 0$ se tiene $f(N)=0$, ya que es imposible pagar una suma negativa, pegando una cantidad no negativa de estampillas. Al mismo tiempo, como hemos visto, es

$f(0)=1$. Por esto,

$$f(1)=f(-3)+f(-5)+f(-9)=0.$$

De igual forma obtenemos los valores $f(2)=0$,

$f(3)=0$. Y para $N=4$, obtenemos

$$f(4)=f(0)+f(-2)+f(-6)=1.$$

PROBLEMA GENERAL SOBRE EL PEGADO DE LAS ESTAMPILLAS

El problema analizado es un caso particular del siguiente problema general:

Se dispone de estampillas de valores de n_1, n_2, \dots, n_k kopeks¹. De cuántas maneras se puede pagar con ellas una suma de N kopeks, si dos formas que se diferencian en el orden se consideran distintas?

En este caso, el número $f(N)$ de formas satisface la relación

$$f(N)=f(N-n_1)+f(N-n_2)+\dots \\ \dots+f(N-n_k). \quad (11)$$

Aquí es $f(N)=0$ si $N < 0$, y $f(0)=1$. Mediante la relación (11), se puede hallar $f(N)$ para todo N , calculando sucesivamente $f(1), f(2), \dots, f(N-1)$.

Consideremos un caso particular de este problema, cuando $n_1=1, n_2=2, \dots, n_k=k$. Obtenemos todas las divisiones posibles del número N en los sumandos 1, 2, \dots, k , y las divisiones que so diferencian en el orden de los sumandos se consideran diferentes. Designemos el número de estas divisiones mediante $\varphi(k; N)^2$. De la fórmula (11) se deduce que

$$\varphi(k; N)=\varphi(k; N-1)+\varphi(k; N-2)+\dots \\ \dots+\varphi(k; N-k). \quad (12)$$

Además, se tiene que

$$\varphi(k; 0)=1 \quad \text{y} \quad \varphi(k; N)=0 \quad \text{si} \quad N < 0.$$

¹ Todos los números n_1, n_2, \dots, n_k son diferentes, y la reserva de estampillas es ilimitada.

² Aquí y en lo sucesivo indicaremos en el primer lugar el número de sumandos, en el segundo, el número que se divide, y en el último, limitaciones sobre la magnitud de los sumandos.

El cálculo de $\varphi(k; N)$ se puede simplificar, si se observa que

$$\varphi(k; N-1) = \varphi(k; N-2) + \dots \\ \dots + \varphi(k; N-k) + \varphi(k; N-k-1),$$

por lo cual

$$\varphi(k; N) = 2\varphi(k; N-1) - \varphi(k; N-k-1). \quad (13)$$

Está claro que los sumandos no pueden ser mayores que N . Por esto, $\varphi(N, N)$ es igual al número de todas las particiones de N en sumandos naturales (incluyendo también la «partición» $N = N$). Si el número de sumandos es igual a s , obtenemos C_{s-1}^{N-1} particiones (véase la pág. 61). Por esto,

$$\varphi(N, N) = C_0^{N-1} + C_1^{N-1} + \dots + C_{N-1}^{N-1} = 2^{N-1}.$$

Así pues, hemos demostrado que el número natural N puede ser dividido en sumandos de 2^{N-1} formas. Recuérdese que aquí se tiene en cuenta el orden de los sumandos.

Por ejemplo, el número 5 se puede dividir en sumandos de $2^{5-1} = 16$ maneras:

$$\begin{array}{lll} 5 = 5 & 5 = 3+1+1 & 5 = 1+2+2 \\ 5 = 4+1 & 5 = 1+3+1 & 5 = 2+1+1+1 \\ 5 = 1+4 & 5 = 1+1+3 & 5 = 1+2+1+1 \\ 5 = 2+3 & 5 = 2+2+1 & 5 = 1+1+2+1 \\ 5 = 3+2 & 5 = 2+1+2 & 5 = 1+1+1+2 \\ & & 5 = 1+1+1+1+1. \end{array}$$

PROBLEMAS COMBINATORIOS DE LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

Un problema similar al que acabamos de resolver se encuentra en la teoría de la información. Supongamos que una información se transmite mediante señales de varios tipos. La duración de la transmisión de una señal del primer tipo es igual a t_1 , del segundo, a t_2 , ..., del k -ésimo a t_k unidades de tiempo. ¿Cuántas informaciones distintas pueden transmitirse mediante estas señales en T unidades de tiempo? Aquí se tienen

en cuenta solamente las informaciones «máximas», es decir, aquellas en las cuales no se puede añadir ninguna señal sin salirse del tiempo designado para la transmisión.

Designemos el número de informaciones que se pueden transmitir durante un tiempo T mediante $f(T)$. Razonando en forma totalmente análoga al problema sobre las estampillas, se obtiene que $f(T)$ satisface a la relación

$$f(T) = f(T-t_1) + \dots + f(T-t_k). \quad (14)$$

Aquí nuevamente será $f(T) = 0$, si $T < 0$, y $f(0) = 1$.

PROBLEMA DEL ASPIRANTE

Un aspirante a ingresar en un centro de enseñanza superior debe rendir 4 exámenes. Esto supone que para ingresar será suficiente reunir 17 puntos. ¿De cuántas maneras puede rendir los exámenes para ingresar con seguridad al centro?

Este problema es similar al de las estampillas, pero se diferencia de éste en que se indica la cantidad de «estampillas» con las que hay que «pagar la suma de 17 puntos». Por cada examen rendido exitosamente el aspirante obtiene 3, 4 ó 5 puntos¹. Designemos mediante $F(k; N)$ el número de formas con que se pueden reunir N puntos después de k exámenes. Entonces, tiene lugar la relación

$$F(k; N) = F(k-1; N-3) + F(k-1; N-4) \\ + F(k-1; N-5),$$

cuya deducción es totalmente análoga a la de la (11) de la pág. 65.

De aquí se obtiene que

$$F(4; 17) = F(3; 14) + F(3; 13) + F(3; 12) = \\ = F(2; 11) + 2F(2; 10) + 3F(2; 9) + 2F(2; 8) + \\ + F(2; 7) = 2 + 3F(2; 9) + 2F(2; 8) + F(2; 7),$$

¹ Véase la nota al pie de la pág. 21 (N. del T.).

puesto que es imposible reunir 11 puntos después de 2 exámenes y reunir 10 se puede de una sola forma: obteniendo dos cincos.

Continuando el cálculo, se obtiene que

$$F(4; 17) = 2 + 3F(1; 6) + 5F(1; 5) + 6F(1; 4) + 3F(1; 3) + F(1; 2).$$

$$\text{Pero } F(1; 6) = F(1; 2) = 0^1, \text{ y } F(1; 5) = F(1; 4) = F(1; 3) = 1.$$

Por esto, $F(4; 17) = 16$. En forma totalmente análoga deducimos que

$$F(4; 18) = 10, F(4; 19) = 4 \text{ y } F(4; 20) = 1.$$

En total, se obtienen $16 + 10 + 4 + 1 = 31$ formas de rendir con éxito los exámenes.

El mismo resultado se podría haber obtenido de otra forma. Es fácil verificar que 17 puntos pueden ser obtenidos sólo de dos formas esencialmente diferentes: o bien obtener dos cincos, 4 cuatro y 1 tres, o bien obtener 1 cinco y 3 cuatros. Estas calificaciones pueden distribuirse de cualquier forma entre las disciplinas que se rinden. Como es

$$P(2, 1, 1) + P(1, 3) = \frac{4!}{2!1!1!} \frac{4!}{3!1!} = 16.$$

17 puntos pueden ser obtenidos de 16 formas. Análogamente se calcula el número de formas de obtener 18, 19 y 20 puntos.

En general, sea $F(m; N)$ el número de formas de dividir N en m sumandos, cada uno de los cuales es igual a uno de los números n_1, n_2, \dots, n_k . Entonces, para $F(m; N)$ se cumple la relación

$$F(m; N) = F(m-1; N-n_1) + \dots + F(m-1; N-n_k), \quad (15)$$

la cual se deduce igual que la (14). Dejamos que el lector efectúe esta demostración.

En particular, si $n_1 = 1, n_2 = 2, \dots, n_k = k$, obtenemos las particiones de N en m su-

mandos, cada uno de los cuales es igual a uno de los números $1, 2, \dots, k$. Designemos el número de estas divisiones mediante $F(m; N; k)$. Entonces, para este último se cumple la relación

$$F(m; N; k) = F(m-1; N-1; k) + F(m-1; N-2; k) + \dots + F(m-1; N-k; k). \quad (16)$$

Al igual que en la pág. 64, de esta relación se deduce que

$$F(m; N; k) = F(m, N-1; k) + F(m-1; N-1; k) - F(m-1; N-k-1; k). \quad (17)$$

Pasemos ahora a los problemas sobre particiones, en los cuales las particiones que se diferencian sólo en el orden de los sumandos se consideran iguales.

EL PAGO DEL DINERO

En un portamonedas hay monedas de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 y 50 kopeks, habiendo una moneda de cada valor. De cuántas maneras se puede pagar, con estas monedas, una compra por valor de 73 kopeks?

En este problema el orden de las monedas no tiene importancia: sólo interesa qué monedas se toman para el pago. Introduzcamos la siguiente notación:

$$F(n_1, n_2, \dots, n_m; N)$$

designará el número de formas con que se pueden pagar N k. mediante monedas de distintos valores n_1, n_2, \dots, n_m k., tomando no más de una moneda de cada valor. Dividamos todas las formas de pago en dos clases, según se haya utilizado o no la moneda por valor de n_m k. Si ésta ha sido utilizada, queda pagar la suma de $N - n_m$ k. con las monedas de n_1, n_2, \dots, n_{m-1} k. Y esto se puede efectuar de $F(n_1, n_2, \dots, n_{m-1}; N - n_m)$ maneras. Si, en cambio, la moneda de n_m k. no fue utilizada, hay que pa-

¹ Seis puntos no pueden ser obtenidos en un examen y al obtener un dos se excluye la posibilidad de admisión en el instituto.

gar toda la suma de N k. mediante monedas de n_1, n_2, \dots, n_{m-1} k. Esto se puede efectuar de $F(n_1, n_2, \dots, n_{m-1}; N)$ modos.

De aquí se desprende que tiene lugar la relación

$$F(n_1, n_2, \dots, n_m; N) = F(n_1, n_2, \dots, n_{m-1}; N - n_m) + F(n_1, n_2, \dots, n_{m-1}; N). \quad (18)$$

Esta relación permite reducir el problema de la elección a partir de m monedas al problema de la elección de entre $m - 1$ monedas. Repitiendo este razonamiento, lo reducimos al problema de la elección a partir de $m - 2$ monedas, etc., hasta que lleguemos o bien al problema del pago de una suma nula, o bien hasta el problema de elegir de entre una moneda solamente. Ambos problemas se resuelven unívocamente. Aquí, durante los cálculos muchos sumandos se eliminan, puesto que si $n_i + n_2 + \dots + n_m < N$, entonces $F(n_1, n_2, \dots, n_m; N) = 0$, ya que no bastan las monedas para el pago de la compra. Además, si $n_m > N$, la relación (18) se sustituye por la

$$F(n_1, n_2, \dots, n_m; N) = F(n_1, n_2, \dots, n_{m-1}; N),$$

puesto que la moneda n_m no puede participar en el pago.

Apliquemos el método descrito a la resolución de nuestro problema. De la relación (18) deducimos primeramente que

$$\begin{aligned} F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50; 73) &= \\ = F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20; 23) &+ \\ + F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20; 73) &= \\ = F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20; 23), \end{aligned}$$

ya que $1+2+3+5+10+15+20 < 73$, por lo cual $F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20; 73) = 0$. Prosiguiendo, obtenemos que

$$\begin{aligned} F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20; 23) &= \\ = F(1, 2, 3, 5, 10, 15; 3) &+ \\ + F(1, 2, 3, 5, 10, 15; 23). \end{aligned}$$

Por lo

$$\begin{aligned} F(1, 2, 3, 5, 10, 15; 3) &= F(1, 2, 3; 3) = \\ = F(1, 2; 0) + F(1, 2; 3) &= \\ = 1 + F(1; 3) + F(1; 1) &= 2. \end{aligned}$$

Calculemos el segundo sumando:

$$\begin{aligned} F(1, 2, 3, 5, 10, 15; 23) &= F(1, 2, 3, 5, 10; 8) + \\ + F(1, 2, 3, 5, 10; 23) &= F(1, 2, 3, 5, 10; 8), \end{aligned}$$

puesto que $1+2+3+5+10 < 23$. Pero $F(1, 2, 3, 5; 8) = F(1, 2, 3; 3) = 2$.

Definitivamente, obtenemos que

$$F(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50; 73) = 4.$$

Así, pues, el pago requerido se puede efectuar de 4 maneras, precisamente, 50, 20 y 3 k; 50, 20, 2 y 1 k.; 50, 15, 5 y 3 k. y, por último, 50, 15, 5, 2 y 1 k.

LA COMPRA DE LOS CARAMELOS

En una confitería se venden caramelos de varios tipos: 3 tipos con un costo de 2 k. cada uno, y 2 tipos que valen 3 k. cada unidad. ¿De cuántas maneras se pueden comprar caramelos por un valor de 8 k., si se toma no más de un caramelo de cada clase?

La solución del problema se obtiene de las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} F(2, 2, 2, 3, 3; 8) &= F(2, 2, 2, 3; 5) + \\ + F(2, 2, 2, 3; 8) &= F(2, 2, 2; 2) + \\ + 2F(2, 2, 2; 5) &+ F(2, 2, 2; 8) = \\ = F(2, 2, 2; 2) &= F(2, 2; 0) + F(2, 2; 2) = \\ = 1 + F(2; 0) &+ F(2; 2) = 3. \end{aligned}$$

De este modo, la compra se puede efectuar de 3 maneras: comprar un caramelo de cada una de las dos clases de 3 k. y agregar a éstos cualquiera de los de 2 k.

Parecería ser que otras tantas soluciones tiene el problema:

En un portamonedas hay 3 monedas de 2 k. y 2 de 3 k. ¿De cuántas maneras se puede pagar, mediante dichas monedas, una suma de 8 k.?

Esto depende, sin embargo, de qué monedas se hallan en el portamonedas. Si las de 2 k., al

igual que las de 3 k., se consideran diferenciables, el problema coincide con el que analizamos, y el pago se puede efectuar de 3 maneras. Si, en cambio, todas las monedas de 2 k. son indiferenciables, queda una sola forma de pago: 2 monedas de 3 k. y 1 de 2 k.

De esta manera, los problemas sobre pago tienen un carácter distinto, según sean o no diferenciables las monedas de un mismo valor. El método de resolución analizado más arriba sirve sólo para el caso en que todas las monedas se consideran diferentes, independientemente de que tengan el mismo valor o valores distintos. Mostremos ahora cómo se resuelve el problema en el caso en que las monedas de un mismo valor se consideran indiferenciables.

En el portamonedas hay 10 monedas de 2 k. y 5 de 3 k. ¿De cuántas maneras se puede pagar, con dichas monedas, una suma de 22 k., si las monedas de un mismo valor no se diferencian entre sí?

Designemos el número de soluciones del problema mediante $\Phi(10 \cdot 2, 5 \cdot 3; 22)$ ($10 \cdot 2$ indica que tenemos 10 monedas de 2 k., igualmente $5 \cdot 3$ significa que hay 5 monedas de 3 k.). Dividamos todas las formas que son soluciones del problema en clases, según la cantidad utilizada de monedas de tres kopeks. Si, por ejemplo, se han utilizado dos monedas de este tipo, quedarán por pagar 16 k. mediante monedas de dos kopeks, y si fueron utilizadas las 5 monedas quedarán por pagar sólo 7 k. Si las monedas de tres kopeks no han sido utilizadas en absoluto para el pago, habrá que pagar todos los 22 k. con monedas de dos kopeks. Así, pues, tiene lugar la igualdad

$$\begin{aligned} \Phi(10 \cdot 2, 5 \cdot 3; 22) &= \Phi(10 \cdot 2; 22) + \Phi(10 \cdot 2; 19) + \\ &+ \Phi(10 \cdot 2; 16) + \Phi(10 \cdot 2; 13) + \Phi(10 \cdot 2; 10) + \\ &+ \Phi(10 \cdot 2; 7). \end{aligned} \quad (19)$$

No hay necesidad de continuar el proceso, puesto que disponemos sólo de 5 monedas de tres kopeks. Está claro que con 10 monedas de dos kopeks es imposible pagar 22 k. Por esto, $\Phi(10 \cdot 2; 22) = 0$. Ahora bien, es evidente que una suma impar

no puede pagarse con monedas de dos kopeks, y una par se puede pagar de una sola forma. Por esto, de la fórmula (19) se deduce que

$$\begin{aligned} \Phi(10 \cdot 2, 5 \cdot 3; 22) &= 2. \\ \text{Existen sólo dos formas de pago:} \\ 22 &= 8 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 5 \cdot 2 + 4 \cdot 3. \end{aligned}$$

¿COMO CAMBIAR UNA MONEDA DE 10 KOPEKS?

El lector debe, probablemente, cambiar varias veces al día monedas de 10 k.: para viajar en metro hacen falta monedas de 5 k., para hablar por el teléfono público, de 2 k., y para tomar un vaso de gascosa con jugo, de 3 k. En relación con esto, surge el problema:

¿De cuántas maneras se puede cambiar una moneda de 10 k. en monedas de 1, 2, 3 y 5 k.?

Este problema es similar al que resolvimos al final del apartado anterior. Sólo que ahora el número de monedas de distinto valor no se limita. Por esto, el número de soluciones lo designaremos así: $\Phi(1, 2, 3, 5; 10)$. Razonando igual a como lo hicimos en el apartado anterior, se obtiene la relación

$$\begin{aligned} \Phi(1, 2, 3, 5; 10) &= \Phi(1, 2, 3; 10) + \\ &+ \Phi(1, 2, 3; 5) + \Phi(1, 2, 3; 0) \end{aligned} \quad (20)$$

(todas las formas de cambio se han dividido en clases según el número de monedas de 5 k. que figuran en éstas). Está claro que $\Phi(1, 2, 3; 0) = 1$, ya que se pueden pagar 0 k. de una sola forma.

Para calcular $\Phi(1, 2, 3, 5)$, dividamos todas las formas de cambiar 5 k. mediante monedas de 1, 2, 3 k. en clases, según la cantidad de monedas de tres kopeks tomadas. Obtenemos así

$$\Phi(1, 2, 3, 5) = \Phi(1, 2; 5) + \Phi(1, 2; 2)$$

(el primer sumando corresponde al caso en que no se toma ninguna moneda de tres kopeks, y el segundo, al caso en que se toma una moneda de este tipo).

Continuando el cálculo, se obtiene que
 $\Phi(1, 2, 3; 5) = \Phi(1; 5) + \Phi(1; 3) +$
 $+ \Phi(1; 1) + \Phi(1; 2) + \Phi(1; 0).$

Todos estos sumandos son iguales a 1, puesto que cualquier suma se paga de una sola forma con kopeks. Así, pues, $\Phi(1, 2, 3; 5) = 5$. En forma totalmente análoga se calcula que $\Phi(1, 2, 3; 10) = 14$. En total obtenemos $14 + 5 + 1 = 20$ formas de cambio.

En lugar de la relación (20), se podría haber tomado al principio la relación

$$\Phi(1, 2, 3, 5; 10) = \Phi(1, 2, 3; 10) + \Phi(1, 2, 3, 5; 5).$$

Esta indica que las formas de cambio se dividen en aquellas en que no se utiliza ninguna moneda de 5 k., y aquellas en que fue utilizada por lo menos una moneda de este tipo.

En general, si hay que pagar N k. con monedas de valores de n_1, \dots, n_k kopeks, tiene lugar la relación

$$\Phi(n_1, \dots, n_{k-1}, n_k; N) = \Phi(n_1, \dots, n_{k-1}; N) + \Phi(n_1, \dots, n_{k-1}, n_k; N - n_k). \quad (21)$$

Esta demuestra que o bien no utilizamos ninguna moneda de n_k kopeks, y entonces hay que pagar toda la suma N con las monedas restantes de n_1, \dots, n_{k-1} k., o bien fue utilizada por lo menos una moneda de n_k k., y entonces hay que pagar la suma restante $N - n_k$ k. con monedas de n_1, \dots, n_{k-1}, n_k k. Si, como sucedió en la pág. 67, las monedas no deben repetirse, la relación (21) se sustituye por la que ya encontramos antes (véase la pág. 67):

$$F(n_1, \dots, n_{k-1}; N) = F(n_1, \dots, n_{k-1}; N) + F(n_1, \dots, n_{k-1}; N - n_k). \quad (22)$$

PARTICION DE NUMEROS EN SUMANDOS

Consideremos un caso particular del problema sobre el cambio, cuando se admiten monedas cualesquiera de 1 a n kopeks. En otras palabras, resolvamos el siguiente problema:

¿De cuántas maneras se puede dividir un número N en sumandos, cada uno de los cuales es igual a uno de los números 1, 2, ..., n (el orden de los sumandos no interesa)?

Designemos el número de estas maneras de partición mediante Π_n^N . Entonces tiene lugar la relación

$$\Pi_n^N = \Pi_{n-1}^N + \Pi_n^{N-n}. \quad (23)$$

En efecto, si el número n no se utiliza como sumando, entonces N está dividido en los sumandos 1, 2, ..., $n-1$, lo cual puede efectuarse de Π_{n-1}^N formas. Si, en cambio, se ha utilizado n como sumando, el número $N-n$ está dividido en los sumandos 1, 2, ..., n , lo cual puede efectuarse de Π_n^{N-n} maneras.

Impongamos ahora la limitación de que todas los sumandos sean diferentes. El número de soluciones en este caso se designará mediante Φ_n^N (siendo aquí $\Phi_n^N = 1$). Dejamos al lector la demostración de que para Φ_n^N tiene lugar la relación

$$\Phi_n^N = \Phi_{n-1}^{N-1} + \Phi_n^{N-n} \quad (24)$$

(el número n no puede ser utilizado por segunda vez como sumando).

Como es fácil ver, $\Phi_1^1 = 1$ y $\Phi_1^N = 0$ para $N > 1$, y mediante la fórmula (24) se puede calcular sucesivamente Φ_n^N para todo n y N . Para Π_n^N resulta más cómodo tomar, en lugar de la relación (23), la

$$\Pi_n^N = \Pi_{n-1}^N + \Pi_{n-1}^{N-n} + \Pi_{n-1}^{N-2n} + \dots \quad (25)$$

la cual se obtiene aplicando sucesivamente la (23). Luego, es suficiente observar que $\Pi_1^N = 1$ (cualquier número natural puede ser desarrollado de una sola forma en sumandos iguales a 1). Utilizando la relación (25), se calcula sucesivamente Π_n^N para todo N , después Π_n^N , etc.

Obsérvese que el número de todas las formas de dividir N en sumandos es igual a Π_n^N , ya

¹ El val or de Π_n^0 lo supondremos igual a 1.

que en el desarrollo no pueden figurar sumandos mayores que N . De igual modo, el número de formas de descomponer N sumandos diferentes es igual a Φ_N^N .

METODO DE LOS DIAGRAMAS

Los primeros métodos de demostración de los teoremas sobre las particiones de números eran muy complejos. Al igual que en muchos problemas de la matemática, la aplicación de consideraciones geométricas simplificó e ilustró las demostraciones de los teoremas.

Cada partición del número N en sumandos se puede representar en forma de diagrama. Cada fila de éste está formada por tantos puntos cuantas unidades figuren en el sumando correspondiente.



Fig. 10.

Por ejemplo, a la partición $7 = 1 + 1 + 2 + 3$ le corresponde el diagrama mostrado en la fig. 10.

Como el orden de los sumandos en la partición no tiene importancia, las filas se pueden situar de forma que su longitud no disminuya de arriba




Fig. 11.

hacia abajo. Además, los primeros puntos de cada fila se representarán en una misma columna. Estos diagramas se llamarán *normales*.

Mediante los diagramas es fácil demostrar distintas propiedades de las particiones. Demostremos, por ejemplo, que la cantidad de formas de dividir el número N en no más de m sumandos coincide con la de formas de dividir $N + m$ en m sumandos. En efecto, el diagrama que representa la partición del número N en no más de m sumandos está formado por N puntos, situados en no más de m filas. Agreguemos a cada uno de estos diagramas una columna formada por m puntos (véase la fig. 11, donde se ha representado esta transformación para $N = 5$, $m = 4$). Se obtiene así un diagrama formado por $N + m$ puntos, situados en m filas. Recíprocamente, quitando la primera columna de cada diagrama, formada por $N + m$ puntos, situados en forma de m filas, obtenemos un diagrama de N puntos, en el cual la cantidad de filas no es mayor que m .

Hemos establecido una correspondencia biunívoca entre los diagramas de dos tipos, de donde se deduce que el número de estos diagramas es el mismo. Queda así demostrada nuestra afirmación.

Un tanto más compleja es la demostración del siguiente teorema (teorema de Euler):

El número de formas de partición N en no más de m sumandos es igual al número de formas de descomponer $N + \frac{m(m+1)}{2}$ en m partes distintas.

Cada partición del número N en no más de m sumandos se representa en forma de un diagrama de N puntos, que contiene no más de m filas. Agreguemos a cada uno de estos diagramas un triángulo rectángulo isósceles formado por m filas, después de lo cual reduzcamos el diagrama a la forma normal (fig. 12), donde se representa esta transformación para el caso $N = 6$, $m = 4$). Como el número de puntos en el triángulo es igual a $\frac{m(m+1)}{2}$, obtenemos un diagrama formado por $N + \frac{m(m+1)}{2}$ puntos, y que contiene m

filas. Además, todas las filas del diagrama serán de distinta longitud. En efecto, las longitudes de las filas del diagrama inicial no disminuyen, y las del triángulo crecen todo el tiempo. Esto significa que después de agregar el triángulo,




Fig. 12.

se obtendrá un diagrama en el cual las longitudes de las filas crecerán todo el tiempo. Por consiguiente, no puede haber filas de igual longitud.

Recíprocamente, de cada diagrama de la partición de $N + \frac{m(m+1)}{2}$ en m sumandos distintos se puede quitar un triángulo rectángulo isósceles, que contenga m filas, y obtener un diagrama para la división de N en no más de m sumandos. Esta correspondencia entre los diagramas de dos tipos demuestra que el número de éstos es el mismo. Con esto queda demostrada nuestra afirmación.

DIAGRAMAS DUALES

Los diagramas se pueden transformar de modo que las filas se transformen en columnas, y las columnas, en filas. Para esto, giremos el diagrama en 90° y reduzcámoslo a la forma normal. En la fig. 13 se representa esa transformación de los diagramas.

Está claro que si se repite esta transformación, se obtiene nuevamente el diagrama inicial. Por esto, todos los diagramas se dividen en pares mutuamente duales (a propósito, debe tenerse

en cuenta que algunos diagramas son autoduales, como, por ejemplo, el de la fig. 14).

Aplicando la dualidad de los diagramas, se pueden comparar las particiones sometidas a ciertas limitaciones sobre la magnitud de los sumandos con las divisiones en las que se somete a limitaciones el número de sumandos. Por ejemplo, tiene lugar la siguiente afirmación:

El número de particiones de N en sumandos que no superen a n es igual al de divisiones de N en no más de n sumandos.

En efecto, los diagramas para la división de N en sumandos que no superen n están formados por N puntos, habiendo no más de n puntos en cada fila. Por lo tanto, en este diagrama no hay más de n columnas. Pero entonces el diagrama dual tiene no más de n filas, es decir, corresponde a la partición del número N en no más de n sumandos.

En forma totalmente análoga se demuestra que el número de particiones de N en n sumandos es igual al de particiones en sumandos que no superen n , por lo menos uno de los cuales es igual a n .

Consideremos ahora las particiones del número N en sumandos pares. Estas particiones se representan mediante diagramas cuyas filas con-



Fig. 13.



Fig. 14.

tienen un número par de puntos. Pero entonces en el diagrama dual habrá un número par de sumandos de cada tipo (fig. 15). De aquí se deduce la siguiente afirmación.




Fig. 15.

El número de particiones de N en sumandos pares es igual al de particiones en las cuales cada número figura un número par de veces (so sobre-entendiendo que algunos sumandos pueden no figurar en absoluto, ya que cero es un número par).

Análogamente se demuestra que:

La cantidad de particiones de N en sumandos impares es igual al número de particiones en las cuales cada sumando, a excepción del mayor, figura un número par de veces, y el mayor, un número impar de ellas.

FORMULA DE EULER ¹

En relación con algunos problemas de las particiones, Euler estudió el producto infinito

$$A = (1-x)(1-x^2)(1-x^3) \dots (1-x^n) \dots \quad (26)$$

Abramos los primeros 22 paréntesis de este producto. Obtendremos así la expresión

$$A = [1-x-x^2+x^5+x^7-x^{12}-x^{15}+x^{22}+\dots] \times \\ \times (1-x^{23})(1-x^{24}) \dots (1-x^n) \dots$$

donde los puntos suspensivos designan sumandos que contienen x en potencias mayores que 22.

No hemos escrito estos términos, puesto que después de multiplicar los corchetes por $1-x^{23}$, $1-x^{24}$, ... x etc., cambiarán. En cambio, los términos escritos no variarán. Por esto, si abrimos todos los paréntesis, se obtiene una serie infinita cuyos primeros términos son de la forma

$$1-x-x^2+x^5+x^7-x^{12}-x^{15}+x^{22}+\dots \quad (27)$$

Podemos apreciar que después de dos términos negativos hay dos positivos, luego nuevamente dos negativos, etc. Sin embargo, resulta mucho más difícil descubrir la ley que rige los exponentes de estos términos. Mediante largos ensayos Euler estableció la siguiente regla:

Si se transforma el producto infinito

$$(1-x)(1-x^2)(1-x^3) \dots (1-x^n) \dots$$

en una serie, en ésta serán diferentes de cero solamente los sumandos del tipo $(-1)^k x^{\frac{3h^2 \pm h}{2}}$, donde k es un número natural.

El teorema de Euler tiene un grau significado no sólo en la teoría de las particiones en sumandos, sino también en la teoría de las funciones elípticas y en otros problemas del análisis matemático. Sin embargo, la mayoría de las demostraciones de este teorema son bastante complejas. Expondremos ahora una demostración geométrica muy sencilla del teorema de Euler. Previamente habrá que enunciar este teorema en el lenguaje de la teoría de las particiones.

Al abrir los paréntesis en la expresión (26), los sumandos $\pm x^N$ se encontrarán tantas veces cuantas maneras existan de dividir el número N en sumandos diferentes. Aquí tendremos x^N si el número de sumandos es par, y $-x^N$ si éste es impar. Por ejemplo, a la descomposición $12 = 5 + 4 + 2 + 1$ le corresponde el sumando

$$(-x^5)(-x^4)(-x^2)(-x) = x^{12},$$

y a la división $12 = 5 + 4 + 3$, el sumando

$$(-x^5)(-x^4)(-x^2) = -x^{12}.$$

De este modo, el coeficiente de x^N en el desarrollo (27) es igual a la diferencia entre la can-

¹ Este apartado se puede omitir en una primera lectura.

tividad de divisiones en un número par de sumandos distintos y la de particiones en un número impar de sumandos diferentes. El teorema de Euler afirma que:

Si el número N no puede ser representado en la forma $N = \frac{3k^2 \pm k}{2}$, éste tiene una cantidad igual de particiones en un número par y en uno impar de sumandos diferentes. Y para los números del tipo $N = \frac{3k^2 \pm k}{2}$, la diferencia entre estas cantidades es igual a $(-1)^k$ (es decir, si k es par, las particiones en un número par de sumandos superan en 1 a las de número impar, y si k impar, al revés).

Para demostrar el teorema de Euler, exponemos un método de transformar un diagrama con número par de filas en otro con el mismo número de puntos y un número impar de filas, y viceversa. Como consideramos solamente las particiones en sumandos diferentes, los diagramas de estas divisiones estarán formados por varios trapecios, ubicados uno sobre el otro. Designemos el número de puntos en la fila superior del diagrama mediante m , y el de filas del trapecio inferior mediante n . En la fig. 16 se representa un diagrama para el cual es $m = 2$, $n = 3$.

Supongamos que el diagrama contiene no menos de dos trapecios, siendo, además, $m < n$. En este caso, eliminemos la primera fila y prolonguemos las últimas m filas del trapecio inferior en un punto. Hecho esto, el número total de puntos no variará, todas las filas resultan




Fig. 16.

ser de distinta longitud y variará la paridad del número de las filas. Se puede efectuar exactamente la misma transformación si el diagrama está formado por un solo trapecio, siendo $m \leq n - 1$. En la fig. 17a se expone el resultado de semejante transformación de un diagrama.



Puc. 17a.




Fig. 17b.

Supongamos ahora que el diagrama contiene no menos de dos trapecios y que $m > n$. Entonces tomemos un punto de cada fila del último trapecio y formemos con éstos la primera fila de un nuevo diagrama. Esto se puede efectuar, puesto que $m > n$ y, por ello, la fila formada es más corta que la primera del diagrama original. Además, como hemos tomado todas las filas del trapecio inferior, en el diagrama obtenido todas las filas tendrán diferente longitud. Por último, el nuevo diagrama contiene tantos puntos como el original, pero la paridad de la cantidad de filas ha variado: el nuevo diagrama contiene una fila más. Un transformación análoga la admiten los diagramas formados por un solo trapecio, si es $n \geq m - 2$. En la fig. 17b se representa el resultado de la transformación descrita de un

diagrama. Comparando las figuras 17a y 17b, nos podemos convencer de que las transformaciones descritas son inversas entre sí: si se efectúa primeramente una de ellas, y después la otra, obtenemos nuevamente el diagrama original.




Fig. 18.

Así, pues, los diagramas de las particiones del número N que admiten una de estas transformaciones, se dividen en un número igual de diagramas con número par e impar de filas. Queda por esclarecer cuáles diagramas no admiten la transformación descrita. Está claro que éstos están

formados por un sólo trapecio, y que para ellos se cumple que $m = n$, o bien que $m = n + 1$.

En el primer caso, el diagrama contiene $\frac{3n^2-n}{2}$ puntos, y en el segundo, $\frac{3n^2+n}{2}$ puntos (fig. 18).

Los razonamientos expuestos demuestran que si N no es un número del tipo $\frac{3n^2 \pm n}{2}$, éste tiene igual cantidad de particiones en un número par y en uno impar de sumandos diferentes. Si es $N = \frac{3n^2 \pm n}{2}$ y n es un número par, quedará un diagrama que no admite la transformación, y que tiene un número par de filas. Por esto quedará una partición más en número par de sumandos que en número impar de éstos. Si, en cambio, es $N = \frac{3n^2 \pm n}{2}$ y n es impar, habrá una división más en un número impar de sumandos. El teorema queda demostrado.

UN HOMBRE DEAMBULA POR LA CIUDAD

En la fig. 19 se representa el plano de una ciudad (aproximadamente éste es el tipo del plano de Canberra, la capital de Australia). En esta ciudad hay $n \times k$ manzanas rectangulares, divididas por $n - 1$ calles horizontales y por $k - 1$ «verticales». El caminante quiere ir desde el punto A hasta el B por el camino más corto, es decir, desplazándose todo el tiempo o bien «de izquierda a




Fig. 19.

derecha», o bien «de abajo hacia arriba». ¿Por cuántos caminos puede llegar desde A hasta B?

Está claro que, por cualquier camino que tome el caminante, pasará por $k + n$ cruces (considerando el punto A, pero no el B). En cada cruce puede ir o bien hacia la derecha, o bien hacia arriba. En correspondencia con esto, todos los cruces se dividen en dos clases. Pongamos en correspondencia a los cruces en que él escoge el camino hacia la derecha, el número 0, y en los que va hacia arriba, la cifra 1. Como el número de cruces de la primera clase debe ser igual a k , y el de la segunda, a n (de otra forma el caminante no llegará al punto B), obtenemos una permutación formada por k ceros y n unidades. A cada una de estas permutaciones le corresponde, a su vez, algún camino. En la figura 19 se repre-

senta el camino que corresponde a la permutación 0110001100.


Pero el número de permutaciones de k ceros y n unidades es igual a

$$P(k, n) = C_n^{n+k} = \frac{(n+k)!}{n! k!}. \quad (1)$$

A lo mismo es igual también el número de caminos más cortos desde A hasta B.

EL CUADRADO ARITMETICO

Los desplazamientos del caminante por la ciudad se asemejan a los movimientos de una torre en el ajedrez. Tomemos un tablero de ajedrez infinito, limitado por dos lados por semirectas perpendiculares, y coloquemos en el ángulo de este tablero una torre. Supongamos que ésta se mueve en el tablero o bien desde arriba hacia abajo, o bien de izquierda a derecha. Combinando estos movimientos entre sí, se pueden obtener caminos diferentes, que conducen desde la ca-



silla angular a una dada del tablero. Escribamos en cada casilla del tablero el número de estos caminos. Está claro que el número escrito dependo de las coordenadas de la casilla, de en qué vertical y horizontal se encuentre.

Nos resultará cómodo numerar las verticales y las horizontales mediante los números 0, 1, 2, ..., n , ... En esta numeración la casilla angular obtiene las coordenadas (0, 0). Aplicando el resultado obtenido al resolver el problema anterior, nos convencemos de que en la intersección de la k -ésima vertical y la n -ésima horizontal se halla el número C_k^{n+k} (para llegar a esta casilla hay que efectuar k movimientos hacia la derecha y n hacia abajo). Escribamos en lugar de C_k^{n+k} sus valores numéricos. Obtendremos entonces la tabla 3. Esta tabla se denomina *cuadrado aritmético*. Analicemos con más detalle sus propiedades. Un estudio atento del cuadrado aritmético demuestra que cada número escrito en éste se obtiene según la siguiente regla: *este número es igual a la suma del número escrito sobre él y del que se halla a su izquierda*. Por ejemplo, sobre el número 10 = 4 + 6 está escrito el 4, y a su izquierda, el 6.

Tabla 3

1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6
1	3	6	10	15	21
1	4	10	20	35	56
1	5	15	35	70	126
1	6	21	56	126	252
.....

La regla obtenida se desprende fácilmente de la igualdad $C_k^n = C_{k-1}^{n-1} + C_k^{n-1}$, demostrada antes (véase la pág. 36). Pero lo podemos demostrar también directamente. En efecto, la torre puede llegar a la casilla (k, n) desde una de las casillas $(k-1, n)$ ó $(k, n-1)$. Por esto, en virtud de la regla de la suma, el número de formas de llegar a la casilla (k, n) es igual a la suma

del número de maneras de alcanzar la $(k-1, n)$ y del de formas de alcanzar la $(k, n-1)$. Y ésta es, precisamente, nuestra afirmación.

De la relación $C_k^{n+k} = C_n^{n+k}$ se deduce que el cuadrado aritmético es simétrico con respecto a la diagonal que pasa por su ángulo (la denominaremos *diagonal principal*). A propósito, esta propiedad también se demuestra fácilmente en forma geométrica: se puede llegar al cruce de la n -ésima vertical con la k -ésima horizontal y al de la k -ésima vertical con la n -ésima horizontal de un número igual de maneras.

NUMEROS FIGURADOS

Al calcular los elementos de la tabla 3 utilizamos tanto los elementos de la fila anterior, como los de la columna anterior. Pero habría sido suficiente utilizar los de la fila anterior. En efecto, hemos demostrado en la pág. 37 la fórmula (15):

$$C_k^{n+k} = C_k^{n+k-1} + C_{k-1}^{n+k-2} + \dots + C_0^{n-1}.$$

Esta fórmula demuestra que cada elemento de nuestra tabla es igual a la suma de los elementos de la fila anterior, a partir del primero y hasta el elemento que se halla directamente por encima del calculado. De este modo, sumando sucesivamente los elementos de la $(n-1)$ -ésima fila, calculamos, uno tras otro, los de la n -ésima.

Este método de cálculo de la tabla 3 está relacionado con la teoría de los números figurados, que se remonta a los matemáticos de la Grecia Antigua Pitágoras y Nicómaco. El hecho reside en que los números 1, 2, 3, ... se pueden representar mediante filas de uno, dos, tres, etc. puntos, y estas filas, unir en triángulos (fig. 20). Entonces el número de puntos de cada triángulo será igual al número correspondiente en la segunda fila de la tabla¹. Por esto, los números, 1,

¹ Recuérdese que las filas se numeran con los números 0, 1, 2, ..., por lo cual la fila superior es la cero, la que le sigue, la primera, etc.

3, 6, 10, 15, 21, etc. son llamados *números triangulares*. El k -ésimo número triangular es igual a

$$C_2^{k+1} = \frac{(k+1)k}{2}.$$

Análogamente, los triángulos representados en la fig. 20 pueden ser unidos en pirámides. El




Fig. 20.

número de puntos en cada pirámide es igual al número correspondiente de la tercera fila de nuestra tabla. Por eso los números 1, 4, 10, 20, 35, etc. se llaman *piramidales*. Su fórmula general es la siguiente:

$$C_3^{k+2} = \frac{(k+2)(k+1)k}{1 \cdot 2 \cdot 3}.$$

Para dar una interpretación análoga de los números de las filas siguientes, habría que considerar pirámides en espacios de un número mayor de dimensiones.

El estudio de los números figurados atrajo a los matemáticos en el transcurso de muchos siglos, y era entonces una sección importante de la teoría de los números.

EL TRIANGULO ARITMETICO

Tomemos ahora un tablero delimitado solamente por un lado y coloquemos en la casilla A de la horizontal nula una ficha (fig. 21). Moviéndonos según las reglas del juego de damas, esta ficha puede llegar a cualquier casilla que se halle en la zona limitada por las rectas AB y AC . Escribamos nuevamente, para cada casilla, el número de formas de las cuales puede llegar

nuestra ficha hasta ella. Podemos apreciar que los números escritos coinciden, en esencia, con los del cuadrado aritmético, estando sólo distribuidos de otra forma. Esto no debe extrañarnos: si se gira el tablero en 45° , la ficha se moverá según líneas horizontales y verticales, y el problema se transforma en el de los movimientos




Fig. 21.

de una torre. Los números de la fig. 21 se representan comúnmente en forma de triángulo (tabla 4). Aquí cada número es igual a la suma de los

Tabla 4

			1			
		1	1	1		
	1	3	2	3	1	
1	4	6	4	6	4	1
.....

dos números de la fila anterior, entre los cuales éste se encuentra. Este triángulo es llamado con frecuencia *triángulo de Pascal*. Sin embargo aún antes que Pascal (1623—1662) lo conoció el matemático italiano Tartaglia¹ (1500—1557)

¹ Tartaglia era un matemático notable. Además de triángulo aritmético, descubrió la fórmula de resolución de las ecuaciones cúbicas. Esta fórmula la comunicó otro matemático italiano, D. Cardano, haciendo que éste jurase no descubrir a nadie el secreto confiado. Pero Cardano, poco tiempo después, publicó esta solución en su texto de álgebra, por lo cual la fórmula de resolución de las ecuaciones cúbicas es llamada, con total injusticia «fórmula de Cardano».

de que se difereencia del cuadrado aritmético de la pág. 77 solamente en los signos de los términos. Más precisamente, en la intersección de la $(-n)$ -ésima horizontal y la k -ésima vertical se halla el número $(-1)^{k-1} C_k^{n+k-1}$. Se sobreentiende que el estudio de una parte de la tabla no puede servir de demostración de que esto es válido para todas las filas y todas las columnas. Para convencerse de su justeza, obsérvese que

$$\begin{aligned} & (-1)^{k-1} C_k^{n+k-1} + (-1)^{k-2} C_{k-1}^{n+k-2} = \\ & = (-1)^{k-1} [C_k^{n+k-1} - C_{k-1}^{n+k-2}] = \\ & = (-1)^{k-1} C_k^{n+k-2} \end{aligned}$$

(véase la fórmula (11) de la pág. 36). La igualdad obtenida demuestra que en una tabla formada por los números $(-1)^{k-1} C_k^{n+k-1}$, el k -ésimo elemento de la fila $n+1$ es igual a la suma de los elementos de la $(-n)$ -ésima fila con números k y $k-1$. En otras palabras, la regla de escritura de la tabla que forman los números $(-1)^{k-1} C_k^{n+k-1}$ coincide con la de escritura de la tabla del triángulo aritmético ampliado. Como, además, estas tablas poseen filas iguales con número -1 y la columna cero, todos sus elementos coinciden.


En el triángulo aritmético inicial, en la intersección de la n -ésima horizontal y la k -ésima vertical se hallaba el número C_k^n . En el triángulo ampliado, en la intersección de la $(-n)$ -ésima horizontal y la k -ésima vertical se halla el número $(-1)^{k-1} C_k^{n+k-1}$. Por esto, se puede generalizar el símbolo C_k^n para los valores negativos de n , haciendo

$$C_k^{-n} = (-1)^{k-1} C_k^{n+k-1}. \quad (2)$$

Como lo muestra la tabla 6, la generalización del símbolo C_k^n para los valores negativos de k es trivial: para $k < 0$, se tiene $C_k^n = 0$ (véase también la pág. 124). Además, es $C_k^n = 0$ si $0 < n < k$.

EL REY DEL AJEDREZ

El triángulo aritmético se puede obtener como sigue. Coloquemos en el ángulo izquierdo superior de la tabla un «rey del ajedrez unilateral», es decir, una figura que pueda desplazarse solamente en una casilla hacia adelante y en una casilla en forma sesgada hacia la derecha. Escribiendo en cada casilla el número de maneras de



A

Fig. 22.

las cuales esta figura puede llegar hasta ella, obtenemos el triángulo aritmético.

Sustituuyamos ahora al rey unilaterales por un rey común del ajedrez, limitando su libertad de movimiento con una sola condición: el rey debe ir siempre hacia adelante, hacia la línea horizontal siguiente. Para que el rey pueda utilizar sus nuevas posibilidades, hay que ampliar el tablero, tomando un limitado sólo por un lado por una línea recta. En la fig. 22 se representa tal tablero, en cada casilla del cual se indica el número de formas de las cuales puede llegar hasta ella el rey, si éste se encontraba al principio en la casilla A.

Veamos cómo está formada la nueva tabla. Supongamos que para cada casilla de la horizontal $n-1$ ya fue hallado de cuántas maneras puede llegar hasta ella el errabundo monarca. Halleemos de cuántas formas se alcanzan las casillas de la n -ésima horizontal. A cada una de estas

casillas el rey puede llegar desde una de las vecinas de la horizontal $n - 1$ (desde la que se halla directamente debajo de ella, o en forma sesgada hacia la derecha, o hacia la izquierda, véase la fig. 22). En virtud de la regla de la suma, se obtiene el siguiente resultado:

El número de formas de las cuales el rey del ajedrez puede alcanzar alguna casilla de la n -ésima horizontal es igual a la suma de los números de modos de los que se alcanzan las tres casillas vecinas de la horizontal $n - 1$.

Aquí se considera que para la casilla en la que el rey se halla al principio hay una sola forma (no moverse del lugar), y para las demás casillas de la horizontal cero no hay ninguna manera.

TRIANGULO ARITMETICO GENERALIZADO

El triángulo de la fig. 22 se puede representar de otra forma, desplazando todos los números hacia la derecha de modo que la tabla quede en la parte del tablero delimitada por dos semirrectas perpendiculares. En este caso, la regla de obtención de cada número de la tabla se enuncia así:

Cada número es igual a la suma de tres de la fila precedente: del que se halla directamente sobre él y de los dos vecinos de la izquierda. Además, en el vértice se halla el número 1, y todos los demás elementos de la fila cero son iguales a cero.

Por ejemplo, el número 16 de la cuarta fila es la suma de los números 3, 6 y 7 de la tercera.

Queda totalmente claro cómo generalizar ahora el triángulo aritmético. Tomemos algún número natural m y llenaremos la tabla según la regla siguiente: en el ángulo superior izquierdo escribiremos el número 1, y en todas las demás casillas de la fila cero, ceros. Después, en cada casilla de la primera fila escribiremos la suma de m elementos de la fila cero: del que se halla directamente sobre el buscado y de $m - 1$ elementos a la izquierda de éste. Está claro que entonces los primeros m elementos de la primera

fila serán iguales a la unidad, y los demás, a cero (si al formar la suma faltan sumandos, los que faltan se considerau iguales a cero; en otras palabras, la tabla se completa a la izquierda por una tabla formada de ceros (véase la tabla 7).

En forma totalmente análoga se escriben las filas restantes de la tabla: cada elemento de ésta es igual a la suma de m elementos de la fila anterior: del que se halla directamente sobre

Tabla 7

0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	3	2	1	0	0	0	0
0	0	1	3	6	7	6	3	1	0	0
0	0	1	4	10	16	19	16	10	4	1
...

él y de $m - 1$ a su izquierda. En particular, el triángulo aritmético se obtiene para $m = 2$; el de la tabla, 7, para $m = 3$.

Para distinguir entre sí los triángulos aritméticos con distintos valores de m , los llamaremos *m-triángulos aritméticos*. El elemento del m -triángulo aritmético que se halla en la intersección de la n -ésima horizontal y la k -ésima vertical será designado por $C_m(k, n)$. De la definición del m -triángulo aritmético se desprende que los números $C_m(k, n)$ satisfacen a la relación

$$C_m(k, n) = C_m(k, n-1) + C_m(k-1, n-1) + \dots + C_m(k-m+1, n-1) \quad (3)$$

Además, se cumplen las condiciones

$$C_m(k, 1) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq k \leq m-1; \\ 0, & \text{si } k \geq m. \end{cases}$$

TRIANGULOS ARITMETICOS GENERALIZADOS Y SISTEMA DE NUMERACION m -ESIMAL

Los números $C_m(k, n)$ están relacionados con el sistema de numeración m -esimal. Precisamente, $C_m(k, n)$ es igual a la cantidad de nú-

meros de n cifras en el sistema de numeración m -ésimal, para los cuales la suma de sus cifras es igual a k . Aquí el término «de n cifras» lo entendemos en el sentido amplio, admitiendo también números que comienzan con uno o varios ceros. Así, 001 215 se considera un número de seis cifras y la suma de sus cifras es igual a 9.

Para demostrar la afirmación enunciada, designemos la cantidad de números de n cifras en el sistema de numeración m -ésimal, para los cuales la suma de sus cifras es igual a k , mediante $B_m(k, n)$. Demostraremos que los números $B_m(k, n)$ satisfacen a la misma relación (3) que los $C_m(k, n)$. En efecto, la última cifra de un número en el sistema de numeración m -ésimal puede tomar uno de los valores $0, 1, \dots, m-1$. En correspondencia con esto, la suma de las cifras del número de $n-1$ cifras que se obtiene del de n cifras eliminando la última, puede adquirir uno de los valores $k, k-1, \dots, k-m+1$. En virtud de la regla de la suma, de aquí se obtiene que

$$B_m(k, n) = B_m(k, n-1) + \dots + B_m(k-m+1, n-1). \quad (4)$$

Además, está claro que $B_m(k, 1)$ es igual a 1 si $0 \leq k \leq m-1$, y a 0 en caso contrario (en el sistema de numeración m -ésimal hay solamente un número de una cifra cuya suma de cifras sea igual a k , si $0 \leq k \leq m-1$, y no hay ninguno, si $k \geq m$). De este modo, la primera fila de la tabla de números $B_m(k, \tilde{n})$ coincide con la primera de la tabla de números $C_m(k, n)$. Como las leyes (3) y (4) de formación de estas tablas también coinciden, para todo k y n tendremos que $B_m(k, n) = C_m(k, n)$.

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS $C_m(k, n)$

Los números $C_m(k, n)$ poseen toda una serie de propiedades que se asemejan a la de los C_n^k . Esto no es de extrañar, ya que, en virtud de la

composición del triángulo aritmético, se tiene que $C_2(k, n) = C_n^k$. Obsérvese, en primer lugar, que $C_m(k, n)$ es diferente de cero solamente para $0 \leq k \leq n(m-1)$. Esto se deduce directamente de que cada fila siguiente del m -triángulo aritmético es más larga que la precedente en $m-1$.

Demostremos ahora que los números $C_m(k, n)$ poseen la siguiente propiedad de simetría:

$$C_m(k, n) = C_m(n(m-1) - k, n). \quad (5)$$

Para esto, pongamos en correspondencia a cada número de n cifras en el sistema de numeración m -ésimal un «número complementario», que se obtiene sustituyendo cada cifra por su complemento hasta $m-1$. Por ejemplo, en el sistema 7-ésimal de numeración el complemento de 3 140 216 será el número 3 526 450. Está claro que si la suma de las cifras del número dado era igual a k , la de las del complementario será igual a $n(m-1) - k$. Por esto, hay tantos números de n cifras cuya suma de cifras es igual a k , como con suma de cifras igual a $n(m-1) - k$. Pero esto, precisamente, se expresa mediante la igualdad (5).

Como la cantidad general de números de n cifras en el sistema de numeración m -ésimal es igual a m^n (véase la pág. 11), tiene lugar la relación

$$C_m(0, n) + C_m(1, n) + \dots + C_m(n(m-1), n) = m^n. \quad (6)$$

Demostremos ahora la relación

$$C_m(0, l) C_m(k, n-l) + C_m(1, l) C_m(k-1, n-l) + \dots + C_m(l, l) C_m(0, n-l) = C_m(k, n), \quad (7)$$

donde $0 \leq l \leq n$. Para esto, dividamos todos los números de n cifras cuya suma de cifras es igual a k , en clases. Hagamos pertenecer a la s -ésima clase los números cuya suma de las primeras l cifras es igual a s . Entonces la suma de las $n-l$ restantes será igual a $k-s$. En virtud de la regla del producto, obtenemos que en la s -ésima clase

figuran $C_m(s, l)$ $C_m(k-s, n-l)$ números. Como la cantidad total de números de n cifras con suma de éstas igual a k es igual a $C_m(k, n)$, obtenemos, según la regla de la suma, la relación (7).

En particular, para $l=1$ la relación (7) nos conduce a la igualdad (3) (puesto que $C_m(k, 1) = 1$ para $0 \leq k \leq m-1$ y $C_m(k, 1) = 0$ si $k \geq m$).

Demostremos, por último, que tiene lugar la igualdad

$$\begin{aligned} & C_0^n C_{m-1}(k-n, n) + C_1^n C_{m-1}(k-n+1, n-1) + \dots \\ & \dots + C_s^n C_{m-1}(k-n+s, n-s) + \dots + \\ & = C_s^n C_{m-1}(k, 0) = C_m(k, n). \end{aligned} \quad (8)$$

Para esto, dividamos todos los números de n cifras en el sistema de numeración m -esimal, cuya suma de cifras es igual a k , en clases. Haremos pertenecer a la clase s -ésima, $0 \leq s \leq n$, los números en cuya escritura m -esimal hay exactamente s ceros.

Hallemos cuántos números figuran en la clase s -ésima. Cada número de dicha clase se puede escoger en dos etapas. Primeramente se eligen los lugares en los cuales se hallan los ceros. Como se consideran los números de n cifras, y la cantidad de ceros es igual a s , esto se puede efectuar de C_s^n maneras. Efectuado esto, tachemos todos los ceros y restemos 1 de cada cifra restante. Obtenemos entonces un número de $n-s$ cifras, en el cual figuran las cifras $0, 1, \dots, m-2$ (es decir, un número del sistema $(m-1)$ -esimal de numeración). La suma de las cifras de este número es igual a $k - (n-s) = k - n + s$. La cantidad de tales números es igual a $C_{m-1}(k - n + s, n - s)$. De los razonamientos expuestos se aprecia que en la clase s -ésima figuran $C_s^n C_{m-1}(k - n + s, n - s)$ números. Como la cantidad total de números de n cifras, cuya suma de cifras es k , es igual a $C_m(k, n)$, obtenemos, en virtud de la regla de la suma, la relación (8).

Como $C_2(k, n) = C_n^k$, de la relación (8) se deduce que

$$C_3(k, n) = C_0^n C_n^{k-n} + C_1^n C_{n-1}^{k-n+1} + \dots + C_n^n C_0^k.$$

Aplicando varias veces la fórmula (8), se obtiene la expresión de $C_m(k, n)$ mediante los coeficientes binómicos.

LA FICHA EN LA ESQUINA DEL TABLERO

Tomemos nuevamente un tablero de ajedrez infinito, delimitado por dos semirrectas perpendiculares, y coloquemos una ficha en la esquina de este tablero (fig. 23)¹. Escribamos en




Fig. 23.

cada casilla de este tablero el número de formas de las cuales la ficha puede llegar hasta ella. El resultado se diferenciará del obtenido antes, cuando el tablero estaba limitado solamente por una línea recta (véase la pág. 78), puesto que ahora la ficha no puede pasar la frontera vertical. Por esto, el número de posibilidades de llegar hasta alguna casilla es menor: al ir a esta casilla, la ficha no puede desviarse demasiado hacia la izquierda. Por ejemplo, a las casillas que so

¹ En la figura se representa una columna suplementaria, que nos será necesaria después.

encuentran a lo largo de la frontera, la ficha puede llegar solamente desde una casilla, y no desde dos, como tenía lugar en la pág. 78. En dicha pág. se expresaba que el número escrito en cada casilla negra era igual a la suma de los dos escritos en las casillas negras vecinas de la horizontal precedente. Para que esta ley conserve su validez también ahora, hay que trazar una vertical más a la izquierda de la frontera, y escribir un cero en cada una de sus casillas negras (es imposible llegar a esta casilla).

Calculemos de cuántas maneras se puede llegar hasta cierta casilla, teniendo en cuenta la limitación efectuada. Cada camino puede ser escrito en forma de sucesión de ceros y unidades: el cero indica un movimiento hacia la izquierda, y la unidad, hacia la derecha. En este caso, la cantidad de ceros y unidades se determina solamente por la casilla a la cual debe llegar la ficha. Por ejemplo, cualquier camino de 4 ceros y 6 unidades conduce a la casilla que se halla en la intersección de la segunda vertical y la décima horizontal (igual que antes, consideramos que las líneas extremas tienen número cero).

Sin embargo, no cualquier sucesión de ceros y unidades es admisible. Por ejemplo, no se puede comenzar a partir de cero: este movimiento saca directamente a la ficha fuera de los límites del tablero. Las sucesiones admisibles poseen la siguiente propiedad característica: delante de cada lugar hay no menos unidades que ceros; en cada momento del movimiento la cantidad de desplazamientos hacia la derecha debe ser no menor que la de desplazamientos hacia la izquierda. De otro modo, la ficha resultará fuera de los límites del tablero.

Así, pues, debemos hallar cuántas sucesiones de k ceros y m unidades tienen la siguiente propiedad: delante de cada lugar de la sucesión, la cantidad de unidades no es menor que la de ceros. Pero este problema ya fue resuelto en la pág. 53 (sólo que entonces tomábamos la letras «r» y «e» en lugar de ceros y unidades). Allí fue demostrado que el número de tales sucesiones es igual a

$\frac{m-k+1}{m+1} C_k^{m+h}$. Este número, precisamente, debe ser escrito en la intersección de la horizontal $m+k$ y la vertical $m-k$.

Ubiquemos ahora a la ficha no en la esquina, sino en la q -ésima casilla de la horizontal cero (en contra de las reglas del juego de damas, esta casilla puede ser también blanca). Ahora la ficha tiene q movimientos de reserva hacia la izquierda. Este caso corresponde al problema estudiado en la pág. 54, en el cual el cajero se había abastecido de antemano de q monedas de 50 kopeks.




Fig. 24.

Utilizando la respuesta allí obtenida, llegamos a la siguiente conclusión: la ficha llega a cierta casilla después de hacer k movimientos hacia la izquierda y m hacia la derecha, $0 \leq k \leq m+q$, el número de formas diferentes de llegar hasta dicha casilla es igual a $C_k^{m+h} - C_{k-q+1}^{m+h}$. En la fig. 24 se representa la tabla que aparece para el caso $q=3$.

EL PENTAGONO ARITMETICO

Giremos el tablero 45° . Entonces la ficha se desplazará por rectas verticales y horizontales, estando la frontera inclinada con respecto a estas rectas un ángulo de 45° . Por esto, el problema sobre la ficha en la esquina adquiere la forma siguiente:

En la esquina de un tablero de ajedrez se halla una torre. ¿De cuántas formas puede ésta llegar hasta la casilla (m, k) , desfilándose de la manera más corta y sin atravesar en su desplazamiento la diagonal del tablero (la torre no puede entrar en las casillas de esta diagonal)?

De lo demostrado más arriba se deduce que para $k \leq m$ el número de dichas formas es igual

1	1	1	1	0	0	0
1	2	3	4	4	0	0
1	3	6	10	14	14	0
1	4	10	20	34	48	48

Fig. 25.

a $\frac{m-k+1}{m+1} C_k^{m+k}$, y para $k > m$, a cero. Si se desplaza la diagonal en q casillas hacia la derecha, la respuesta toma la forma siguiente: para $0 \leq k \leq m+q$ el número de formas es

1	1	1	1	1	0	0
1	2	3	4	5	5	0
1	3	6	10	15	20	20
1	4	10	20	35	55	75
0	4	14	34	69	124	189
0	0	14	48	117	241	340

Fig. 26.

igual a $C_k^{m+k} - C_{k-q-1}^{m+k}$, y para $k > m+q$, a cero.

Si el tablero de ajedrez es finito, los números de esta tabla diferentes de cero forman un pentágono (fig. 25). Este se llama *pentágono aritmético*. La misma denominación se conserva también

para la tabla que se obtiene en el tablero infinito delimitado por dos semirrectas perpendiculares.

La propiedad fundamental del pentágono aritmético coincide con la propiedad fundamental del cuadrado aritmético: cada número del primero es igual a la suma de dos: del que se halla encima de éste y del que está a su izquierda. La diferencia entre el pentágono y el cuadrado aritmético consiste en que la diagonal del pentágono, que se halla q líneas por encima de la diagonal principal, está formada por ceros (este pentágono se asemeja al triángulo aritmético considerado en la pág. 79).

Tomemos ahora un tablero delimitado por dos semirrectas perpendiculares y tracemos en él no una, sino dos líneas, paralelas a la diagonal principal: q líneas por encima de ella y s líneas por debajo. Consideraremos que ambas líneas están «prohibidas» para la torre, y escribamos en cada casilla del tablero el número de formas de las cuales la torre puede llegar hasta dicha casilla. La tabla obtenida lleva el nombre de *hexágono aritmético*. En la fig. 26 se representa dicha tabla para el caso $q=4$, $s=3$.

El hexágono aritmético puede ser interpretado también como sigue. Tomemos un tablero de ajedrez delimitado por un segmento de $s+q$ casillas de longitud y por dos semirrectas perpendiculares a éste, y ubiguemos una ficha en la casilla que se halla a s casillas de distancia de una esquina y a q de la otra. Escribamos en cada casilla el número de formas de las cuales puede ser alcanzada ésta por nuestra ficha. Girando esta tabla en 45° , obtenemos el hexágono aritmético.

METODO GEOMETRICO DE DEMOSTRACION DE LAS PROPIEDADES DE LAS COMBINACIONES

En el capítulo II fueron demostradas algunas propiedades de las combinaciones. Mostremos cómo se deducen estas propiedades en forma

más gráfica, utilizando razonamientos geométricos.

Mostremos primeramente cómo se deduce la relación

$$C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n = 2^n. \quad (9)$$

Para esto, consideremos todos los caminos que conducen desde el punto $A(0, 0)$ hasta los puntos del tipo $B_k(k, n-k)$, $0 \leq k \leq n$ (fig. 27).

Estos caminos se dividen en clases, según en qué punto B_k , $0 \leq k \leq n$, éstos culminan. Al punto B_k conducen $P(k, n-k) = C_k^n$ caminos. Nos queda por calcular el número total de caminos considerados. Cada uno de éstos tiene longitud n . Se lo puede cifrar mediante una n -sucesión de ceros y unidades, poniendo en correspondencia ceros a los segmentos horizontales y unidades a los verticales. Pero el número de todas las n -sucesiones es igual a 2^n . Con esto queda demostrada la relación (9).




Fig. 27.

En la pág. 77 ya hemos demostrado geométricamente las relaciones

$$C_k^n = C_{k-1}^{n-1} + C_{k-1}^{n-1} \quad \text{y} \quad C_k^n = C_{n-k}^n.$$

De esta manera se pueden demostrar también igualdades más complejas. Tracemos una recta vertical de abscisa m , $0 \leq m \leq k$ (fig. 28).

Cada camino que conduce desde el punto $A(0, 0)$ hasta el $B(k, n)$ corta a esta recta y pasa además, posiblemente, parcialmente por esta recta. Dividamos el conjunto de todos los caminos desde A hasta B en clases, haciendo pertenecer a la s -ésima los caminos para los cuales el último punto común con la recta $x = m$ es el $D_s(m, s)$.




Fig. 28.

Calculemos ahora cuántos caminos que unen los puntos A y B pertenecen a la s -ésima clase. Cada uno de éstos está formado por el camino que va desde A hasta D_s , por el segmento desde $D_s(m, s)$ hasta $D'_s(m+1, s)$ (ya que D_s es el último punto de la recta $x = m$ en este camino) y por el camino desde $D'_s(m+1, s)$ hasta el punto $B(k, n)$. Según la fórmula (1), desde el punto $A(0, 0)$ hasta el $D_s(m, s)$ conducen $P(m, s)$ caminos. Desde el punto $D'_s(m+1, s)$ hasta el $B(k, n)$ conducen $P(k-m-1, n-s)$ caminos (para llegar desde D'_s hasta B hay que pasar $k-m-1$ segmentos unitarios hacia la derecha y $n-s$ hacia arriba). En virtud de la regla del producto, el número total de caminos de la clase s -ésima es igual a

$$P(m, s) P(k-m-1, n-s).$$

El número de todos los caminos desde A hasta B es igual a $P(k, n)$. Por esto, en virtud de la regla

de la suma, se obtiene que

$$P(k, n) = P(m, 0)P(k-m-1, n) + \\ + P(m, 1)P(k-m-1, n-1) + \dots \\ \dots + P(m, n)P(k-m-1, 0).$$

Esta igualdad se puede escribir como sigue:

$$C_h^{n+h} = C_m^m C_{k-m-1}^{n+h-m-1} + C_m^{m+1} C_{k-m-1}^{n+h-m-2} + \dots \\ \dots + C_m^{m+n} C_{k-m-1}^{h-m-1} \quad (10)$$

(véase la fórmula (24) de la pág. 38).

En particular, para $m=k-1$ se obtiene la relación

$$C_h^{n+h} = C_{k-1}^{h-1} + C_{k-1}^h + \dots + C_{k-1}^{h+n-1} + \dots \\ \dots + C_{k-1}^{h+n-1}. \quad (11)$$

Obsérvese que las relaciones (10) y (11) pueden ser deducidas aplicando reiteradas veces la relación $C_k^n = C_k^{n-1} + C_{k-1}^n$.

Proponemos que el lector demuestre por su cuenta, geoméricamente, la fórmula (23) de la pág. 38:

$$C_n^{n+h} = C_n^{n+h-s} C_0^s + C_{n-1}^{n+h-s} C_1^s + \dots \\ \dots + C_{n-m}^{n+h-s} C_m^s + \dots + C_{n-s}^{n+h-s} C_s^s, \quad (12)$$

donde $0 \leq s \leq k$, $0 \leq s \leq n$.

Con este fin, es necesario trazar una recta que pase por los puntos $D(k-s, n)$ y $E(k, n-s)$ y dividir el conjunto de todos los caminos desde $A(0, 0)$ hasta $B(k, n)$ en clases, según por qué punto de dicha recta pasen éstos. La fórmula (12) se diferencia solamente en las notaciones de la (23) de la pág. 38.

Por este método geométrico se puede demostrar además toda una serie de relaciones para los números C_k^{n+k} , dividiendo de diferentes formas en clases los caminos que conducen desde $A(0, 0)$ hasta $B(k, n)$.

Para demostrar análogamente las relaciones entre los números $P(n_1, \dots, n_k)$ (véanse las fórmulas (27), (28) de la pág. 39), habría que aplicar la geometría multidimensional. No nos dedicaremos a efectuarlo.

Obsérvese que también las relaciones entre los números C_k^n , deducidas en las págs. 55-57, también admiten una interpretación geométrica. Para esto, hay que tomar un tablero con una línea paralela a la diagonal principal trazada en éste y considerar solamente los caminos que no cortan a esta línea (pero que pueden tener con ésta puntos comunes). Dividiendo el conjunto de estos caminos en clases de diferentes maneras, se obtienen las fórmulas establecidas en el capítulo III.

La propia resolución del problema sobre la cola de la caja puede ser interpretada geoméricamente de un modo muy sencillo. El proceso del paso de la cola puede ser representado geoméricamente, poniendo en correspondencia a cada moneda de 50 kopeks un segmento horizontal, y a cada rublo, uno vertical. De la hipótesis del problema queda claro que esta gráfica no debe intersectar la diagonal principal. Las transformaciones efectuadas en la resolución (la adición de una persona con una moneda de 50 kopeks a la cola y la sustitución de estas monedas por rublos, y viceversa) adquieren un significado geométrico sencillo: éstas se reducen a un rebatimiento de la gráfica del paso de la cola con respecto a la recta paralela a la diagonal principal y que se halla a una unidad de longitud de distancia a ésta. Dejamos que el lector traduzca al lenguaje geométrico los razonamientos que fueron utilizados en la resolución de este problema.

MOVIMIENTOS ALEATORIOS

Los problemas analizados más arriba sobre el movimiento de las figuras del ajedrez están estrechamente ligados a los problemas de los movimientos aleatorios, de gran importancia en la física. Consideremos el siguiente problema, propuesto en 1945 en la VIII olimpiada matemática de Moscú.

Se tiene una red de caminos (fig. 29). Desde el punto A salen 2^N personas. La mitad de ellas va

en la dirección l , y la otra mitad, en la dirección m . Al llegar al primer cruce, cada grupo se divide: la mitad va en la dirección l , y la otra, en la m . Igual división tiene lugar en cada cruce. ¿Dónde estarán estas personas después de pasar N segmentos y cuántas personas habrá después de esto en cada cruce?

Como el número total de segmentos que pasa cada persona es igual a N , es evidente que todos ellos quedarán en los puntos B_k con coordenadas del tipo $(k, N - k)$, donde k adquiere los valores $0, 1, \dots, N$. Todos estos puntos están situados en la recta que pasa por los puntos $B_0(0, N)$ y $B_N(N, 0)$ (véase la fig. 29).

Ahora debemos averiguar cuántas personas llegarán al punto $B_k(k, N - k)$. Para esto, cifremos todos los caminos que conducen desde $A(0, 0)$ hasta los puntos $B_k(k, N - k)$, $k = 0, 1, \dots, N$, mediante ceros y unidades. Obten-




Fig. 29.

dremos todas las N -sucesiones posibles, formadas por ceros y unidades. Y, como sabemos, hay 2^N sucesiones de este tipo, es decir, tantas como personas salieron desde el punto A . De aquí se deduce fácilmente que cada camino lo pasará exactamente una persona. Por esto, a cada punto $B_k(k, N - k)$ llegarán exactamente tantas per-

sonas como caminos más cortos conduzcan hasta éste desde el punto A . Pero la cantidad de estos caminos más cortos ya la hemos calculado. Esta es igual a

$$P(k, N - k) = C_k^N = \frac{N!}{k!(N - k)!}.$$

Así, pues, al punto $B_k(k, N - k)$ llegarán $\frac{N!}{k!(N - k)!}$ personas. Esta cantidad es igual al k -ésimo número de la N -ésima fila del triángulo aritmético.

MOVIMIENTO BROWNIANO

Al problema que acabamos de resolver se le puede dar la siguiente forma, en esencia equivalente:

Desde el punto O de la recta Ox parten 2^N personas. La mitad de éstas va hacia la derecha, y la otra mitad, hacia la izquierda. Al cabo de 1 hora cada grupo se divide nuevamente en dos mitades, partiendo la primera hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda. Tal división tiene lugar cada hora. ¿Cuántas personas llegarán a cada punto al cabo de N horas de la partida?

Consideraremos que durante una hora éstas recorren la mitad de la unidad de trayectoria. Razonando en forma exactamente igual a como lo hicimos en la resolución del problema precedente, obtenemos el siguiente resultado: al cabo de N horas los participantes del paseo se hallarán en los puntos $B_k(k - \frac{N}{2})$, $k = 0, 1, \dots, N$ (el punto O es el origen de coordenadas).

Además, al punto B_k llegarán $C_k^N = \frac{N!}{k!(N - k)!}$ personas.

Es poco probable que las personas caminen de la forma descrita más arriba (a propósito, en una variedad folklórica de este problema en el punto O se halla un despacho de bebidas...). Sin embargo, en algunos problemas de la física tales paseos surgen de una manera natural.

Precisamente, cada paseo es el modelo elemental del llamado movimiento browniano, efectuado por las partículas debido a los choques de las moléculas.

Consideremos partículas que se pueden desplazar solamente en una línea recta. Como los choques de las moléculas tienen un carácter aleatorio, en una primera aproximación se puede considerar que durante una unidad de tiempo la mitad de las partículas se desplazará en $1/2$ de la unidad de longitud hacia la derecha, y la otra mitad, en $1/2$ de esta unidad hacia la izquierda (en realidad el proceso es mucho más complejo y son posibles movimientos en segmentos diferentes). Por esto, si se toman 2^N partículas, que se hallen al principio en el punto O , éstas se desplazarán aproximadamente como fue descrito en nuestro problema. Este desplazamiento de las partículas se denomina en la física *difusión*. El problema que hemos resuelto sobre el movimiento aleatorio de una muchedumbre nos permite hallar cómo se distribuyen las partículas que se difunden al cabo de cierto tiempo del comienzo de dicho proceso. Precisamente, al cabo de N unidades de tiempo las partículas se distribuirán según la siguiente ley: en el punto $B_k \left(k - \frac{N}{2} \right)$ habrá $C_k^N = \frac{N!}{k!(N-k)!}$ partículas.

Como ya hemos destacado, los números C_k^N son los elementos de la N -ésima fila del triángulo aritmético. En una difusión de otro carácter, se obtendrán los números de la N -ésima fila del m -triángulo aritmético. Precisamente, supongamos que al principio en el punto O había m^N partículas. Estas fueron divididas en m partes iguales y situadas en m puntos de la recta Ox , siendo la distancia entre los puntos vecinos igual a 1 y estos puntos simétricos con respecto al punto O . Después, cada parte se divide de la misma manera (se sobreentiende que si se divide una parte que se halla en algún punto B , las partículas son situadas en m puntos simétricos con respecto a B). Después de N pasos las partículas se encontrarán en los puntos B_k de coordena-

nadas $k - \frac{m-1}{2} N$, donde $k = 0, 1, \dots, (m-1)N$. En este caso, en el punto B_k habrá $C_m^N(N, k)$ partículas.

Para grandes valores de N el cálculo del número de partículas en cada punto se vuelve demasiado complejo. Pero, como sucede con frecuencia en las matemáticas, al crecer la complejidad la ley de distribución comienza a aproximarse a una ley límite sencilla, y dicha ley describe la distribución de partículas con tanta mayor exactitud cuanto mayor sea el número de éstas y cuanto más compleja sea la ley exacta.

En la teoría de probabilidades se demuestra que para grandes valores de N en el segmento $\left[x - \frac{a}{2}, x + \frac{a}{2} \right]$, donde a es pequeño con respecto a N , habrá aproximadamente

$$\frac{12am^N}{\sqrt{2\pi N(m^2-1)}} \exp \left[-\frac{72x^2}{N^2(m^2-1)^2} \right]^1$$

partículas. Esta afirmación se puede interpretar como sigue. Tracemos una línea escalonada, cuya altura en el punto $B_k \left(k - \frac{m-1}{2} N \right)$ sea igual a $C_m^N(N, k)$. Disminuyamos todas las abscisas de la línea obtenida en $\frac{N(m^2-1)}{12}$ veces, y todas las ordenadas en $\frac{12am^N}{N(m^2-1)}$ veces. Entonces, si N es grande, se obtendrá una línea escalonada que se diferencie muy poco de la gráfica de la función

$$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Esta función fue introducida en la teoría de probabilidades por el gran matemático alemán K. Gauss. Por esto, se denomina *función de Gauss*. Esta juega un papel muy importante no sólo en los problemas de la difusión de los gases, sino también en la teoría de la conducción del calor, en la teoría de los errores, etc.

¹ Mediante $\exp x$ hemos designado e^x .

EN EL REINO DE LA ZARINA DE
SHEMAJAN

Volvamos a las deambulaciones de una muchedumbre sobre el eje Ox . Sólo que ahora supondremos que a la izquierda del punto O , desde el cual ésta partió, se extienden... las posesiones de la emperatriz de Shemaján, que jugó un papel tan triste en el destino del infortunado zar Dodón y de sus hijos¹. Como el lector, probablemente, recordará, los que entraban en las tierras de ella ya no regresaban. Nosotros también consideraremos que los que caen en la mitad izquierda del eje quedan allí. Se pide hallar cuántas personas quedarán en el reino de la zarina de Shemaján y dónde quedarán las restantes al cabo de N horas de la partida desde el punto O .

Resulta ser que este problema se reduce al que estudiáramos más arriba, sobre la cola de la caja del cine. En efecto, analicemos los desplazamientos de cierta persona que haya partido del punto O . Estos desplazamientos pueden fijarse mediante una sucesión de números 1 y -1 : a cada movimiento hacia la derecha le corresponde el número 1 , y a cada uno hacia la izquierda, el -1 . Si en esta sucesión hay k unidades, la persona se desplazará k veces hacia la derecha y $N - k$ hacia la izquierda. Como resultado, ésta debería quedar en el punto $B_k \left(k - \frac{N}{2} \right)^2$.

Sin embargo, esto tendrá lugar sólo en el caso en que nuestro caminante no caiga por el camino en el reino de Shemaján. Pero llegará a este reino si en algún instante el número de desplazamientos hacia la izquierda resulta ser mayor que hacia la derecha.

Si en lugar de desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda se consideran personas que tengan monedas de 50 kopeks y rublos, se puede decir que la llegada al reino de la zarina

de Shemaján corresponde a una detención en la cola de la caja. Esto significa que el número de personas que llegan al punto $B_k \left(k - \frac{N}{2} \right)$

es igual al número de casos en que la cola, en la que hay k poseedores de monedas de 50 kopeks y $N - k$ poseedores de rublos, pasa sin tropiezos. Y nosotros sabemos que este número es diferente de cero sólo si $k \geq N - k$. En dicho caso éste es igual a (véase la pág. 53)

$$A(N - k, k) = C_{N-k}^N - C_{N-k-1}^N = \frac{N! (2k - N + 1)}{(N - k)! (k + 1)!}.$$

De esta forma, al cabo de N horas después de la partida de 2^N personas desde el punto O , al $B_k \left(k - \frac{N}{2} \right)$, donde $2k \geq N$, llegarán $C_{N-k}^N - C_{N-k-1}^N$ personas. Ahora ya no es difícil calcular cuántas personas quedarán en el reino de Shemaján. Para esto, sumemos primeramente los números $C_{N-k}^N - C_{N-k-1}^N$ desde $k = E \left(\frac{N}{2} \right) + 1$ hasta N . Obtenemos así que $C_{N-E \left(\frac{N}{2} \right) - 1}^N$ no llegaron al reino de Shemaján. Y como en total salieron 2^N personas del punto O , en las posesiones de la zarina de Shemaján habrá quedado $2^N - C_{N-E \left(\frac{N}{2} \right) - 1}^N - 1$ personas.

Si el reino de Shemaján comenzase no a la izquierda del punto O , sino a la izquierda del $O_1 \left(\text{de abscisa } -\frac{q}{2} \right)$, el resultado sería un tanto diferente. Precisamente, resultaría que en los puntos $B_k \left(k - \frac{N}{2} \right)$, $k \geq \frac{N - q}{2}$, se hallan $C_{N-k}^N - C_{N-k-q-1}^N$ personas; los restantes se hallan en las posesiones de la zarina de Shemaján. Esto se desprende directamente de los resultados del problema de la pág. 54.

¹ Alusión al cuento en verso de A. Pushkin «Cuento sobre el gallo dorado» (N. de la Ed.).

² Reemplácese que cada vez esta persona se desplaza en $1/2$ de la unidad de longitud.

³ Véase la nota al pie de la pag. 57.

 LA PARED ABSORBENTE

Ya hemos expresado que los problemas sobre los movimientos aleatorios son de gran importancia para la física: son modelos elementales de la difusión de partículas. El problema sobre la zarina de Shemaján también tiene una interpretación física sencilla: simplemente a la izquierda del punto O se halla una pared de un material que absorbe las partículas. Si la pared pasa por el punto O , surge el caso considerado al principio. Si, en cambio, ésta se halla a una distancia de $q/2$ unidades de longitud del punto O , se obtiene el problema examinado al final del apartado anterior.

En los tiempos en que la aplicación práctica fundamental del análisis combinatorio y del cálculo de probabilidades era la teoría de los juegos de azar, el problema sobre los movimientos aleatorios con absorción se enunciaba de otro modo. Se trataba de «juegos hasta la ruina». Supongamos que dos personas juegan, por ejemplo, a cara o cruz. Después de cada partida, el que pierde le paga un rublo al ganador. El participante que pierde todo el dinero cesa de jugar. Había que aclarar la probabilidad de distintos desenlaces del juego, si al principio un jugador tenía p rublos y el otro, q rublos. Es evidente la relación que existe entre este problema y el de la difusión de partículas en una región delimitada por dos lados por paredes absorbentes.

 PASEOS EN EL PLANO INFINITO

Hasta ahora hemos estudiado o bien deambulaciones de una torre de ajedrez, que tenía derecho a desplazarse solamente hacia arriba o hacia la derecha, o bien, lo que es en esencia lo mismo, deambulaciones sobre la recta infinita. Estudiemos ahora el caso en que la torre se desplaza en cualquier dirección sobre un tablero infinito. En otras palabras, resolvamos el siguiente problema:

Una torre de ajedrez se halla al principio en la casilla $O(0, 0)$ de un tablero de ajedrez infinito en todas direcciones. ¿De cuántas maneras ésta puede llegar hasta la casilla $A(p, q)$ haciendo N movimientos (suponemos que en un movimiento la torre se desplaza a una casilla vecina)?

En virtud de consideraciones de simetría, es suficiente estudiar el caso en que $p \geq 0, q \geq 0$. Si la torre se moviese por el camino más corto, ésta alcanzaría las casillas $A(p, q)$ al cabo de $p + q$ movimientos. Por esto, debe cumplirse la desigualdad $N \geq p + q$. La diferencia entre el camino de N movimientos y el más corto consiste en que la torre efectúa algunos movimientos que se excluyen el uno al otro; es evidente que el número de estos movimientos es par. Por esto, $N - p - q$ es un número par. Hagamos $N - p - q = 2k$.

Supongamos que fueron efectuados s movimientos hacia la izquierda. Entonces el número de movimientos hacia la derecha es igual a $p + s$ y para los desplazamientos por líneas verticales quedan $N - p - 2s = q + 2(k - s)$ movimientos. De éstos hay que efectuar $k - s$ movimientos hacia abajo y $q + k - s$ hacia arriba. Por esto, s debe satisfacer a la desigualdad $0 \leq s \leq k$.

Para cada valor de s que satisfaga a esta desigualdad obtenemos varios caminos, formados por s movimientos hacia la izquierda, $p + s$ hacia la derecha, $k - s$ hacia abajo y $q + k - s$ hacia arriba. Estos movimientos pueden efectuarse en cualquier orden, por lo cual el número de disposiciones es igual a $P(s, p + s, k - s, q + k - s)$. De aquí se deduce que el número total T de caminos que conducen hasta la casilla $A(p, q)$ al cabo de N movimientos es igual a

$$T = \sum_{s=0}^k P(s, p+s, k-s, q+k-s) = \sum_{s=0}^k \frac{(p+q+2k)!}{s!(p+s)!(k-s)!(q+k-s)!}$$

Transformemos la expresión obtenida. Para esto, obsérvese que

$$C_{p+h}^{p+q+2h} = \frac{(p+q+2k)!}{(p+k)!(q+k)!},$$

$$C_{h-s}^{p+h} = \frac{(p+k)!}{(k-s)!(p+s)!},$$

$$C_s^{q+h} = \frac{(q+k)!}{s!(q+k-s)!},$$

por lo cual

$$T = C_{p+h}^{p+q+2h} \sum_{s=0}^h C_{h-s}^{p+h} C_s^{q+h}.$$

Pero en el segundo miembro de esta igualdad se halla la suma de los productos de pares $C_i^j C_m^n$, cuyos índices superiores son constantes, siendo la suma de los inferiores igual a k . Aplicando la fórmula (23) de la pág. 38, se obtiene que

$$T = C_{p+h}^{p+q+2h} C_h^{p+q+2h},$$

o bien, ya que $p+q+2k=N$,

$$T = C_{p+h}^N C_h^N.$$

PROBLEMA GENERAL DE LAS TORRES

Pasemos a un nuevo ciclo de problemas combinatorios en el tablero de ajedrez. Estos problemas están relacionados con el cálculo del número de distribuciones de dos figuras del ajedrez (reyes, reinas, etc.), en las cuales una puede comer a la otra. Está claro que con esto se calcula también el número de disposiciones en las cuales estas figuras no se pueden comer una a la otra: es que el número total de disposiciones de dos figuras se calcula directamente según la fórmula de los arreglos.

Algunos problemas de este tipo ya han sido resueltos: en la pág. 25 fue analizado el problema sobre 8 torres en un tablero común de ajedrez. Generalicemos este problema y tomemos un tablero de $m \times n$, es decir, un tablero formado por m líneas horizontales y n verticales. Quere-

mos saber de cuántas maneras se pueden colocar en este tablero k torres de forma que éstas no puedan comer una a la otra.

Está claro que para que el problema tenga solución es necesario que se cumplan las condiciones $k \leq m$ y $k \leq n$, pues de otro modo algunas dos torres quedarán en la misma horizontal o vertical. Supongamos que estas condiciones se cumplen. Entonces la distribución de las torres puede efectuarse en dos etapas. Primeramente es escogen las horizontales, sobre las cuales se hallarán las torres. Como el número total de horizontales es igual a m y hay que escoger k de ellas, la elección puede efectuarse de C_k^m maneras. Análogamente las verticales sobre las que estarán las torres se pueden escoger de C_k^n formas. Como la elección de las verticales no depende de la de las horizontales, se obtienen, en virtud de la regla del producto, $C_k^m C_k^n$ modos de elección de las líneas en que se hallarán las torres.

Sin embargo, aquí no termina aún el problema. Es que k horizontales y k verticales se intersecan en k^2 casillas. Desplazando, de ser necesario, estas casillas, obtenemos un nuevo tablero de k horizontales y k verticales. Y ya sabemos que en tal tablero k torres se pueden disponer de $k!$ formas (de modo que no puedan comer una a la otra). Por esto, el número total de disposiciones requeridas es igual a

$$C_k^m C_k^n k! = \frac{n! m!}{k! (n-k)! (m-k)!}. \quad (13)$$

Por ejemplo, 3 torres, en un tablero común de ajedrez, se pueden disponer de

$$\frac{8! 8!}{3! 5! 5!} = 17\,696$$

maneras.

Para $k = m = n$, la fórmula (13) nos da la respuesta $n!$, en concordancia con lo expuesto en la pág. 25.

Si se quitase la limitación de que las torres no puedan comer una a la otra, se obtendría otra respuesta. Precisamente, habría que escoger k^m

casillas cualesquiera de entre $m \times n$. Y esto puede efectuarse de

$$C_k^{mn} = \frac{(mn)!}{k!(mn-k)!}$$

formas. Si, además, las k torres se diferenciaren entre sí, habría que multiplicar las respuestas obtenidas por $k!$.

DISTRIBUCIONES SIMETRICAS

Complicuemos ahora el problema sobre las torres, exigiendo no solamente que éstas no se pueden comer una a la otra, sino que también se dispongan en forma simétrica sobre el tablero. Aquí se obtienen muchos problemas según qué condición de simetría se imponga.

El caso más sencillo es aquel en que las torres se disponen simétricamente con respecto al centro del tablero. Designemos mediante G_n el número de soluciones del problema en el caso en que n torres se hallan en un tablero formado por n horizontales y n verticales. Ahora demostraremos que

$$G_{2n} = 2^n G_{2n-n}. \quad (14)$$

Supongamos que el tablero está formado por $2n$ horizontales y $2n$ verticales. La torre que se halla en la primera vertical puede ocupar cualquiera de las $2n$ casillas de ésta. Por hipótesis, esto determina la posición de la torre que se halla en la última vertical: ésta debe estar dispuesta simétricamente con la primera con respecto al centro del tablero. Tachemos la primera y la última verticales y las horizontales que ocupan estas torres (como el número de horizontales es par, las torres eliminadas no pueden estar en una misma horizontal). Obtenemos así un tablero formado por $2n - 2$ verticales y $2n - 2$ horizontales. Está claro que a cada disposición simétrica de las torres en el nuevo tablero le corresponde una disposición simétrica de éstas en el tablero original. De aquí se deduce, precisamente, que $G_{2n} = 2^n G_{2n-2}$ (recordemos nueva-

mente que la primera torre podía ocupar cualquiera de las $2n$ casillas de la primera vertical).

Aplicando la fórmula (14), se halla que $G_{2n} = 2^n n!$

Consideremos ahora un tablero formado por $2n + 1$ verticales y $2n + 1$ horizontales. En este caso hay una casilla que no posee simétricas: la casilla central del tablero. En ésta debe hallarse forzosamente una torre. Tachando la vertical y la horizontal centrales, obtenemos una disposición simétrica de $2n$ torres en un tablero de $2n \times 2n$. Esto significa que tiene lugar la igualdad

$$G_{2n+1} = G_{2n} = 2^n n!. \quad (15)$$

Analicemos ahora un problema un tanto más complejo: el de las disposiciones que no varían en un giro del tablero en 90° (en la fig. 30 se representa una de estas disposiciones en un tablero de 8×8). Supongamos que el tablero tiene $4n$




Fig. 30.

verticales y $4n$ horizontales, siendo el número de torres también $4n$. En este caso, la torre que se halla en la primera vertical puede ocupar cualquier casilla, a excepción de las que ocupan las esquinas, es decir, cualquiera de las $4n - 2$ casillas (en una esquina no se puede colocar una torre, puesto que después del giro de 90° se obtendrían dos torres que pueden comer una a la otra).

A esta torre le corresponden otras tres, que se hallan respectivamente en la última horizontal, en la última vertical y en la primera horizontal (éstas se obtienen a partir de la escogida mediante giros de 90° , 180° y 270°). Tachando las horizontales y las verticales en las que se hallan estas torres, obtenemos una distribución de torres en un tablero de $(4n-4) \times (4n-4)$, que tiene la misma simetría. Por esto, tiene lugar la igualdad

$$R_{4n} = (4n-2) R_{4n-4},$$

siendo R_n el número de soluciones del problema para el tablero de $n \times n$. De aquí queda claro que

$$R_{4n} = 2^n (2n-1) (2n-3) \dots 1. \quad (16)$$

El número de soluciones del problema para un tablero de $(4n+1) \times (4n+1)$ es el mismo que para uno de $4n \times 4n$, ya que en el primero una torre debe hallarse forzosamente en el centro y podemos tachar la horizontal y la vertical centrales. Por esto,

$$R_{4n+1} = R_{4n}. \quad (17)$$

Y para los tableros de $(4n+2) \times (4n+2)$ y $(4n+3) \times (4n+3)$ el número de soluciones es igual a cero. En efecto, para cada torre son posibles dos casos: o bien ésta se halla en el centro del tablero, o bien no se halla en el centro. En el segundo caso, ésta pertenece a una cuaterna de torres que se transforman una en la otra en los giros del tablero en 90° . Por esto, el número total de torres debe tener la forma $4n$ (cuando no hay casilla central en el tablero), o bien $4n+1$. Con esto hemos demostrado que $R_{4n+2} = R_{4n+3} = 0$.

Hallemos, por último, el número de disposiciones de n torres simétricas con respecto a la diagonal¹. Designemos el número de soluciones del problema sobre un tablero de $n \times n$ mediante

$$Q_n. \text{ Entonces tiene lugar la relación} \\ Q_n = Q_{n-1} + (n-1) Q_{n-2}. \quad (18)$$

En efecto, la torre de la primera vertical o bien se halla en el ángulo izquierdo inferior, o bien no se halla. En el primer caso se tachan la primera vertical y la primera horizontal y se obtiene una disposición simétrica de $n-1$ torres sobre un tablero de $(n-1) \times (n-1)$. El número de dichas disposiciones es igual a Q_{n-1} . En el segundo caso, para esta torre existirá otra, simétrica a ella con respecto a la diagonal escogida. Tachemos las verticales y las horizontales sobre las que se hallan estas torres. Obtenemos entonces una disposición simétrica de $n-2$ torres en un tablero de $(n-2) \times (n-2)$. Como el número de estas disposiciones es igual a Q_{n-2} y la torre se puede colocar en $n-1$ casillas de la primera vertical, obtenemos $(n-1) Q_{n-2}$ maneras. De aquí se obtiene, precisamente, la relación (18).

Tiene lugar la igualdad

$$Q_n = 1 + C_2^n + \frac{1}{1 \cdot 2} C_2^n C_2^{n-2} + \\ + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} C_2^n C_2^{n-2} C_2^{n-4} + \dots \quad (19)$$

Esta se deduce dividiendo todas las disposiciones de torres en clases: a la s -ésima clase referimos las disposiciones en las que s pares de torres no se encuentran en la diagonal.

En forma totalmente análoga se demuestra que el número B_n de disposiciones de n torres en un tablero de $n \times n$, distribuidas de forma que no se puedan comer una a la otra y se hallen simétricamente con respecto a ambas diagonales, satisface las relaciones

$$B_{2n} = 2B_{2n-2} + (2n-2) B_{2n-4}, \quad B_{2n+1} = B_{2n}.$$

DOS CABALLOS

¿De cuántas maneras se pueden disponer en un tablero de $m \times n$ un caballo negro y uno blanco de forma que no puedan comer uno al otro?

La resolución de este problema se complica por el hecho de que en distintas casillas el caballo

¹ Tomamos la diagonal que pasa por la casilla angular inferior izquierda.

posee distinto número de jugadas: si es $m \geq 5$ y $n \geq 5$, en la esquina del tablero hay sólo dos movimientos, en unas casillas del borde, tres, en otras, cuatro, y en el centro, ocho. Esto está relacionado con que el caballo tiene movimientos de distintos tipos: éste puede desplazarse una casilla hacia adelante y dos hacia arriba, o dos hacia atrás y una hacia abajo, etc. En total el caballo tiene 8 tipos de movimiento, los que se pueden fijar indicando cuántas casillas pasa éste en dirección horizontal y cuántas en dirección vertical. Estos movimientos tienen, de este modo, la siguiente forma: (2, 1), (1, 2), (-1, 2), (-2, 1), (-2, -1), (-1, -2), (1, -2), (2, -1).

Para superar la complicación que surgió, supongamos que el caballo es la unión de 8 figuras, cada una de las cuales tiene movimientos de un solo tipo. Veamos de cuántas maneras se pueden colocar en el tablero un caballo (2, 1) de modo que esté atacando alguna casilla de éste. Está claro que se puede hallar en cualquier vertical, a excepción de las últimas dos, y en cualquier horizontal, excepto la última. Por lo tanto, la vertical se puede escoger de $n - 2$ maneras, y la horizontal, de $m - 1$, obteniéndose en total $(m - 1)(n - 2)$ formas de colocar el caballo blanco (2, 1). En virtud de la simetría está claro que existen otras tantas formas de colocar cualquiera de los caballos blancos (± 2 , ± 1) de modo que pueda comer al negro.

Para los caballos blancos (± 1 , ± 2), el número de maneras es igual a $(m - 2)(n - 1)$. De aquí se deduce que el número total de formas de distribución de dos caballos en las que se pueden comer el uno al otro, se expresa mediante la fórmula

$$4[(m - 1)(n - 2) + (m - 2)(n - 1)] = \\ = 2[(2m - 3)(2n - 3) - 1].$$

Si pusiésemos los caballos de un mismo color de forma que se puedan defender uno al otro, habríamos obtenido dos veces menos maneras (a causa de la posibilidad de intercambiar los caballos).

Y el número de modos de disponer dos caballos de distinto color de forma que no puedan comer uno al otro, es igual a

$$m^2n^2 - 9mn + 12m + 12n - 16.$$

(Dos caballos pueden colocarse en un tablero de $m \times n$ de $mn(mn - 1)$ maneras.)

Los autores de problemas del ajedrez introducen a veces figuras imaginarias, que no se mueven como las comunes. Introduzcamos nosotros también una nueva figura, que llamaremos caballo (p , q), $p \geq 0$, $q \geq 0$. El movimiento de esta figura consiste en el desplazamiento en p casillas en dirección horizontal y q en dirección vertical. Por ejemplo, el caballo común es la unión de los caballos (1, 2) y (2, 1). Razonando en forma totalmente análoga a como lo hicimos antes, deducimos que si $0 < p \leq n$, $0 < q \leq m$, en un tablero de $m \times n$ se pueden colocar de $4(n - p)(m - q)$ maneras dos caballos (p , q) de distinto color, de modo que no puedan comer el uno al otro. Si p ó q son iguales a cero, se obtiene una cantidad dos veces menor de maneras. El número de formas se reduce al doble también en el caso en que ambos caballos son de igual color.

Cualquier figura del ajedrez se puede considerar la unión de varios caballos (p , q) para distintos valores de p y q . Por ejemplo, el rey es la unión de los caballos (0, 1), (1, 0) y (1, 1). Por esto, dos reyes de distinto color se pueden disponer en un tablero de $m \times n$ de

$$2\{n(m - 1) + (n - 1)m + 2(n - 1)(m - 1)\} = \\ = 8nm - 6m - 6n + 4$$

maneras, de forma que puedan comer uno al otro. En consecuencia, se pueden poner de $m^2n^2 - 9mn + 6m + 6n - 4$ modos, de forma que no puedan comer el uno al otro.

El alfil es la unión de caballos (1, 1), (2, 2), ..., (p, p), siendo p el menor de los números $m - 1$, $n - 1$. Supongamos, para fijar ideas, que es $m \leq n$. Entonces, $p = m - 1$, y dos alfines de distinto color se pueden disponer

de

$$4[(n-1)(m-1) + (n-2)(m-2) + \dots \\ \dots + (n-m+1) \cdot 1]$$

maneras, de forma que puedan comer uno al otro. Abriendo paréntesis y aplicando las fórmulas de la suma de los números naturales del 1 al $m-1$ y de la suma de los cuadrados de estos números, se obtiene que el número de modos se puede escribir así:

$$\frac{2m(m-1)(3n-m-1)}{3}.$$

Para $m \geq n$, hay que cambiar de lugar m y n . En particular, si $m = n$, se obtienen

$$\frac{2m(m-1)(2m-1)}{3}$$

maneras.

Para las torres es más fácil calcular el número de disposiciones de otro modo. La torre blanca se puede colocar en cualquiera de las mn casillas. Después, ella amenaza $m+n-2$ casillas, en cualquiera de las cuales se puede poner la torre negra. Por esto, obtenemos un total $mn(m+n-2)$ medios de disposición, en los cuales cada torre puede comer a la otra.

Como la reina se puede considerar la unión de un alfil y una torre, en un tablero de $m \times n$, para $m \leq n$, se pueden colocar dos reinas de

$$\frac{2}{3}m(m-1)(3n-m-1) + mn(m+n-2)$$

maneras, de forma que puedan comer una a la otra. Para $m = n$, esta expresión adquiere la forma $\frac{2}{3}m(m-1)(5m-1)$. Dejamos que el lector calcule de cuántas maneras se pueden disponer estas figuras, de forma que no tengan posibilidad de comerse una a la otra.

RELACIONES DE RECURRENCIA

En la resolución de muchos problemas combinatorios, ya hemos aplicado el método de reducción del problema dado a otro, con un número menor de objetos. Así fue deducida, por ejemplo, la fórmula que expresa el número de arreglos con repetición (pág. 10); por este método fueron resueltos casi todos los problemas sobre la partición, del capítulo IV. El método de reducción a un problema análogo para un número menor de objetos se denomina *método de las relaciones de recurrencia* (del latín *recurere-regresar*). Utilizando las relaciones de recurrencia, se puede reducir el problema para n objetos al problema para $n - 1$, después, para $n - 2$, etc. Disminuyendo sucesivamente el número de objetos, llegamos a un problema que ya es de fácil resolución. En muchos casos se logra obtener una fórmula explícita para la solución del problema combinatorio, a partir de la relación de recurrencia.

Por ejemplo, en el capítulo II (véase la pág. 24) dedujimos la fórmula $P_n = n!$ del número de permutaciones de n elementos, mediante la fórmula que expresa el número de arreglos sin repetición. Pero la misma fórmula puede ser deducida de otro modo, hallando primeramente la relación de recurrencia a la que satisface P_n .

Supongamos que se tienen n objetos $a_1, \dots, \dots, a_{n-1}, a_n$. Cualquier permutación de éstos se puede obtener así: se toma alguna permutación de los objetos a_1, \dots, a_{n-1} y se le agrega el elemento a_n . Está claro que este elemento puede ocupar distintos lugares. Se puede colocar al principio, entre el primer elemento y el segundo de la permutación, entre el segundo y el tercero, y se puede colocar también al final. El número de distintos lugares que puede ocupar el elemento a_n es igual a n , por lo cual de cada permutación de los elementos a_1, \dots, a_{n-1} se obtienen n permutaciones de los elementos $a_1, \dots, \dots, a_{n-1}, a_n$. Pero esto significa que hay n veces más permutaciones de n elementos que de $n - 1$ elementos. Con esto queda establecida la

relación de recurrencia

$$P_n = nP_{n-1}.$$

Aplicando esta relación, se deduce sucesivamente que

$$P_n = nP_{n-1} = n(n-1)P_{n-2} = n(n-1) \dots 2P_1.$$

Pero $P_1 = 1$, puesto que de un elemento se puede formar sólo una permutación. Por esto,

$$P_n = n(n-1) \dots 2 \cdot 1 = n!.$$

Hemos obtenido así nuevamente la fórmula $P_n = n!$

Hemos encontrado muchas relaciones de recurrencia en la resolución de problemas sobre la partición, sobre figuras en el tablero de ajedrez, etc. Ahora estudiaremos varios otros problemas más de este tipo, y al final del capítulo nos detendremos en la teoría general de las relaciones de recurrencia.


NUMEROS DE FIBONACCI

En el libro «Liber Abaci», que apareció en 1202, el matemático italiano Fibonacci, entre varios otros problemas, propuso el siguiente:

Un par de conejos da una vez por mes una cría de dos conejillos (un macho y una hembra); al cabo de dos meses del nacimiento los conejos recién nacidos ya dan cría. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un año, si al comienzo de éste había un par de conejos?

De la hipótesis del problema se deduce que al cabo de un mes habrá dos pares de conejos. Al cabo de dos meses, sólo el primer par dará cría, obteniéndose 3 pares. Después de un mes más, darán cría tanto el par inicial de conejos, como el que nació dos meses atrás. Por esto, habrá en total 5 pares de conejos.

Designemos mediante $F(n)$ el número de pares de conejos al cabo de n meses desde el comienzo del año. Podemos apreciar que al cabo de $n + 1$ meses habrá estos $F(n)$ pares y aún tantos pares de conejos recién nacidos como había al final del mes $n - 1$, es decir, $F(n - 1)$ pares más de cone-



jos. En otras palabras, tiene lugar la relación de recurrencia

$$F(n+1) = F(n) + F(n-1). \quad (1)$$

Como, por hipótesis, es $F(0)=1$ y $F(1)=2$, hallamos sucesivamente que

$$F(2)=3, F(3)=5, F(4)=8, \text{ etc.}$$

En particular, será $F(12) = 377$.

Los números $F(n)$ se llaman *números de Fibonacci*. Estos poseen toda una serie de propiedades notables. Ahora deduciremos la expresión de estos números mediante C_k^n . Para esto, establezcamos una relación entre los números de Fibonacci y el siguiente problema combinatorio.

Hallar el número de n -sucesiones, formadas por ceros y unidades, en las cuales no hay dos unidades seguidas.

Para establecer esta relación, tomemos cualquier sucesión de este tipo y pongámselo en correspondencia un par de conejos según la regla siguiente: a las unidades les corresponden los meses en que llega al mundo uno de los pares de «antecesores» del par dado (incluyendo el inicial),

y a los ceros, todos los meses restantes. Por ejemplo, la sucesión 010010100010 establece la siguiente «genealogía»: el propio par surgió al final del undécimo mes, sus padres, a fines del 7-mo, sus «abuelos» al fin del 5-to y sus «bisabuelos» al final del segundo mes. El par inicial de conejos se cifra entonces mediante la sucesión 000000000000.

Está claro que entonces no pueden haber dos unidades seguidas, ya que un par que acaba de ver la luz no puede, por hipótesis, dar cría al cabo de un mes. Además, en la regla indicada, a distintas sucesiones les corresponden distintos pares de conejos y viceversa, dos pares distintos de conejos tienen siempre una «genealogía» diferente, puesto que, por hipótesis, la coneja da una cría formada por un solo par de conejos.

La relación establecida demuestra que el número de n -sucesiones que posean la propiedad indicada es igual a $F(n)$.

Demostremos ahora que

$$F(n) = C_0^{n+1} + C_1^n + C_2^{n-1} + \dots + C_p^{n-p+1}, \quad (2)$$

donde $p = \frac{n+1}{2}$, si n es impar, y $p = \frac{n}{2}$, si n es par. En otras palabras, p es la parte entera del número $\frac{n+1}{2}$ (on lo sucesivo designemos la parte entera del número α mediante $E(\alpha)$; así, será, $p = E\left(\frac{n+1}{2}\right)$).

En efecto, $F(n)$ es el número de todas las n -sucesiones formadas por 0 y 1, en las cuales no hay dos unidades seguidas. El número de tales sucesiones, en las cuales hay exactamente k unidades y $n-k$ ceros, es igual a C_k^{n-k+1} (véase la pág. 43). Como además debe cumplirse la desigualdad $k \leq n-k+1$, el número k variará desde 0 hasta $E\left(\frac{n+1}{2}\right)$. Aplicando la regla de la suma, se obtiene la relación (2).

La igualdad (2) puede ser demostrada también de otra forma. Hagamos

$$G(n) = C_0^{n+1} + C_1^n + C_2^{n-1} + \dots + C_p^{n-p+1},$$

siendo $p = E \frac{n+1}{2}$. De la igualdad $C_k^n = C_k^{n-1} + C_{k-1}^{n-1}$ se deduce fácilmente que

$$G(n) = G(n-1) + G(n-2). \quad (3)$$

Además, está claro que $G(1) = 2 = F(1)$ y $G(2) = 3 = F(2)$. Como ambas sucesiones $F(n)$ y $G(n)$ satisfacen a la relación de recurrencia $X(n) = X(n-1) + X(n-2)$, tendremos que

$$G(3) = G(2) + G(1) = F(2) + F(1) = F(3)$$

y, en general, que $G(n) = F(n)$.

OTRO METODO DE DEMOSTRACION

En el apartado anterior hemos establecido directamente la relación entre el problema de Fibonacci y un problema combinatorio. Esta relación se habría podido establecer también de otro modo, demostrando directamente que el número $T(n)$ de soluciones del problema combinatorio satisfacía la misma relación de recurrencia

$$T(n+1) = T(n) + T(n-1) \quad (4)$$

que los números de Fibonacci.

En efecto, tomemos cualquier $(n+1)$ -sucesión de ceros y unidades que satisfaga a la condición requerida de que no haya dos unidades seguidas. Esta puede terminar en 0 o en 1. Si termina en 0, eliminándolo, se obtiene una n -sucesión que satisface a nuestro problema. Recíprocamente, si se toma cualquier n -sucesión de ceros y unidades, en la cual no hay dos unidades seguidas, y se le agrega un cero, se obtiene una $(n+1)$ -sucesión con la misma propiedad. Hemos demostrado que el número de sucesiones «buenas» que terminan en cero es igual a $T(n)$.

Supongamos ahora que la sucesión termina en 1. Como no puede haber dos unidades seguidas, delante de esta unidad habrá un cero. En otras palabras, la sucesión termina en 01. La $(n-1)$ -sucesión que queda después de eliminar el 0

y el 1 puede ser ya cualquiera, con tal do que no haya en ella dos unidades seguidas. Por esto, el número de sucesiones «buenas» que terminan en una unidad es igual a $T(n-1)$. Pero cada sucesión termina en 0 o en 1. En virtud de la regla de la suma, obtenemos que $T(n+1) = T(n) + T(n-1)$.

Hemos obtenido así la misma relación de recurrencia. Esto aún no implica que los números $T(n)$ y $F(n)$ coinciden. Por ejemplo, para las factoriales y las subfactoriales (véase la pag. 48) se cumpla la misma relación de recurrencia:

$$X(n+1) = n\{X(n) + X(n-1)\}. \quad (5)$$

Pero para las factoriales los dos primeros términos de la sucesión son iguales a $0! = 1$, $1! = 1$, mientras que para las subfactoriales lo son a $D(0) = 1$, $D(1) = 0$. Por esto, también resultaron diferentes los terceros, y los cuartos, y todos los términos restantes de la sucesión.

Para demostrar la coincidencia de los números $T(n)$ y $F(n)$, hay que demostrar además que $T(1) = F(1)$ y $T(2) = F(2)$. Entonces ya tendremos, en virtud de la relación de recurrencia, que también $T(3) = F(3)$, $T(4) = F(4)$, etc. Existen dos 1-sucesiones que satisfacen a la condición establecida: 0 y 1, y tres 2-sucesiones: 00, 01 y 10. Por esto, $T(1) = 2 = F(1)$ y $T(2) = 3 = F(2)$. Queda así demostrada nuestra afirmación.

PROCESO DE PARTICIONES SUCESIVAS

Para la resolución de problemas combinatorios con frecuencia se aplica el método utilizado en el apartado precedente. Para el problema dado se establece una relación de recurrencia y se demuestra que ésta coincide con la relación de recurrencia de otro problema, cuya solución ya conocemos. Si coinciden además también los términos iniciales de ambas sucesiones en cantidad suficiente (más adelante nos detendremos

con más detalle en cuántos términos deben coincidir,) ambos problemas tienen iguales soluciones.

Apliquemos el método descrito a la resolución del siguiente problema. Sea dado cierto conjunto de n objetos, dispuestos en un orden determinado. Dividamos este conjunto en dos partes no vacías de forma que una de ellas se halle a la izquierda de la segunda (o sea, digamos, que una parte esté formada por los elementos desde el primero hasta el m -ésimo, y la segunda, desde el $(m+1)$ -ésimo hasta el n -ésimo). Después, dividamos cada una de las partes, de la misma forma, en dos partes no vacías (si una de las partes ya consta de un solo elemento, ésta no se somete a particiones ulteriores). Este proceso se continúa hasta obtenerse partes formadas por un solo elemento cada una. ¿Cuántos procesos de partición de este tipo existen (dos procesos se consideran diferentes si por lo menos en un paso conducen a resultados distintos)?

Designemos el número de formas de partición para un conjunto con $n+1$ elementos mediante B_n . En el primer paso, este conjunto puede ser dividido de n maneras (la primera parte puede contener un objeto, dos, . . . , n). En correspondencia con esto, el conjunto de todos los procesos de partición se divide en n clases: en la s -ésima de ellas se hallan los procesos en los que la primera parte está formada por s objetos.

Calculemos el número de procesos en la s -ésima clase. En la primera parte hay s elementos. Por esto, se la puede seguir dividiendo por B_{s-1} procesos. La segunda parte contiene $n-s+1$ elementos, y se la puede seguir fraccionando por B_{n-s} procesos. En virtud de la regla del producto, obtenemos que la s -ésima clase está formada por $B_{s-1}B_{n-s}$ procesos diferentes. Por la regla de la suma, ahora se deduce que

$$B_n = B_0B_{n-1} + B_1B_{n-2} + \dots + B_{n-1}B_0. \quad (6)$$

Hemos obtenido una relación de recurrencia para B_n . Esta ya fue encontrada en la resolución del problema sobre la cola de la caja del cine (véase la pág. 57). Allí fue demostrado que dicha

relación se satisface con los números

$$T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}.$$

Para demostrar la igualdad

$$B_n = T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}, \quad (7)$$

nos queda mostrar que los términos iniciales T_0 y B_0 de las sucesiones $T_0, T_1, \dots, T_n, \dots$ y $B_0, B_1, \dots, B_n, \dots$ coinciden.

Tenemos que $T_0 = C_0^0 = 1$. Por otro lado, $B_0 = 1$, puesto que el conjunto formado por un elemento se puede fraccionar de un modo único. Así, pues, $B_0 = T_0$. Pero, en virtud de la fórmula de recurrencia, se tiene que $B_1 = B_0^2 = 1$. Como T_1 satisface a la misma fórmula de recurrencia, tendremos que $T_1 = T_0^2 = 1$. Luego establecemos que

$$B_2 = B_0B_1 + B_1B_0 = 2 \text{ y } T_2 = T_0T_1 + T_1T_0 = 2,$$

etc. De este modo, todos los términos de ambas sucesiones coinciden. Queda así demostrado el siguiente resultado:

El número de procesos de división sucesiva de un conjunto formado por $n+1$ elementos, distribuidos en cierto orden, es igual a

$$T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}.$$

MULTIPLICACIÓN Y DIVISION DE NUMEROS

Sean dados n números a_1, \dots, a_n , dispuestos en un orden determinado. En virtud de la propiedad asociativa de la multiplicación, el producto de estos números se puede calcular de diferentes maneras (conservando el orden de los factores). Por ejemplo, tres números se pueden multiplicar de dos maneras: $(ab)c = a(bc)$; cuatro números, de cinco maneras, etc. Se pide hallar el número de todas las formas de multiplicar n números, dados en un orden determinado.

Está claro que cada forma de multiplicación se reduce a un proceso de fraccionamiento de los n números dados en partes, formadas por un elemento cada una. Por ejemplo, la multiplicación de cuatro números por la fórmula $(ab)(cd)$ se reduce al siguiente proceso de partición: $a|b|c|d$, y la multiplicación de estos mismos números según la fórmula $((ab)c)d$, al proceso de partición $a|b|c|d$. Por esto, el número de distintos procesos de multiplicación es igual al de diferentes procesos de partición de un conjunto de n elementos, es decir, a $T_{n-1} = \frac{1}{n} C_{n-1}^{2n-2}$.

Pero, además de la propiedad asociativa, la multiplicación posee la propiedad conmutativa. Si se la tiene en cuenta, el número de procesos de multiplicación aumenta $n!$ veces, ya que n números se pueden permutar entre sí de $n!$ maneras, y después someter los números permutados a unas u otras particiones. De aquí se deduce que el número total de formas de multiplicar n números dados es igual a $(n-1)! C_{n-1}$.

Este mismo resultado se puede obtener directamente, sin aplicar la fórmula del número de procesos de particiones. Esta deducción da un nuevo método para la obtención de la fórmula que expresa el número de procesos de partición y, al mismo tiempo, para resolver el problema sobre la cola de la caja (con la condición de que el número de rublos sea igual al de monedas de 50 k).

La deducción directa consiste en lo siguiente. Supongamos que ya hemos hallado el número $\Phi(n)$ de métodos de multiplicar n números. Agreguémosles un factor más, el a_{n+1} . Analicemos de cuántas maneras se puede agregar este factor a uno de los productos de los números a_1, \dots, a_n .

El número a_{n+1} se puede multiplicar por todo el producto, tomándolo como multiplicando, o como multiplicador. Esto nos da dos formas de agregación. Pero a_{n+1} se puede agregar también en alguna de las etapas intermedias. La multiplicación de n números se reduce a $n-1$ multiplicaciones sucesivas, en cada una de las cuales

se multiplican dos números. A cada uno de éstas se puede agregar el número a_{n+1} de 4 maneras: multiplicándolo por el primer factor en calidad de multiplicando, o de multiplicador, así como también multiplicándolo por el segundo factor, en calidad de multiplicando o de multiplicador. Pero como hay $n-1$ multiplicaciones, a las cuales se puede agregar a_{n+1} , se obtienen en total $4n-4$ modos. Agregando a éstos las dos formas a que nos referimos más arriba, se obtienen $4n-2$ maneras de agregar a_{n+1} a cada una de las $\Phi(n)$ formas de multiplicar los números a_1, \dots, a_n . De aquí se deduce que

$$\Phi(n+1) = (4n-2)\Phi(n).$$

Pero $\Phi(1) = 1$. Por esto,

$$\Phi(n) = 2 \cdot 6 \dots (4n-6) = 2^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \dots (2n-3).$$

Esta respuesta coincide con la obtenida más arriba, puesto que

$$\begin{aligned} \Phi(n) &= 2^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \dots (2n-3) = \frac{(2n-2)!}{(n-1)!} = \\ &= (n-1)! C_{n-1}^{2n-2}. \end{aligned}$$

Consideremos ahora la operación de división. Escribamos la expresión

$$\frac{a_1}{\frac{a_2}{\frac{a_3}{\vdots}}}{a_n} \quad (8)$$

Esta escritura no tiene sentido, si no se indica el orden en el que se debe efectuar la división. Aclaremos de cuántas maneras se puede dar un sentido a dicha expresión. Para esto, obsérvese que cada forma de indicar el orden de la división se puede considerar también como el proceso, descrito más arriba, de partición de n elementos en partes que consistan de un elemento cada una. Y hemos visto que el número de estos procesos es igual a $\frac{1}{n} C_{n-1}^{2n-2}$.

Esto significa que a la expresión (8) se le puede dar un sentido de $\frac{1}{n} C_{n-1}^{2n-2}$ modos.

PROBLEMAS CON POLIGONOS

En algunos problemas de la química cuántica surge el siguiente problema:

En una circunferencia se ha inscrito un polígono regular de $2n$ lados. ¿De cuántas maneras se pueden unir sus vértices dos a dos de forma que los segmentos obtenidos no se intersequen?




 Fig. 31.




 Fig. 32.

Para $n = 1$ hay una sola forma de unión de este tipo¹. Para $n = 2$, se obtienen dos formas, representadas en la fig. 31. Para hallar el número $F(n)$ de maneras para todo n , deduzcamos una relación de recurrencia a la que satisfará $F(n)$. Escogamos uno de los vértices A del polígono. Se lo puede unir con cualquiera de los vértices B tal que entre A y B haya un número par de vértices

¹ Aquí consideramos que el diámetro es un polígono regular de dos lados.

(fig. 32). En correspondencia con esto, todas las formas de unir los vértices se dividen en clases, según cuántos vértices queden a la izquierda del segmento trazado desde el punto A .

Si quedan $2s$ vértices, al otro lado de éste quedarán $2(n - s - 1)$ vértices. Con esto el polígono de $2n$ lados se divide en uno de $2s$ lados y en otro de $2(n - s - 1)$ lados. Pero en el polígono de $2s$ lados se pueden trazar de $F(s)$ maneras segmentos de forma que no se intersequen. En el polígono de $2(n - s - 1)$ lados, este mismo puede efectuarse de $F(n - s - 1)$ modos. En virtud de la regla del producto, obtenemos que en la s -ésima clase figuran $F(s)F(n - s - 1)$ maneras de trazar los segmentos.

Por consiguiente, el número total de todas las formas es igual a $F(0)F(n - 1) + F(1)F(n - 2) + \dots + F(n - 1)F(0)$. Hemos obtenido la relación de recurrencia

$$F(n) = F(0)F(n - 1) + F(1)F(n - 2) + \dots + F(n - 1)F(0).$$

Esta es la misma relación que satisfacen los números $T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}$. Como $F_0 = T_0 = 1$, para todo n tendremos que $F(n) = T_n$. Así, pues, en un polígono de $2n$ lados se pueden trazar diagonales de $T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}$ maneras, de forma que no se intersequen de dos a dos.

La misma respuesta tiene el problema siguiente:

¿De cuántas maneras se puede dividir un polígono convexo de $n + 2$ lados en triángulos mediante diagonales que no se intersequen dentro de este polígono?

Designemos el número de formas mediante $\Phi(n)$. Escogamos uno de los lados del polígono y clasifiquemos todas las divisiones según con qué vértice del polígono coincida el vértice del triángulo cuya base es el lado escogido (fig. 33). Si se elimina este triángulo, el polígono se divide en uno de $s + 2$ lados y otro de $n - s + 1$ lados.

Dividiendo estos polígonos en triángulos y combinando estas divisiones entre sí, obtenemos todas las particiones del polígono inicial, en las cuales figura el triángulo eliminado. Aplicando después




Fig. 33.

las reglas del producto y de la suma, se obtiene la relación de recurrencia

$$\Phi(n) = \Phi(0)\Phi(n-1) + \Phi(1)\Phi(n-2) + \dots \\ + \Phi(n-1)\Phi(0),$$

donde hicimos $\Phi(0) = 1$. Dejamos que el lector demuestre, a partir de esta relación, que

$$\Phi(n) = T_n = \frac{1}{n+1} C_n^{2n}.$$

LA DIFICULTAD CON QUE TROPIEZA EL MAYORDOMO

Existen problemas combinatorios, en los que hace falta formar no una relación de recurrencia, sino un sistema de éstas, que vinculan varias sucesiones. Estas relaciones las expresan los $(n+1)$ -ésimos términos de las sucesiones mediante los anteriores no solamente de la sucesión dada, sino de las restantes.

Una vez el mayordomo del rey Arturo notó que habían sido invitados a almorzar a la mesa redonda 6 pares de caballeros enemistados. ¿De cuántas

maneras se los puede sentar de forma que no haya dos enemigos sentados juntos?

Si hallamos alguna forma de sentar a los caballeros, haciéndolos cambiar de lugar en círculo obtenemos 11 modos más. Ahora no consideraremos diferentes las maneras que se obtienen una de la otra por esta permutación cíclica.

Introduzcamos las siguientes notaciones. Supongamos que el número de caballeros es igual a $2n$. Sea A_n el número de formas de colocación en las que no hay dos enemigos juntos; B_n , el número de maneras en las cuales hay sentado junto exactamente un par de enemigos, y C_n , el de modos en los que hay exactamente dos pares de vecinos enemistados.

Deduzcamos primeramente la fórmula que expresa A_{n+1} mediante A_n , B_n y C_n . Supongamos que $n+1$ pares de caballeros han sido sentados de modo que no haya dos enemigos juntos. Consideraremos que todos los pares enemistados de caballeros están numerados. Pidamos al par número $n+1$ de caballeros que se levanten de la mesa. Entonces son posibles tres casos: que entre los que quedan a la mesa no haya ningún par de vecinos enemigos, que haya un par de este tipo, y que haya dos pares (los caballeros que se fueron podían haber separado estos pares).

Aclaremos ahora de cuántas formas se pueden sentar nuevamente a la mesa a los caballeros que se fueron, de forma que después de esto no haya ningún par de vecinos enemigos.

Lo más sencillo es sentarlos cuando a la mesa hay dos pares de vecinos enemigos. En este caso, uno de los que volvieron se sienta entre los caballeros del primer par, y el otro, entre los del segundo par. Esto se puede efectuar de dos maneras. Pero como el número de formas de sentar $2n$ caballeros, en las cuales dos pares de vecinos resultaron enemigos, es igual a C_n , en total se obtienen $2C_n$ formas.

Supongamos ahora que hay sentado junto sólo un par de enemigos. Uno de los que regresaron

¹ Aquí y en lo sucesivo suponemos que $n > 1$. Para $n = 1$, los razonamientos ulteriores pierden su sentido.

so debe sentar entre ellos. Entonces habrá sentados a la mesa $2n + 1$ caballeros, entre los cuales existen $2n + 1$ lugares. Entre ellos hay dos prohibidos para el segundo caballero —al lado del huésped que se acabó de sentar—, quedándole así $2n - 1$ lugares. Como puede entrar primero cualquiera de los dos caballeros que salieron, se obtienen $2(2n - 1)$ formas de ubicación. Pero el número de casos en que $2n$ caballeros se sentaron de forma que exactamente un par de enemigos quedaron vecinos, es igual a B_n . Por esto, obtenemos $2(2n - 1)B_n$ modos de sentar a los huéspedes de la forma requerida.

Por último, supongamos que no había dos enemigos juntos. En este caso, el primer caballero se sienta entre dos huéspedes cualesquiera, cosa que puede efectuarse de $2n$ maneras. Después de esto, para su enemigo quedarán $2n - 1$ lugares: puede ocupar cualquiera, a excepción de los dos que lindan con el caballero que se acabó de sentar. De este modo, si ya había $2n$ caballeros sentados en la forma necesaria, se puede sentar a los huéspedes que regresaron de $2n(2n - 1)$ formas. En total obtenemos, en este caso, $2n(2n - 1)A_n$ maneras.

Como ya indicamos, los casos analizados agotan todas las posibilidades. Por esto, tiene lugar la relación de recurrencia

$$A_{n+1} = 2n(2n - 1)A_n + 2(2n - 1)B_n + 2C_n. \quad (9)$$

Esta relación es aún insuficiente para hallar A_n para todo valor de n . Hay que averiguar además cómo se expresan B_{n+1} y C_{n+1} mediante A_n , B_n , C_n .

Supongamos que entre los $2n + 2$, $n > 1$, caballeros resultó haber exactamente un par de vecinos enemigos. Sabemos que esto puede ocurrir en B_{n+1} casos. Para evitar una disputa, pidamos que se retiren de la mesa. Entonces quedarán $2n$ caballeros, existiendo dos posibilidades: o bien entre los que quedaron no hay vecinos enemigos, o bien hay exactamente un par de tales enemigos, los cuales estaban sentados a ambos lados de los que abandonaron la sala, antes de

su retirada, y ahora quedaron juntos. En el segundo caso se puede sentar nuevamente a los que se fueron sólo en su antiguo lugar, pues de otra forma surgirá un segundo par de vecinos enemigos. Pero como $2n$ caballeros se pueden sentar de B_n maneras de forma que haya sólo un par de vecinos enemigos, obtenemos $2B_n$ variantes (los caballeros que volvieron se pueden cambiar de lugar). En el primer caso, en cambio, se puede sentar a los que volvieron entre dos caballeros cualesquiera, es decir, de $2n$ modos; y como además se pueden cambiar de lugar, se obtienen $4n$ formas. Combinándolas con todos los modos de sentar a n caballeros, en los cuales no haya vecinos enemigos, se obtienen $4nA_n$ maneras. Por último, el número del par de caballeros que se fue y volvió podía ser cualquiera, desde 1 hasta $n + 1$. De aquí se desprende que la relación de recurrencia para B_{n+1} tiene la forma.

$$B_{n+1} = 4n(n + 1)A_n + 2(n + 1)B_n. \quad (10)$$

Analícemos, por último, el caso en que entre los $2n + 2$ caballeros había dos pares de vecinos enemigos. Los números de estos pares se pueden escoger de $C_{2n+1}^2 = \frac{n(n+1)}{2}$ maneras. Sustituimos cada par por un nuevo caballero, y consideraremos que los dos nuevos caballeros son enemigos. Entonces habrá sentados a la mesa $2n$ caballeros, sin que haya entre ellos ningún par de vecinos enemigos (si los nuevos caballeros no están sentados juntos), o bien existiendo sólo un par de este tipo.

La primera variante puede tener lugar en A_n casos. Podemos volver a la agrupación inicial de 4 formas, en virtud de la posibilidad de cambiar el orden de los caballeros en cada par. Por esto, la primera variante conduce a $4C_{2n+1}^2 A_n = 2n(n + 1)A_n$ maneras.

La segunda variante, en cambio, puede tener lugar en $\frac{1}{n}B_n$ casos¹. Aquí también se puede volver

¹ Existen B_n casos en los que algunos dos enemigos se hallen juntos. Si se indica precisamente qué par debe estar junto, se obtienen n veces menos casos.

a la agrupación inicial de 4 maneras, obteniéndose en total $2(n+1)B_n$ formas. De aquí se deduce que para $n \geq 1$

$$C_{n+1} = 2n(n+1)A_n + 2(n+1)B_n. \quad (11)$$

Hemos obtenido el sistema de relaciones de recurrencia

$$A_{n+1} = 2(2n-1)(nA_n + B_n) + 2C_n, \quad (9)$$

$$B_{n+1} = 2(n+1)(2nA_n + B_n), \quad (10)$$

$$C_{n+1} = 2(n+1)(nA_n + B_n), \quad (11)$$

que son válidas para $n \geq 2$. Pero un cálculo sencillo demuestra que $A_2 = 2$, $B_2 = 0$, $C_2 = 4$. Por esto, de las relaciones (9) — (11) se desprende que $A_3 = 32$, $B_3 = 48$, $C_3 = 24$. Continuando así sucesivamente, se halla que los huéspedes se pueden sentar a la mesa de la forma requerida de $A_6 = 12\ 771\ 840$ maneras.

El problema analizado se asemeja al que damos a continuación denominado simplemente «problema sobre los invitados».

¿De cuántas maneras se pueden sentar a una mesa redonda n parejas de casados de forma que se alternen hombres y mujeres y de que no haya dos cónyuges vecinos?

Este problema se resuelve en forma aproximadamente igual al del mayordomo. Primero se distribuyen las mujeres. Si se numeran los lugares, entonces o bien todas las mujeres quedarán en lugares pares, o bien ocuparán lugares impares. Pero el número de lugares pares es igual a n , y las mujeres se pueden sentar en éstos de $n!$ modos.

De la misma cantidad de maneras pueden ocupar los lugares impares. Por consiguiente, las mujeres se pueden sentar de $2 \cdot (n!)$ formas. Después se analizan los casos en que ninguno de los maridos se halle junto a su mujer, cuando hay una pareja de casados junta y, por último, cuando hay dos parejas juntas. Proponemos al lector que escriba el sistema correspondiente de relaciones de recurrencia.

NUMEROS «DE LA SUERTE» DE LOS BILLETES DEL TROLEBUS

Algunos consideran que los números de seis cifras de los billetes del trolebús «traen suerte» si la suma de las cifras de los lugares pares es igual a la de las de los lugares impares. Por ejemplo, el billete 631 752 se considera «de la suerte», ya que $6 + 1 + 5 = 3 + 7 + 2 = 12$. Se pide hallar el número de estos billetes desde 000000 hasta 999999.

Para esto, hallemos primeramente cuántos números de tres cifras tienen una suma dada N de cifras (aquí hacemos pertenecer a los números de tres cifras también los del tipo 075, e inclusive el 000). Este problema es análogo al resuelto en el pág. 67: el número de sumandos es 3, la suma es igual a N , y los sumandos varían desde 0 hasta 9. Designemos el número de sus soluciones mediante $F(3, 9; N)$. Entonces tiene lugar la siguiente relación de recurrencia:

$$\begin{aligned} F(3, 9; N) &= F(2, 9; N) + F(2, 9; N-1) + \\ &+ F(2, 9; N-2) + F(2, 9; N-3) + \\ &+ F(2, 9; N-4) + F(2, 9; N-5) + \\ &+ F(2, 9; N-6) + F(2, 9; N-7) + \\ &+ F(2, 9; N-8) + F(2, 9; N-9). \end{aligned}$$

Análogamente

$$\begin{aligned} F(2, 9; N) &= F(1, 9; N) + F(1, 9; N-1) + \dots \\ &\dots + F(1, 9; N-9). \end{aligned}$$

Está claro que $F(1, 9; N) = 1$, si $0 \leq N \leq 9$, y que $F(1, 9; N) = 0$ en caso contrario. Aplicando estas relaciones, no cuesta trabajo llenar la tabla 8.

Para hallar ahora al número de billetes «de la suerte», hay que elevar al cuadrado los números de la tercera fila y sumar los resultados obtenidos. En efecto, cada billete «de la suerte» tiene la misma suma de cifras que se hallan en los lugares pares y en los impares. Sea esta suma igual a N . El número que se encuentra en el N -ésimo lugar de la tercera fila de nuestra tabla in-

Tabla 8

$k \backslash N$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7	6	5
3	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	63	69	73	75	75

$k \backslash N$	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	73	69	63	55	45	36	28	21	15	10	6	3	1

dica cuántos números de tres cifras tienen una suma de cifras igual a N . En otras palabras, éste indica de cuántas maneras se pueden escoger las cifras que se hallan en los lugares pares (es decir, la segunda, la cuarta y la sexta). De la misma cantidad de formas se pueden escoger las cifras de los lugares impares (el primero, el tercero y el quinto). Como estas elecciones no dependen una de la otra, en virtud de la regla del producto tendremos que hay $[F(N)]^2$ números «de la suerte» cuya suma de las cifras en los lugares pares es igual a N . Entonces, según la regla de la suma, el número total de billetes «de la suerte» es igual a

$$2 \{1^2 + 3^2 + 6^2 + 10^2 + 15^2 + 21^2 + 28^2 + 36^2 + 45^2 + 55^2 + 63^2 + 69^2 + 73^2 + 75^2\}.$$

Calculando esta suma, se obtiene la respuesta 55 252.

TABLAS DE RECURRENCIA

En la combinatoria a menudo se encuentran magnitudes que dependen no de uno, sino de varios números. Por ejemplo, el número C_k^n depende tanto de n como de k . Si la magnitud considerada

$F(n, k)$ depende de los dos números naturales n y k , sus valores se pueden disponer en forma de tabla, situando a $F(n, k)$ en la intersección de la n -ésima fila y la k -ésima columna. Ya hemos encontrado estas magnitudes más de una vez en el capítulo V: el cuadrado aritmético, los triángulos aritméticos y los triángulos aritméticos generalizados tenían precisamente la forma de tales tablas.

Además, en todos los ejemplos estudiados en el capítulo V existían dependencias entre los elementos de la tabla. Estas dependencias permitían calcular los elementos de la n -ésima fila de la tabla a partir de los de la fila precedente y, posiblemente, de algunos primeros elementos de la n -ésima. Por esto, si se daba la primera fila de la tabla y los primeros elementos de las demás, todas las filas restantes se podían calcular una tras la otra. Estas tablas se asemejan a las sucesiones de recurrencia, y las llamaremos en lo sucesivo *recurrentes*.

Para el cuadrado aritmético, la relación de recurrencia era de la forma

$$F(n, k) = F(n-1, k) + F(n, k-1), \quad (12)$$

y las condiciones de frontera se daban así: $F(n, 0) = 1$, $F(0, k) = 0$ para $k > 0$ (recuérdese que

para el cuadrado aritmético no nos referimos a la primera fila o columna, sino a la fila o columna cero).

Para el pentágono y hexágono aritméticos, la relación de recurrencia tiene también la forma (12), puesto que estas figuras aparecieron cuando calculamos de cuántas maneras podía llegar una torre hasta cierta casilla, moviéndose en un tablero delimitado por dos semirrectas perpendiculares y por una o dos líneas paralelas a la diagonal principal. Pero la torre puede llegar hasta la casilla (n, k) desde la $(n-1, k)$ o desde la $(k-1, n)$. Por esto, cualesquiera que sean las limitaciones que imponamos a sus desplazamientos, siempre se cumplirá la relación (12). A su vez las limitaciones conducen a que algunos elementos de la tabla deben ser obligatoriamente iguales a cero. Para el pentágono aritmético éstos eran los elementos que se hallaban por encima de cierta recta, paralela a la diagonal principal, y para el hexágono aritmético, los elementos que se hallaban fuera de la región determinada por dos rectas paralelas a la diagonal principal.

La relación de recurrencia para el triángulo aritmético, así como para el m -triángulo aritmético tiene otra forma. Precisamente, para el m -triángulo aritmético se cumple

$$F(n, k) = F(n-1, k-m+1) + F(n-1, k-m+2) + \dots + F(n-1, k). \quad (13)$$

Además $F(0, 0) = 1$ y $F(0, k) = 0$, si $k > 0$.

OTRA RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL MAYORDOMO

Como un ejemplo más sobre la aplicación de las tablas de recurrencia, exponemos otra resolución del problema del mayordomo (véase la pág. 103). Como el lector recordará, se trataba de hallar el número de maneras de sentar a $2n$ caballeros a una mesa redonda de forma que no haya dos enemigos juntos (habiendo n pares de enemigos entre los $2n$ caballeros).

Designemos mediante $F(m, n)$ el número de formas de ubicarlos, en las que hay juntos exactamente m pares de enemigos. Deduiremos ahora una fórmula de recurrencia que expresa a $F(m, n+1)$ mediante $F(k, n)$, $k = m-1, m, m+1, m+2$.

Consideraremos que primeramente había n pares de caballeros sentados a la mesa, y que después llegó el par $n+1$ y se sentó también. Calculemos en cuántos casos habrá sentados a la mesa m pares de vecinos enemigos. Esto puede tener lugar en los siguientes casos:

a) A la mesa había $m-1$ pares de enemigos sentados juntos. Esto pudo tener lugar de $F(m-1, n)$ maneras. Para que queden a la mesa m pares de vecinos enemistados, el nuevo par debe sentarse junto, sin separar ninguno de los pares de vecinos enemigos existentes. Pero entre $2n$ caballeros existen $2n$ intervalos, y no es posible sentarse en $m-1$ de ellos. Quedan $2n-m+1$ intervalos, donde pueden sentarse los caballeros recién llegados. Como en cada uno de estos intervalos se puede sentar de dos maneras (los caballeros que llegaron pueden cambiarse de lugar), obtenemos en total

$$2(2n-m+1)F(m-1, n) \quad (14)$$

modos.

b) A la mesa había m pares de enemigos sentados juntos. En este caso, los recién llegados pueden escoger una de dos posibilidades: o sentarse separados, sin dividir ningún par de vecinos enemigos, o sentarse juntos entre dos vecinos enemistados. Es fácil calcular que la primera solución se puede efectuar de $(2n-m)(2n-m-1)$, y la segunda, de $2m$ maneras, habiendo en total $(2n-m)^2 - 2n + 3m$ formas. Como los n pares de caballeros se pueden sentar de $F(m, n)$ modos de forma que haya juntos m pares de enemigos, obtenemos en total

$$[(2n-m)^2 - 2n + 3m]F(m, n) \quad (15)$$

modos.

c) Ahora bien, analicemos el caso en que entre los $2n$ caballeros había $m+1$ pares de enemigos

sentados juntos (lo cual puede ocurrir de $F(m+1, n)$ maneras). En este caso, uno de los recién llegados debe sentarse entre uno de los pares de vecinos enemigos, y el segundo debe hacerlo de forma que no divida ninguno de estos pares. Lo primero se puede llevar a cabo de $m+1$ formas, y lo segundo, de $2n-m-1$. En total obtenemos $2(m+1)(2n-m-1)$ posibilidades (el factor 2 apareció o causa de que cualquiera de los recién llegados puede sentarse entre los enemigos). Por esto, el caso considerado genera en total

$$2(m+1)(2n-m-1)F(m+1, n) \quad (16)$$

posibilidades.

d) Por último, supongamos que había $m+2$ pares de vecinos enemigos. Esto pudo tener lugar de $F(m+2, n)$ maneras. Para que queden solamente m pares de vecinos enemigos, cada uno de los recién llegados debe separar un par de éstos. El primer caballero puede sentarse de $m+2$ formas, después de lo cual al segundo le quedan solamente $m+1$ lugares. En total obtenemos

$$(m+1)(m+2)F(m+2, n) \quad (17)$$

posibilidades.

Es fácil advertir que hemos agotado todas las posibilidades en las que entre los $2n+2$ caballeros haya m pares de vecinos enemigos sentados a la mesa redonda. Por esto, $F(m, n)$ satisface a la siguiente relación de recurrencia:

$$\begin{aligned} F(m, n+1) &= 2(2n-m+1)F(m-1, n) + \\ &+ [(2n-m)^2 - 2n + 3m]F(m, n) + \\ &+ 2(m+1)(2n-m-1)F(m+1, n) + \\ &+ (m+1)(m+2)F(m+2, n). \end{aligned} \quad (18)$$

Un cálculo directo demuestra que

$$F(0, 2) = 2, F(1, 2) = 0, F(2, 2) = 4$$

(no consideramos diferentes las formas de ubicación que se obtienen una de otra mediante una permutación cíclica).

Aplicando la fórmula (18), se halla que $F(0, 12) = 12\ 771\ 840$.

RESOLUCION DE LAS RELACIONES DE RECURRENCIA

Diremos que una relación de recurrencia es de orden k , si ésta permite expresar $f(n+k)$ mediante $f(n)$, $f(n+1)$, \dots , $f(n+k-1)$. Por ejemplo,

$$f(n+2) = f(n)f(n+1) - 3f^2(n+1) + 1$$

es una relación de recurrencia de segundo orden, y

$$f(n+3) = 6f(n)f(n+2) + f(n+1)$$

lo es de tercer orden.

Si se da una relación de recurrencia de k -ésimo orden, ésta se satisface por infinitas sucesiones. El hecho reside en que los primeros k elementos de ésta pueden fijarse en forma totalmente arbitraria, ya que entre ellos no existe ninguna dependencia. Pero si están dados los primeros k elementos, todos los restantes se determinan de manera unívoca: el elemento $f(k+1)$ se expresa, en virtud de la relación de recurrencia, a partir de los $f(1)$, \dots , $f(k)$, el $f(k+2)$, mediante los $f(2)$, \dots , $f(k+1)$, etc.

Utilizando la relación de recurrencia y los términos iniciales, se pueden escribir, uno tras otro, los términos de la sucesión, obteniéndose en fin de cuentas cualesquiera de sus términos. Sin embargo, aquí habrá que escribir todos los términos anteriores, ya que sin conocerlos, no conoceremos tampoco los siguientes. Pero en muchos casos queremos conocer solamente un término determinado de la sucesión, y los demás son innecesarios. En estos casos es más cómodo disponer de la fórmula explícita del n -ésimo término de la sucesión. Diremos que una sucesión es *solución* de la relación de recurrencia dada, si al sustituir esta sucesión en la relación, esta última se satisface idénticamente. Por ejemplo, la sucesión

$$2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$$

es una de las soluciones de la relación de recurrencia

$$f(n+2) = 3f(n+1) - 2f(n).$$

En efecto, el término general de esta sucesión tiene la forma $f(n) = 2^n$. Esto significa que $f(n+2) = 2^{n+2}$, $f(n+1) = 2^{n+1}$. Pero para todo n tiene lugar la identidad $2^{n+2} = 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 2^n$. Por esto, 2^n es solución de la relación indicada.

Una solución de una relación de recurrencia de k -ésimo orden se denomina general, si ésta depende de k constantes arbitrarias C_1, \dots, C_k , y escogiendo estas constantes se puede obtener cualquier solución de la relación dada. Por ejemplo, la solución general de la relación

$$f(n+2) = 5f(n+1) - 6f(n) \quad (19)$$

será

$$f(n) = C_1 2^n + C_2 3^n. \quad (20)$$

En efecto, es fácil comprobar que la sucesión (20) reduce la (19) a una identidad. Por esto, sólo hay que demostrar que cualquier solución de nuestra relación se puede representar en la forma (20). Pero cualquier solución de la relación (19) se determina unívocamente por los valores de $f(1)$ y $f(2)$. Por esto, hay que demostrar que para dos números a y b cualesquiera existen valores de C_1 y C_2 tales que

$$2C_1 + 3C_2 = a$$

y

$$2^2 C_1 + 3^2 C_2 = b.$$

Pero es fácil apreciar que para valores a y b cualesquiera, el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2C_1 + 3C_2 = a, \\ 4C_1 + 9C_2 = b \end{cases} \quad (21)$$

tiene solución. Por esto, (20) es efectivamente la solución general de la relación (19).

RELACIONES DE RECURRENCIA LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Para resolver las relaciones de recurrencia, hablando con propiedad, no existen reglas generales. Sin embargo, existe una clase de relaciones

que se encuentra con mucha frecuencia y que se resuelve por un método único. Esta clase consta de relaciones de recurrencia que tienen la forma

$$f(n+k) = a_1 f(n+k-1) + a_2 f(n+k-2) + \dots + a_k f(n), \quad (22)$$

donde a_1, a_2, \dots, a_k son ciertos números. Estas se denominan *relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes*.

Analicemos primeramente cómo se resuelven estas relaciones para $k=2$, es decir, estudiemos las relaciones del tipo

$$f(n+2) = a_1 f(n+1) + a_2 f(n). \quad (23)$$

Su resolución está basada en las dos afirmaciones siguientes:

1) Si $f_1(n)$ y $f_2(n)$ son soluciones de la relación de recurrencia (23), para números A y B cualesquiera la sucesión $f(n) = Af_1(n) + Bf_2(n)$ también es solución de esta relación.

En efecto, por hipótesis tendremos que

$$f_1(n+2) = a_1 f_1(n+1) + a_2 f_1(n)$$

y

$$f_2(n+2) = a_1 f_2(n+1) + a_2 f_2(n).$$

Multipliquemos estas igualdades por A y B respectivamente y sumemos las identidades obtenidas. Se obtiene así que

$$\begin{aligned} Af_1(n+2) + Bf_2(n+2) &= \\ &= a_1 [Af_1(n+1) + Bf_2(n+1)] + \\ &+ a_2 [Af_1(n) + Bf_2(n)]. \end{aligned}$$

Esto significa, precisamente, que $Af_1(n) + Bf_2(n)$ es solución de la relación (23).

2) Si el número r_1 es raíz de la ecuación cuadrática

$$r^2 = a_1 r + a_2,$$

la sucesión

$$1, r_1, r_1^2, \dots, r_1^{n-1}, \dots$$

es solución de la relación de recurrencia

$$f(n+2) = a_1 f(n+1) + a_2 f(n).$$

Efectivamente, si $f(n) = r_1^{n-1}$, entonces será $f(n+1) = r_1^n$ y $f(n+2) = r_1^{n+1}$. Sustituyendo estos valores en la relación (23), se obtiene la igualdad

$$r_1^{n+1} = a_1 r_1^n + a_2 r_1^{n-1}.$$

Esta igualdad es válida, puesto que, por hipótesis, se tiene que $r_1^n = a_1 r_1 + a_2$.

Obsérvese que, juntamente con la sucesión $\{r_1^{n-1}\}$, cualquier sucesión del tipo

$$f(n) = r_1^{n+m}, \quad n=1, 2, \dots$$

es también solución de la relación (23). Para demostrarlo, es suficiente aplicar la afirmación (23), haciendo en ésta $A = r_1^{m+1}, B = 0$.

De las afirmaciones 1) y 2) se deduce la siguiente regla de resolución de las relaciones de recurrencia lineales de segundo orden con coeficientes constantes:

Sea dada la relación de recurrencia

$$f(n+2) = a_1 f(n+1) + a_2 f(n). \quad (23)$$

Formemos la ecuación cuadrática

$$r^2 = a_1 r + a_2, \quad (24)$$

la cual se denomina característica para la relación dada. Si esta ecuación tiene dos raíces diferentes r_1 y r_2 , la solución general de la relación (23) tendrá la forma

$$f(n) = C_1 r_1^{n-1} + C_2 r_2^{n-1}.$$

Para demostrar esta regla, obsérvese ante todo que, en virtud de la afirmación 2), $f_1(n) = r_1^{n-1}$ y $f_2(n) = r_2^{n-1}$ son soluciones de nuestra relación. Entonces, según la afirmación 1), también $C_1 r_1^{n-1} + C_2 r_2^{n-1}$ será solución de ésta. Queda solamente por demostrar que cualquier solución de la relación (23) se puede escribir en esta forma. Pero cualquier solución de la relación de segundo orden se determina por los valores de $f(1)$ y $f(2)$. Por esto, es suficiente demostrar que el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = a, \\ C_1 r_1 + C_2 r_2 = b \end{cases}$$

tiene solución para a y b cualesquiera. Dejamos que el lector compruebe que estas soluciones son

$$C_1 = \frac{b - ar_2}{r_1 - r_2}, \quad C_2 = \frac{ar_1 - b}{r_1 - r_2}.$$

El caso en que ambas raíces de la ecuación (24) coinciden, será analizado algo más tarde. Ahora expondremos un ejemplo de aplicación de la regla demostrada.

Al estudiar los números de Fibonacci, llegamos a la relación de recurrencia

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2). \quad (25)$$

La ecuación característica de ésta tiene la forma $r^2 = r + 1$.

Las raíces de esta ecuación cuadrática son los números

$$r_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad r_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Por esto, la solución general de la relación de Fibonacci tiene la forma

$$f(n) = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \quad (26)$$

(hemos utilizado la observación hecha más arriba y tomado el exponente n en lugar del $n-1$).

Hemos denominado números de Fibonacci a la solución de la relación (25) que satisface las condiciones iniciales $f(0) = 1$ y $f(1) = 2$, es decir, a la sucesión 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Está claro que ésta satisface la misma relación de recurrencia (25) y a las condiciones iniciales $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Haciendo en la fórmula (26) $n = 0$ y $n = 1$, obtenemos para C_1 y C_2 el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ \frac{\sqrt{5}}{2} (C_1 - C_2) = 1. \end{cases}$$

De aquí se halla que $C_1 = -C_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, por lo

cuál

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \quad (27)$$

A primera vista parece asombroso que esta expresión adquiera valores enteros para todo número natural n .

CASO DE RAICES IGUALES DE LA ECUACION CARACTERISTICA

Detengámonos ahora en el caso en que ambas raíces de la ecuación característica coinciden: $r_1 = r_2$. En este caso, la expresión $C_1 r_1^{n-1} + C_2 r_2^{n-1}$ ya no será solución general. En efecto, a causa de ser $r_1 = r_2$, esta expresión se puede escribir como

$$f(n) = (C_1 + C_2) r_1^{n-1} = C r_1^{n-1}.$$

Nos queda solamente una constante arbitraria C , y, en general, es imposible escogerla de modo que se satisfagan las dos condiciones iniciales $f(1) = a$, $f(2) = b$.

Por esto, debemos hallar una segunda solución, que se diferencie de la $f_1(n) = r_1^{n-1}$. Resulta ser que tal solución es $f_2(n) = n r_1^{n-1}$. En efecto, si la ecuación cuadrática $r^2 = a_1 r + a_2$ tiene dos raíces coincidentes, $r_1 = r_2$, en virtud del teorema de Vietta será $a_1 = 2r_1$, $a_2 = -r_1^2$. Por esto, nuestra ecuación se escribe así:

$$r^2 = 2r_1 r - r_1^2.$$

Entonces la relación de recurrencia tiene la siguiente forma:

$$f(n+2) = 2r_1 f(n+1) - r_1^2 f(n). \quad (28)$$

Comprobemos que $f_2(n) = n r_1^{n-1}$ es efectivamente solución de ésta. Tenemos que $f_2(n+2) = (n+2) r_1^{n+1}$, y $f_2(n+1) = (n+1) r_1^n$. Sustituyendo estos valores en la relación (28), se obtiene la identidad evidente

$$(n+2) r_1^{n+1} = 2(n+1) r_1^{n+1} - n r_1^{n+1}.$$

Esto significa que $n r_1^{n-1}$ es la solución de nuestra relación.

Ahora ya conocemos dos soluciones, $f_1(n) = r_1^{n-1}$ y $f_2(n) = n r_1^{n-1}$, de nuestra relación. Su solución general se escribe como sigue:

$$f(n) = C_1 r_1^{n-1} + C_2 n r_1^{n-1} = r_1^{n-1} (C_1 + C_2 n).$$

Ahora ya se pueden satisfacer, escogiendo C_1 y C_2 , las condiciones iniciales cualesquiera.

Las relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes de orden mayor que dos se resuelven de la misma manera. Supongamos que la relación tiene la forma

$$f(n+k) = a_1 f(n+k-1) + \dots + a_k f(n). \quad (29)$$

Escribamos la ecuación característica

$$r^k = a_1 r^{k-1} + \dots + a_k.$$

Si todas las raíces r_1, \dots, r_h de esta ecuación algebraica de k -ésimo grado son diferentes, la solución general de la relación (29) tiene la forma

$$f(n) = C_1 r_1^{n-1} + C_2 r_2^{n-1} + \dots + C_h r_h^{n-1}.$$

Si, en cambio, es, por ejemplo, $r_1 = r_2 = \dots = r_s$, a esta raíz le corresponden las soluciones

$$f_1(n) = r_1^{n-1}, f_2(n) = n r_1^{n-1}, f_3(n) = n^2 r_1^{n-1}, \dots, f_s(n) = n^{s-1} r_1^{n-1}$$

de la relación de recurrencia (29). En la solución general, a esta raíz le corresponde la parte

$$r_1^{n-1} [C_1 + C_2 n + C_3 n^2 + \dots + C_s n^{s-1}].$$

Escribiendo estas expresiones para todas las raíces y sumándolas, obtenemos la solución general de la relación (29).

Resolvamos, por ejemplo, la relación de recurrencia $f(n+4) = 5f(n+3) - 6f(n+2) - 4f(n+1) + 8f(n)$. La ecuación característica tiene aquí la forma

$$r^4 - 5r^3 + 6r^2 + 4r - 8 = 0.$$

Resolviéndola, obtenemos las raíces

$$r_1 = 2, r_2 = 2, r_3 = 2, r_4 = -1.$$

Por consiguiente, la solución general de nuestra relación tiene la siguiente forma:

$$f(n) = 2^{n-1} [C_1 + C_2 n + C_3 n^2] + C_4 (-1)^{n-1}.$$

Aplicación de la teoría de las relaciones de recurrencia a los problemas de la transmisión de información.

Ya hemos considerado (véase la pág. 66) el problema sobre la cantidad de noticias diferentes que se pueden transmitir durante un tiempo T , si se conoce el tiempo de transmisión de señales aisladas. Llegamos entonces a la relación de recurrencia

$$f(T) = f(T-t_1) + f(T-t_2) + \dots + f(T-t_n), \quad (30)$$

siendo $f(0) = 1$ y $f(T) = 0$, si $T < 0$.

Consideraremos que los números T, t_1, \dots, t_n son enteros, y designaremos mediante $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, las raíces de la ecuación característica de la relación (30). Entonces, la solución general de la ecuación adquiere la forma

$$f(T) = C_1 \lambda_1^T + \dots + C_k \lambda_k^T.$$

Sea λ_1 la mayor raíz de la ecuación característica, en valor absoluto. Entonces, para grandes valores de T todos los sumandos serán despreciablemente pequeños en comparación con el primero, y obtenemos que

$$f(T) \sim C_1 \lambda_1^T.$$

Esta igualdad permite apreciar aproximadamente la cantidad de información que se puede transmitir durante un tiempo T mediante el sistema dado de señales.

TERCERA RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL MAYORDOMO

Las dos resoluciones del problema del mayordomo, que hemos visto más arriba, conducían a relaciones de recurrencia. Ahora deduciremos una fórmula que da la solución de estas relaciones,

una fórmula que permite calcular directamente el número de maneras de ubicar a los caballeros enemigos alrededor de la mesa. Para esto, apliquemos la fórmula de inclusiones y exclusiones. Sea α_k el suceso que consiste en que el k -ésimo par de caballeros enemistados está sentado junto. Calculemos a qué es igual $N(\alpha_1 \dots \alpha_k)$, es decir, en cuántos casos hay sentados juntos k pares de enemigos. El primer par se puede ubicar a la mesa de $4n$ formas (escoger de $2n$ modos el lugar para uno, sentar al otro en el lugar siguiente en el sentido de las agujas del reloj, y tener en cuenta que los caballeros pueden cambiar de lugar). Para los demás caballeros quedarán $2n - 2$ lugares, los que deben ocuparse de forma que el segundo, tercero, ..., k -ésimo pares de enemigos queden juntos. Unamos estos pares de caballeros en un solo «objeto». Estos $k - 1$ pares y los $2n - 2k$ caballeros restantes se pueden intercambiar entre sí de $(2n - k - 1)!$ formas. Si se toma una de estas permutaciones y se sienta a los caballeros en orden en los lugares libres, los $k - 1$ pares de enemigos escogidos quedarán juntos. Esta condición tampoco se violará en el caso en que cambiemos de lugar a algunos enemigos que se hallen juntos. Como estas permutaciones de lugar se pueden efectuar de 2^{k-1} maneras, obtenemos en total $4n 2^{k-1} (2n - k - 1)!$ modos de ubicación. Así, pues,

$$N(\alpha_1 \dots \alpha_k) = 2^{k+1} n (2n - k - 1)!$$

Queremos hallar en cuántos casos ningún par de enemigos quede junto, es decir, calcular $N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n)$. Teniendo en cuenta que k pares se pueden escoger de C_n^k modos, obtenemos, en virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, que

$$\begin{aligned} A_n = N(\alpha'_1 \dots \alpha'_n) = & (2n)! - C_n^1 2^2 n (2n-2)! + \\ & + C_n^2 2^3 n (2n-3)! - \dots \\ & \dots + (-1)^k C_n^k 2^{k+1} n (2n-k-1)! + \dots \\ & \dots + (-1)^n 2^{n+1} n!. \end{aligned}$$

LA COMBINATORIA Y LAS SERIES

El método de las relaciones de recurrencia permite resolver muchos problemas combinatorios. Pero en toda una serie de casos estas relaciones son muy difíciles de componer, y aún más difíciles de resolver. A menudo estas dificultades pueden ser soslayadas utilizando las funciones generatrices. Como este concepto está relacionado con las series infinitas de potencias, ante todo será necesario presentar dichas series.

DIVISION DE POLINOMIOS

El lector sabe, claro está, cómo se dividen los polinomios entre sí. Si se dan dos polinomios $f(x)$ y $\varphi(x)$, siempre existen los polinomios $q(x)$ (cociente) y $r(x)$ (resto) tales que $f(x) = \varphi(x)q(x) + r(x)$, siendo la potencia de $r(x)$ menor que la de $\varphi(x)$, o bien $r(x) = 0$. Aquí $f(x)$ se denomina *dividendo*, y $\varphi(x)$, *divisor*. Si deseamos que la división se efectúe sin resto, habrá que admitir como cociente no sólo a los polinomios, sino también a las series infinitas de potencias. Para obtener el cociente hay que disponer los polinomios en potencias crecientes de x y dividir «en ángulo», a partir de los términos de menor grado. Veamos, por ejemplo, la división de 1 por $1 - x$. Tenemos:

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline \mp 1 \pm x \quad \left| \begin{array}{l} 1-x \\ 1+x+x^2+\dots \end{array} \right. \\ \hline \mp x \pm x^2 \\ \hline \mp x^2 \pm x^3 \\ \hline \dots \end{array}$$

Está claro que el proceso de división no terminará nunca (igual que, por ejemplo, cuando se transforma el número $\frac{1}{3}$ en una fracción decimal infinita). Es fácil demostrar, mediante inducción completa, que todos los coeficientes del cociente

son iguales a la unidad. Por esto, en calidad de cociente se obtiene la serie infinita

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

En general, si $f(x)$ y $\varphi(x)$ son dos polinomios:

$$f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n, \quad \varphi(x) = b_0 + \dots + b_m x^m,$$

siendo el término independiente b_0 del polinomio $\varphi(x)$ diferente de cero, $b_0 \neq 0$, al dividir $f(x)$ por $\varphi(x)$ se obtiene la serie infinita

$$c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + \dots \quad (1)$$

Por ejemplo, si se toman los polinomios $f(x) = 6x^3 - 2x^2 + x + 3$ y $\varphi(x) = x^2 - x + 1$, obtenemos, mediante el nuevo método de división:

$$\begin{array}{r} 3 + x - 2x^2 + 6x^3 \quad \left| \begin{array}{l} 1 - x + x^2 \\ 3 + 4x - x^2 + x^3 + 2x^4 + \dots \end{array} \right. \\ \hline \mp 3 \pm 3x \mp 3x^2 \\ \hline 4x - 5x^2 + 6x^3 \\ \hline \mp 4x \pm 4x^2 \mp 4x^3 \\ \hline -x^2 + 2x^3 \\ \hline \pm x^2 \mp x^3 \pm x^4 \\ \hline x^3 + x^4 \\ \hline \mp x^3 \pm x^4 \mp x^5 \\ \hline 2x^4 - x^6 \\ \hline \dots \end{array}$$

El mismo cuadro se observará en todos los casos en que sea $b_0 \neq 0$ y $r(x) \neq 0$. Sólo en el caso en que $f(x)$ se divida exactamente por $\varphi(x)$ la serie (1) se cortará y obtendremos un polinomio.

FRACCIONES ALGEBRAICAS Y SERIES DE POTENCIAS

Al dividir el polinomio $f(x)$ por el $\varphi(x)$, hemos obtenido una serie infinita de potencias. Surge la cuestión de cómo está relacionada dicha serie con la fracción algebraica $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$, es decir, qué sentido puede dársele a la escritura

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + \dots \quad (2)$$

Consideremos, por ejemplo, el desarrollo

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad (3)$$

Aquí no escribimos el signo de igualdad, pues desconocemos qué sentido posee la suma del segundo miembro, con un número infinito de sumandos. Para esclarecer esto, probemos sustituir en ambos miembros de la relación (3) distintos valores de x . Hagamos primeramente $x = \frac{1}{10}$.

Entonces el primer miembro de la relación adquiere el valor $\frac{10}{9}$, y el segundo se transforma en la serie numérica infinita

$$1 + 0,1 + 0,01 + \dots + 0,000 \dots 01 + \dots$$

Como no sabemos sumar una cantidad infinita de sumandos, probemos tomar primero uno, después dos, luego tres, etc. sumandos. Obtendremos las siguientes sumas: 1; 1,1; 1,11; ...
 ...; $\underbrace{1,111 \dots 1}_{n \text{ unidades}}$; ... Está claro que al au-

mentar n estas sumas se aproximan al valor $\frac{10}{9} = 1,11 \dots$, que adquirió el primer miembro de la relación (3) para $x = \frac{1}{10}$.

Lo mismo se obtiene si se sustituye el número $\frac{1}{2}$ en lugar de x en ambos miembros de la igualdad (3). El primer miembro tomará el valor 2, y el segundo se transformará en la serie numérica infinita $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$. Tomando sucesivamente uno, dos, tres, cuatro, ... sumandos, obtenemos los números 1; $1\frac{1}{2}$; $1\frac{3}{4}$; $1\frac{7}{8}$; ...
 ...; $2 - \frac{1}{2^n}$. Está claro que al aumentar n estos números tienden a 2.

Sin embargo, si se toma $x = 4$, el primer miembro de la igualdad (3) tomará el valor $-\frac{1}{3}$, obteniéndose en el segundo la serie $1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^n + \dots$. Si se suman suce-

sivamente los términos de ésta, se obtienen las sumas 1; 5; 21; 85; ... Estas sumas aumentan indefinidamente y no tienden al número $-\frac{1}{3}$.

De este modo, nos hemos encontrado con dos casos. Para diferenciarlos, introducamos el concepto general de convergencia y divergencia de una serie numérica. Sea dada la serie numérica infinita

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad (4)$$

Se dice que ésta converge hacia el número b , si la diferencia $b - (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ tiende a cero al aumentar n indefinidamente. En otras palabras, cualquiera que sea el número $\varepsilon > 0$ que indiquemos, la desviación entre la suma $a_1 + \dots + a_n$ y b será, a partir de cierto número N , menor que ε :

$$|b - (a_1 + \dots + a_n)| < \varepsilon, \text{ si } n \geq N.$$

En este caso, el número b se denomina suma de la serie infinita $a_1 + \dots + a_n + \dots$ y yo escribo $b = a_1 + \dots + a_n + \dots$.

Si no existe ningún número b hacia el cual converja la serie dada (4), ésta se llama divergente.

La investigación efectuada más arriba demuestra que

$$\frac{10}{9} = 1 + 0,1 + 0,01 + \dots + 0,00 \dots 01 + \dots,$$

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots,$$

mientras que la serie $1 + 4 + 16 + \dots + 4^n + \dots$ diverge.

Un análisis más detallado demuestra que si $|x| < 1$, la serie $1 + x + \dots + x^n + \dots$ converge hacia $\frac{1}{1-x}$, y si $|x| \geq 1$, ésta diverge.

Para demostrar esta afirmación, es suficiente observar que

$$1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

y que cuando $n \rightarrow \infty$ la expresión x^{n+1} tiende a cero si $|x| < 1$, y a infinito si $|x| \geq 1$. Para

$x = \pm 1$ se obtienen las series numéricas divergentes $1 + 1 + \dots + 1 + \dots$ y $1 - 1 + \dots + 1 - 1 + \dots$.

Así, pues, si $|x| < 1$, será

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + \dots \quad (5)$$

Obsérvese que la igualdad (5) es la fórmula, conocida del curso escolar de matemáticas, de la suma de una progresión geométrica infinita decreciente.

Hemos aclarado, de este modo, el sentido de la escritura

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + \dots$$

Esta muestra que para los valores de x que se hallen en cierta región, precisamente, para $|x| < 1$, la serie del segundo miembro converge hacia $\frac{1}{1-x}$. Se dice que la función $\frac{1}{1-x}$ se desarrolla, para $|x| < 1$, en la serie de potencias $1 + x + \dots + x^n + \dots$.

Ahora ya podemos esclarecer también un problema más general. Supongamos que al dividir el polinomio $f(x)$ por el $\varphi(x)$ se obtiene la serie infinita

$$c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + \dots \quad (6)$$

Resulta ser que para valores de x suficientemente pequeños, la serie (6) converge hacia $f(x)/\varphi(x)$.

Las dimensiones de la región de convergencia dependen de las raíces del denominador, es decir, de los números para los que éste se anula. Precisamente, si estos números son iguales a x_1, \dots, x_k y r es el menor de los números $|x_1|, \dots, |x_k|$, la serie converge en la región $|x| < r$. Por ejemplo, la función $1 - x$ se anula para $x = 1$, por lo cual el desarrollo de $\frac{1}{1-x}$ es válido solamente para $|x| < 1$. Y la función $x^2 - 7x + 10$ se anula para $x_1 = 2, x_2 = 5$, por lo que el desarrollo de $\frac{x-1}{x^2-7x+10}$ converge para $|x| < 2$.

Obsérvese que ninguna de las raíces del denominador es igual a cero, ya que supusimos que el término independiente de éste es diferente de cero, por lo cual $\varphi(0) = b_0 \neq 0$.

En otras palabras, siempre existe una región $|x| < r$, en la cual se cumple la igualdad

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + \dots \quad (7)$$

No sólo las fracciones algebraicas pueden desarrollarse en series de potencias, sino también muchas otras funciones. En el análisis matemático se demuestra, por ejemplo, que

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (8)$$

y

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (9)$$

Para nosotros tendrá interés el desarrollo

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (10)$$

De la fórmula (10) se aprecia que

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \quad (11)$$

Tomando una cantidad suficiente de términos de la serie (11), se obtiene el valor de e con cualquier grado de exactitud. Las primeras cifras decimales de e tienen la forma 2.718281828459045 ...

Las series (8), (9), (10) convergen para todo valor de x .

Señalemos además la siguiente afirmación importante:

Una función $f(x)$ no puede tener dos desarrollos distintos en series de potencias.

En otras palabras, si

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$$

y

$$f(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots,$$

entonces será

$$a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n, \dots$$

OPERACIONES CON LAS SERIES
DE POTENCIAS

Pasemos ahora a las operaciones con las series de potencias. Supongamos que las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$ han sido desarrolladas en series de potencias:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots \quad (12)$$

y

$$\varphi(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots \quad (13)$$

Entonces, tendremos que

$$f(x) + \varphi(x) = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots) + \\ + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots).$$

Resulta ser que los sumandos del segundo miembro de esta igualdad se pueden permutar y agrupar los términos con iguales potencias de x (esta afirmación no es en absoluto tan evidente como parecería a primera vista: en el segundo miembro tenemos sumas infinitas, y en éstas existe gran cantidad de casos en que no se pueden permutar los sumandos). Después de esta reagrupación, se obtiene

$$f(x) + \varphi(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots \\ \dots + (a_n + b_n)x^n + \dots \quad (14)$$

La serie del segundo miembro de la igualdad (14) se denomina suma de las series de potencias (12) y (13).

Veamos ahora cómo se desarrolla en serie de potencias el producto de las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$. Tenemos que

$$f(x)\varphi(x) = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots) \times \\ \times (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots). \quad (15)$$

Resulta que, al igual que en el caso de los polinomios, las series del segundo miembro de la igualdad (15) se pueden multiplicar término a término (omitimos la demostración de esto). Hallemos la serie que se obtiene después de multiplicar término a término. El término indepen-

diente de esta serie es igual a a_0b_0 . Los términos que contienen x se obtienen dos veces: al multiplicar a_0 por b_1x , y al multiplicar a_1x por b_0 . Estos nos dan

$$a_0b_1x + a_1b_0x = (a_0b_1 + a_1b_0)x.$$

Análogamente se calculan los términos que contienen x^2 :

$$a_0b_2x^2 + a_1b_1x^2 + a_2b_0x^2 = (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2.$$

En general, el coeficiente de x^n tiene la forma $a_0b_n + a_1b_{n-1} + \dots + a_nb_0$.

De esto modo,

$$f(x)\varphi(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \dots \\ \dots + (a_0b_n + \dots + a_nb_0)x^n + \dots \quad (16)$$

La serie del segundo miembro de la igualdad (16) se denomina *producto de las series* (12) y (13).

En particular, elevando la serie (12) al cuadrado, obtenemos

$$f^2(x) = a_0^2 + 2a_0a_1x + (a_1^2 + 2a_0a_2)x^2 + \\ + 2(a_0a_3 + a_1a_2)x^3 + \dots \quad (17)$$

Veamos ahora cómo se dividen las series de potencias entre sí. Supongamos que el término independiente de la serie (13) es diferente de cero. Mostremos que en este caso existe una serie de potencias

$$c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + \dots, \quad (18)$$

tal que

$$(b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots) \times \\ \times (c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + \dots) = \\ = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots \quad (19)$$

Para demostrarlo, multipliquemos las series del primer miembro de esta igualdad. Obtenemos así la serie

$$b_0c_0 + (b_0c_1 + b_1c_0)x + \dots \\ \dots + (b_0c_n + \dots + b_nc_0)x^n + \dots$$

Para que esta serie coincida con la serie (12), es necesario y suficiente que se cumplan las

igualdades

$$\begin{aligned} b_0 c_0 &= a_0, \\ b_0 c_1 + b_1 c_0 &= a_1, \\ &\dots \dots \dots \\ b_0 c_n + \dots + b_n c_0 &= a_n, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

Estas igualdades nos dan un sistema infinito de ecuaciones para determinar los coeficientes $c_0, c_1, \dots, c_n, \dots$. De la primera ecuación del sistema se obtiene que $c_0 = \frac{a_0}{b_0}$. Sustituyendo el valor obtenido en la segunda ecuación, tendremos

$$b_0 c_1 = a_1 - \frac{b_1 a_0}{b_0},$$

de donde se halla que $c_1 = \frac{a_1 b_0 - b_1 a_0}{b_0^2}$. En general, si ya han sido hallados los coeficientes c_0, \dots, c_{n-1} , para la determinación de c_n tendremos la ecuación

$$b_0 c_n = a_n - b_1 c_{n-1} - \dots - b_n c_0.$$

Esta ecuación tiene resolución, puesto que $b_0 \neq 0$.

Hemos demostrado así la existencia de la serie (18), que satisface a la relación (19). La serie (18) se denomina cociente de la división de las series (12) y (13). Se puede demostrar que la primera se obtiene al desarrollar la función $f(x)/\varphi(x)$. De esta manera, las series de potencias se pueden sumar, multiplicar y dividir (lo último bajo la condición de que el término independiente del divisor sea diferente de cero). Estas operaciones corresponden a las operaciones con las funciones que se desarrollan.

Obsérvese que ahora podemos interpretar de otra forma el significado del desarrollo

$$\frac{a_0 + \dots + a_n x^n}{b_0 + \dots + b_n x^n} = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + \dots \quad (20)$$

Esta igualdad indica que la serie $c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + \dots$ se obtiene al dividir la serie finita de potencias $a_0 + \dots + a_n x^n$ por la serie finita $b_0 + \dots + b_n x^n$. En otras

palabras, esta igualdad significa que

$$(b_0 + \dots + b_n x^n)(c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + \dots) = a_0 + \dots + a_n x^n, \quad (21)$$

donde el producto del primer miembro de la igualdad se determina por una fórmula del tipo (16).

APLICACION DE LAS SERIES DE POTENCIAS A LA DEMOSTRACION DE IDENTIDADES

Mediante las series de potencias se pueden demostrar muchas identidades. Con este fin, se toma cierta función y se desarrolla de dos maneras en serie de potencias. Como la función puede ser representada sólo de una forma única en serie de potencias, los coeficientes de iguales potencias de x deben coincidir en ambas series. Esto conduce, precisamente, a la identidad que se quería demostrar. Tomemos, por ejemplo, el desarrollo que ya conocemos

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Elevando ambos miembros de este desarrollo al cuadrado, obtenemos

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n + \dots \quad (22)$$

Si se sustituye aquí x por $-x$, se obtiene que

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - \dots + (-1)^n (n+1)x^n + \dots \quad (22')$$

Multiplicando los desarrollos (22) y (22'), se deduce que

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^2} \frac{1}{(1+x)^2} &= 1 + [1(-2) + 2 \cdot 1]x + \\ &\quad + [1 \cdot 3 + 2(-2) + 3 \cdot 1]x^2 + \dots \\ &= 1 + [(-1)^n (n+1) + 2(-1)^{n-2} n + \dots \\ &\quad \dots + (-1)^n (n+1) \cdot 1]x^n + \dots \quad (23) \end{aligned}$$

Es evidente que los coeficientes de potencias impares de x se anulan (cada sumando figura dos veces en estos coeficientes, con signos opuestos). El coeficiente de x^{2n} es igual a

$$1(2n+1) - 2 \cdot 2n + 3(2n-1) - \dots + (2n+1).$$

Por lo la función $\frac{1}{(1-x)^2(1+x)^2}$ se puede desarrollar en serie de potencias también de otra forma. Tenemos que

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)^2} = \frac{1}{(1-x^2)^2}.$$

Y el desarrollo de $\frac{1}{(1-x^2)^2}$ se obtiene del (22), si se sustituye en éste x por x^2 :

$$\frac{1}{(1-x^2)^2} = 1 + 2x^2 + 3x^4 + \dots \\ \dots + (n+1)x^{2n} + \dots \quad (24)$$

Sabemos que ninguna función puede tener dos desarrollos distintos en series de potencias. Por esto, el coeficiente de x^{2n} del desarrollo (23) debe ser igual al coeficiente de dicho término en el desarrollo (24). De aquí se desprende la siguiente identidad:

$$1(2n+1) - 2 \cdot 2n + 3(2n-1) - \dots \\ \dots + (2n+1) \cdot 1 = n + 1.$$

FUNCIONES GENERATRICES

Ahora ya podemos pasar al tema principal de este capítulo: el concepto de función generatriz. Sea dada cierta sucesión de números $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$. Formemos la serie de potencias $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$

Si esta serie converge en alguna región hacia la función $f(x)$, dicha función se denomina generatriz de la sucesión numérica $a_0, a_1, \dots, \dots, a_n, \dots$. Por ejemplo, de la fórmula

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + \dots$$

se desprende que la función $\frac{1}{1-x}$ es generatriz de la sucesión de números $1, 1, 1, \dots, 1, \dots$. Y la fórmula (22) indica que, la función generatriz de la sucesión numérica $1, 2, 3, 4, \dots, \dots, n, \dots$ es la función $\frac{1}{(1-x)^2}$.

Nos interesarán las funciones generatrices de las sucesiones $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ relacionadas en una u otra forma con los problemas combinatorios. Mediante estas funciones se logra obtener las propiedades más variadas de estas sucesiones. Además, estudiaremos cómo están ligadas las funciones generatrices con la resolución de las relaciones de recurrencia.

BINOMIO DE NEWTON

Ahora obtendremos la función generatriz de la sucesión finita de números $C_0^n, C_1^n, \dots, C_n^n$.

Del curso de álgebra elemental se conoce que

$$(a+x)^2 = a^2 + 2ax + x^2$$

y que

$$(a+x)^3 = a^3 + 3a^2x + 3ax^2 + x^3.$$

Estas igualdades son casos particulares de una fórmula más general, que expresa el desarrollo de $(a+x)^n$. Escribamos $(a+x)^n$ en la forma

$$(a+x)^n = \underbrace{(a+x)(a+x)\dots(a+x)}_{n \text{ veces}}. \quad (25)$$

Abramos paréntesis en el segundo miembro de esta igualdad, escribiendo todos los factores en el orden en que los encontremos. Por ejemplo, $(a+x)^3$ lo escribiremos en la forma

$$(a+x)^2 = (a+x)(a+x) = aa + ax + xa + xx, \quad (26)$$

y $(a+x)^3$, en la forma

$$(a+x)^3 = (a+x)(a+x)(a+x) = \\ = aaa + aax + axa + axx + xaa + \\ + xax + xxa + xxx. \quad (27)$$

Se puede apreciar que en la fórmula (26) figuran todos los arreglos con repetición, forma-

dos por las letras x y a , tomadas de a dos, y en la fórmula (27), los arreglos con repetición de las mismas letras, pero tomadas de a tres. Lo mismo tendrá lugar en el caso general: después de abrir paréntesis en la fórmula (25), se obtienen todos los arreglos posibles con repetición de las letras x y a , tomadas de a n .

Agrupemos ahora términos semejantes. Estos serán los que contengan igual cantidad de letras x (con lo cual también tendrán el mismo número de letras a). Halleemos cuántos términos habrá, en los que figuron k letras x y, en consecuencia, $n - k$ letras a . Estos términos son permutaciones con repetición, formadas por k letras x y $n - k$ letras a . Por esto, en virtud de la fórmula (5) del capítulo II, su número es igual a

$$P(k, n-k) = C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

De aquí se deduce que, después de agrupar términos semejantes la expresión $x^k a^{n-k}$ figurará con un coeficiente igual a $C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Hemos demostrado, pues, que

$$(a+x)^n = C_0^n a^n + C_1^n a^{n-1} x + \dots + C_k^n a^{n-k} x^k + \dots + C_n^n x^n. \quad (28)$$

Se acostumbra a denominar la igualdad (28) fórmula del binomio de Newton. Si hacemos en esta igualdad $a=1$, se obtiene

$$(1+x)^n = C_0^n + C_1^n x + \dots + C_k^n x^k + \dots + C_n^n x^n. \quad (29)$$

Podemos apreciar que $(1+x)^n$ es la función generatriz de los números C_k^n , $k=0, 1, \dots, n$.

Mediante esta función generatriz se puede demostrar en forma relativamente sencilla muchas propiedades de los números C_k^n , que fueron obtenidas antes mediante razonamientos bastante rebuscados.

Demostremos primeramente que

$$C_k^{n+1} = C_k^n + C_{k-1}^n. \quad (30)$$

Para esto es suficiente multiplicar ambos miembros de la igualdad (29) por $1+x$. Se obtiene entonces que

$$(1+x)^{n+1} = (C_0^n + C_1^n x + \dots + C_k^n x^k + \dots + C_n^n x^n)(1+x).$$

La expresión del primer miembro de esta igualdad la desarrollaremos nuevamente en el binomio de Newton. Sólo que habrá que sustituir en dicha fórmula n por $n+1$. Por esto, el coeficiente de x^k será C_k^{n+1} . En el segundo miembro, en cambio, al abrir paréntesis el término que contiene x^k surge dos veces: al multiplicar $C_k^n x^k$ por 1 y al multiplicar $C_{k-1}^n x^{k-1}$ por x . Por esto, el coeficiente de x^k en el segundo miembro de la igualdad tendrá la forma $C_k^n + C_{k-1}^n$. Pero a ambos lados debe haber un mismo polinomio. Por esto, los coeficientes de x^k en ambos miembros deben ser iguales. Esto demuestra, precisamente, que $C_k^{n+1} = C_k^n + C_{k-1}^n$.

En la pág. 36 hemos demostrado esta igualdad. Pero allí fueron necesarios razonamientos combinatorios. Análogamente, en la pág. 36 fue demostrado, de manera relativamente compleja, que

$$2^n = C_0^n + C_1^n + \dots + C_k^n + \dots + C_n^n. \quad (31)$$

Sin embargo, mediante la fórmula (29) la demostración se obtiene instantáneamente: es suficiente hacer $x=1$. Y si hacemos en esta igualdad $x=-1$, se obtiene que

$$0 = C_0^n - C_1^n + C_2^n - C_3^n + \dots + (-1)^k C_k^n + \dots + (-1)^n C_n^n.$$

En otras palabras, la suma de los valores de C_k^n para k pares es igual a la suma de dichos valores para k impares:

$$C_0^n + C_2^n + C_4^n + \dots + C_{2m}^n + \dots = \dots = C_1^n + C_3^n + \dots + C_{2m+1}^n + \dots \quad (32)$$

Ambas sumas son finitas y se interrumpen cuando $2m$ y $2m+1$ respectivamente sean mayores que n .

Se obtiene un resultado curioso si en la igualdad (29) se hace $x=t$, $n=4m$. Un cálculo son-

cillo demuestra que $(1 + i)^4 = -4$. Por esto, $(1 + i)^{4m} = (-4)^m$. Obtenemos entonces la igualdad

$$\begin{aligned} (-4)^m &= C_3^{4m} + C_1^{4m}i + C_2^{4m}i^2 + C_4^{4m}i^3 + \\ &+ C_2^{4m}i^4 + \dots + C_{2m}^{4m}i^{4m} = C_3^{4m} + C_1^{4m}i - C_2^{4m} - \\ &- C_4^{4m}i + C_1^{4m} + \dots + C_{2m}^{4m}. \end{aligned}$$

Separando en esta igualdad las partes real e imaginaria, se obtienen las identidades

$$C_3^{4m} - C_2^{4m} + C_4^{4m} - \dots - C_{2m-1}^{4m} = 0, \quad (33)$$

$$C_1^{4m} - C_2^{4m} + C_4^{4m} + \dots + C_{2m}^{4m} = (-4)^m. \quad (34)$$

Dejamos que el lector compruebe por sí mismo qué identidades se obtienen si se hace $n = 4m + 1$, $4m + 2$, $4m + 3$.

Es fácil demostrar también, mediante la función generatriz, la igualdad

$$\begin{aligned} C_s^{n+m} &= C_0^n C_s^m + C_1^n C_s^{m-1} + \dots + C_k^n C_s^{m-k} + \dots \\ &\dots + C_n^n C_s^{m-n} \quad (35) \end{aligned}$$

(aquí se toma $C_s^m = 0$ para $s - k < 0$; por esto, en realidad k varía desde 0 hasta el menor de los números n, m). Para la demostración, hay que tomar los desarrollos

$$(1+x)^n = C_0^n + C_1^n x + \dots + C_k^n x^k + \dots + C_n^n x^n$$

y

$$(1+x)^m = C_0^m + C_1^m x + \dots + C_k^m x^k + \dots + C_m^m x^m$$

y multiplicar ambos miembros de estas igualdades. Se obtiene entonces

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+m} &= [C_0^n + C_1^n x + \dots + C_k^n x^k + \dots \\ &\dots + C_n^n x^n] [C_0^m + C_1^m x + \dots + C_s^m x^s + \dots + C_m^m x^m]. \end{aligned}$$

Apliquemos ahora al primer miembro la fórmula del binomio de Newton (para el exponente $n + m$), y abramos paréntesis en el segundo miembro. Si se comparan los coeficientes de x^s en ambos miembros, se obtiene, precisamente, la igualdad (35). Un caso particular de ésta es la

$$C_n^{2n} = (C_0^n)^2 + (C_1^n)^2 + \dots + (C_n^n)^2 \quad (35')$$

(recuérdese que $C_k^n = C_{n-k}^n$).

FORMULA POLINOMICA

Aplicando la fórmula del binomio de Newton, se pueden desarrollar también expresiones más complejas, como por ejemplo la $(x + y + z)^4$. Precisamente,

$$\begin{aligned} (x + y + z)^4 &= [(x + y) + z]^4 = \\ &= (x + y)^4 + C_1^4 (x + y)^3 z + C_2^4 (x + y)^2 z^2 + \\ &\quad + C_3^4 (x + y) z^3 + C_4^4 z^4. \end{aligned}$$

Desarrollemos ahora $(x + y)^4$, $(x + y)^3$, $(x + y)^2$ nuevamente según la fórmula del binomio de Newton. Se obtiene así

$$\begin{aligned} (x + y + z)^4 &= x^4 + y^4 + z^4 + 4x^3y + 4x^2y^2 + 4xy^3 + \\ &+ 4y^3z + 4xz^3 + 4yz^3 + 6x^2y^2 + 6xz^2z + \\ &+ 6y^2z^2 + 12x^2yz + 12xy^2z + 12xyz^2. \quad (36) \end{aligned}$$

Pero este método es demasiado engorroso. Aplicándolo, es difícil responder inmediatamente a la pregunta: ¿con qué coeficiente figura en el desarrollo de $(x + y + z)^n$ el término $x^k y^l z^m$? Por esto, es deseable deducir una fórmula que nos dé directamente el desarrollo de la expresión

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n. \quad (37)$$

No es difícil adivinar esta fórmula. En la demostración de la del binomio de Newton, vimos que en el desarrollo de $(a + x)^n$ el término $x^k a^{n-k}$ figuraba con coeficiente $P(k, n - k)$. Se puede suponer que en el desarrollo de $(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n$, el coeficiente de $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$ será $P(k_1, k_2, \dots, k_m)$. Ahora demostraremos que esto es así precisamente.

En efecto, escribamos $(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n$ en forma de producto de n factores y abramos paréntesis, escribiendo todos los factores en su orden de aparición. Está claro que entonces se obtendrán todos los arreglos posibles con repetición, formados por las letras x_1, x_2, \dots, x_m , tomadas de a n . Pero algunos de estos arreglos nos darán términos semejantes. Así será, si en el primer arreglo cada letra figura tantas veces como en el segundo. Por esto, para hallar el coe-

coeficiente de $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$, hay que calcular cuántos arreglos con repetición contienen k_1 veces la letra x_1 , k_2 veces la x_2 , ..., k_m veces la x_m . Está claro que cada uno de estos arreglos es una permutación con repetición de k_1 letras x_1 , k_2 letras x_2 , ..., k_m letras x_m . Hemos denotado mediante $P(k_1, k_2, \dots, k_m)$ el número de tales permutaciones. De esta manera, efectivamente, el coeficiente de $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$ en el desarrollo de la expresión (37) es $P(k_1, k_2, \dots, k_m)$ (donde, se sobreentiende, $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$, ya que en cada término del desarrollo figura un elemento de cada paréntesis, siendo n el número total de paréntesis que se multiplican).

La fórmula que acabamos de demostrar se puede escribir como sigue:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum P(k_1, k_2, \dots, k_m) x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}, \quad (38)$$

donde la suma se generaliza a todas las particiones posibles $k_1 + k_2 + \dots + k_m$ del número n en m sumandos enteros no negativos. Recuerdese que

$$P(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! k_2! \dots k_m!}. \quad (39)$$

Está claro que si los números s_1, \dots, s_m se obtienen de los k_1, \dots, k_m mediante una permutación, será $P(s_1, \dots, s_m) = P(k_1, \dots, k_m)$. Por esto, por ejemplo, en el desarrollo (36) los coeficientes de $x^2 y z$ y $x y z^2$ son iguales. Esta observación facilita el cálculo de los términos del desarrollo (37). Es suficiente hallar los coeficientes para las particiones $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$ tales que $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_m$, y luego cambiar de lugar los exponentes de todas las formas posibles.

Calculemos, por ejemplo, $(x + y + z)^5$. Si no se tiene en cuenta el orden de los sumandos, el número 5 se puede dividir en 3 sumandos de cinco formas:

$$5 = 5 + 0 + 0, \quad 5 = 4 + 1 + 0, \quad 5 = 3 + 2 + 0, \\ 5 = 3 + 1 + 1, \quad 5 = 2 + 2 + 1.$$

Pero $P(5, 0, 0) = 1$, $P(4, 1, 0) = 5$, $P(3, 2, 0) = 10$, $P(3, 1, 1) = 20$, $P(2, 2, 1) = 30$. Por esto,

$$(x + y + z)^5 = x^5 + y^5 + z^5 + 5x^4y + 5xy^4 + 5x^4z + \\ + 5xz^4 + 5y^4z + 5yz^4 + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + \\ + 10x^3z^2 + 10x^2z^3 + 10y^3z^2 + 10y^2z^3 + 20x^2yz^2 + \\ + 20xy^2z + 20xyz^2 + 30x^2y^2z + 30x^2yz^2 + 30xyz^2.$$

La fórmula (38) permite demostrar fácilmente algunas propiedades de los números $P(k_1, k_2, \dots, k_m)$. Por ejemplo, si hacemos en esta fórmula $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 1$, se obtiene que

$$m^n = \sum P(k_1, \dots, k_m). \quad (40)$$

Aquí la suma se extiende a todas las particiones del número n en m sumandos enteros no negativos: $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$, tomándose en consideración el orden de los sumandos.

Ahora bien, si se multiplican ambos miembros de la igualdad (38) por $x_1 + x_2 + \dots + x_m$, se aplica al primer miembro un desarrollo análogo y se abren paréntesis en el segundo, se obtiene para $P(k_1, \dots, k_m)$ la siguiente relación de recurrencia:

$$P(k_1, k_2, \dots, k_m) = P(k_1 - 1, k_2, \dots, k_m) + \\ + P(k_1, k_2 - 1, \dots, k_m) + \dots \\ + P(k_1, k_2, \dots, k_m - 1). \quad (41)$$

Si ahora multiplicamos ambos miembros de los desarrollos

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum P(k_1, k_2, \dots, \\ \dots, k_m) x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$$

y

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^s = \sum P(l_1, l_2, \dots, \\ \dots, l_m) x_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_m^{l_m}$$

y comparamos los coeficientes de $x_1^{r_1} x_2^{r_2} \dots$

$\dots x_m^{r_m}$ en ambos miembros, se obtiene la identidad $P(r_1, r_2, \dots, r_m) =$

$$= \sum_{k_p + l_p = r_p} P(k_1, k_2, \dots, k_m) P(l_1, l_2, \dots, l_m). \quad (42)$$

Aquí en el segundo miembro la suma se extiende a todos los números enteros no negativos $k_1, k_2, \dots, k_m; l_1, l_2, \dots, l_m$ tales que $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n, l_1 + l_2 + \dots + l_m = s$ y $k_1 + l_1 = r_1, k_2 + l_2 = r_2, \dots, k_m + l_m = r_m$. Dejamos que el lector efectúe con detalle los razonamientos correspondientes.

Si sobreentiende que las fórmulas (40)–(42) se podrían haber obtenido sin utilizar la función generatriz (38). Pero en tal caso habríamos tenido que efectuar razonamientos de carácter geométrico, análogos a los aplicados en la pág. 86, aunque ya no en el plano, sino en el espacio n -dimensional. La aplicación de la función generatriz permite obtener estas identidades automáticamente, efectuando sólo transformaciones algebraicas sencillas.

SERIE DE NEWTON

Hemos denominado, como se hace comúnmente en la escuela, *binomio de Newton* a la fórmula del desarrollo de $(a+x)^n$. Esta denominación es incorrecta desde el punto de vista de la historia de las matemáticas. Dicha fórmula era bien conocida por los matemáticos del Asia Central Omar Hayyam, Giyaseddin y otros. En la Europa Occidental, mucho antes que Newton la conocía Blas Pascal. El mérito de Newton reside en otro hecho: él logró generalizar la fórmula del desarrollo de $(x+a)^n$ para el caso de exponentes no enteros. Precisamente, éste demostró que si a es un número positivo y $|x| < a$, para todo valor real de α tiene lugar la igualdad

$$(x+a)^\alpha = a^\alpha + \alpha a^{\alpha-1}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{1 \cdot 2} a^{\alpha-2}x^2 + \dots \\ \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)}{1 \cdot 2 \dots k} a^{\alpha-k}x^k + \dots \quad (43)$$

Sólo que ahora se obtiene no un número finito de sumandos, sino una serie infinita. En el caso en que n es un número entero, el paréntesis $(n-n)$ se anula. Pero este paréntesis figura en los coefi-

cientes de todos los términos, a partir del $(n+2)$ -ésimo, por lo cual todos estos términos del desarrollo son iguales a cero. Por esto, para un n natural la serie (43) se transforma en una suma finita.

No demostraremos la fórmula (43) para todo valor de α , sino que estudiaremos solamente el caso en que α es un número entero negativo, $\alpha = -n$. En este caso, la fórmula que debemos demostrar adquiere la siguiente forma:

$$(x+a)^{-n} = a^{-n} - na^{-n-1}x + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} a^{-n-2}x^2 - \\ - \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{-n-3}x^3 + \dots \\ \dots + (-1)^k \frac{n(n+1) \dots (n+k-1)}{1 \cdot 2 \dots k} a^{-n-k}x^k + \dots \quad (44)$$

Esta igualdad se puede escribir de otro modo como sigue:

$$\left(1 + \frac{x}{a}\right)^{-n} = 1 - C_1^n \left(\frac{x}{a}\right) + C_2^{n+1} \left(\frac{x}{a}\right)^2 - \\ - C_3^{n+2} \left(\frac{x}{a}\right)^3 + \dots + (-1)^k C_k^{n+k-1} \left(\frac{x}{a}\right)^k + \dots \quad (44')$$

$$\left(\text{téngase en cuenta que } C_k^{n+k-1} = \frac{n(n+1) \dots (n+k-1)}{1 \cdot 2 \dots k}\right).$$

Nos resultará más cómodo sustituir $\frac{x}{a}$ por $-t$ y demostrar, en lugar de la (44'), la siguiente igualdad:

$$(1-t)^{-n} = 1 + C_1^{n+1}t + C_2^{n+2}t^2 + \dots + C_k^{n+k-1}t^k + \dots \quad (45)$$

Efectuaremos la demostración mediante inducción completa con respecto a n . Para $n=1$, tenemos que $C_k^{n+k-1} = C_k^k = 1$, por lo cual la relación a demostrar adquiere la forma siguiente:

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots + t^k + \dots \quad (46)$$

Pero ésta es la conocida fórmula de la suma de una progresión geométrica infinita decreciente (recuérdese que en nuestro caso es $|t| = \left| \frac{x}{a} \right| < 1$).

Supongamos ahora que ya fue demostrada la igualdad (45) y demosremos que ésta implica la igualdad

$$(1-t)^{-n-1} = 1 + C_1^{n+1}t + C_2^{n+2}t^2 + \dots + C_k^{n+h}t^k + \dots \quad (47)$$

Para esto, multipliquemos ambos miembros de la igualdad (47) a demostrar por $1-t$. Si después de esto obtenemos una igualdad correcta, la (47) también tendrá lugar. Pero después de multiplicar por $1-t$, se obtiene

$$(1-t)^{-n} = [1 + C_1^{n+1}t + C_2^{n+2}t^2 + \dots + C_{h-1}^{n+h-1}t^{h-1} + C_h^{n+h}t^h + \dots] (1-t).$$

Abramos paréntesis en el segundo miembro y reduzcamos los términos semejantes. Los sumandos que contienen t^k aparecen dos veces: cuando se multiplica a $C_k^{n+h}t^k$ por 1 y cuando se multiplica a $C_{h-1}^{n+h-1}t^{h-1}$ por $-t$. Por esto, el coeficiente de t^k en el segundo miembro es igual a

$$C_k^{n+h} - C_{h-1}^{n+h-1} = C_k^{n+h-1}$$

(véase la fórmula (11) de la pág. 36).

Pero, por la hipótesis de la inducción, el coeficiente de t^k en el desarrollo de $(1-t)^{-n}$ es precisamente igual a C_k^{n+h-1} . Como después de multiplicar por $1-t$ hemos obtenido una igualdad correcta, la igualdad (45) a demostrar también lo es.

Si el lector no quiere ir desde una igualdad a demostrar hasta otra ya conocida, sino que prefiere el camino contrario, debe multiplicar ambos miembros de la igualdad (45) por los términos correspondientes de la relación (46). Se obtiene entonces que

$$(1-t)^{-n-1} = (1 + C_1^n t + C_2^{n+1} t^2 + \dots + C_k^{n+h-1} t^k + \dots) \times (1 + t + t^2 + \dots + t^k + \dots).$$

Ahora hay que abrir paréntesis y aplicar la identidad

$$C_0^{n-1} + C_1^n + C_2^{n+1} + \dots + C_k^{n+h-1} = C_k^{n+h}$$

(véase la pág. 37). Como resultado, se llega a la relación (47) que se quería demostrar.

De esta manera, la igualdad (45) queda demostrada. Recalquemos una vez más que ésta es válida solamente para $|t| < 1$. Si un lector descuidado prueba hacer en ambos miembros de la igualdad $t = -1$ y deduco, a base de esto, la fórmula «notable»

$$\frac{1}{2^n} = 1 - C_1^n + C_2^{n+1} - C_3^{n+2} + \dots + (-1)^k C_k^{n+h-1} + \dots, \quad (48)$$

cometerá un grave error, pues en el segundo miembro se halla la suma de números enteros, que nunca dará el número fraccionario $1/2^n$.

En el siglo XVIII, cuando la teoría de las series infinitas aún no estaba estudiada al detalle, estos errores eran cometidos también por matemáticos conocidos. Fueron necesarias decenas de años de investigaciones intensas para comprender con exactitud qué es la suma de una serie infinita, cuándo ésta existe y cuándo no. A propósito, hay que acotar que a fines del siglo XIX el concepto de suma de una serie infinita fue considerablemente generalizado, y existen definiciones en las que la fórmula (48) tiene lugar. Pero estos problemas se salen del marco de nuestro libro.

Comparemos el desarrollo que acabamos de demostrar

$$(1+t)^{-n} = 1 - C_1^n t + C_2^{n+1} t^2 - \dots + (-1)^k C_k^{n+h-1} t^k + \dots \quad (49)$$

con la fórmula

$$(1+t)^n = 1 + C_1^n t + C_2^{n+1} t^2 + \dots + C_k^{n+h} t^k + \dots + t^n. \quad (50)$$

Llegamos nuevamente a la conclusión de que al generalizar el símbolo C_k^n para valores negatos

de n , hay que hacer

$$C_k^- = (-1)^k C_k^{n+k-1}$$

(véase la pág. 80). Para valores negativos de k será $C_k^n = 0$, por cuanto en los desarrollos (49) y (50) no figuran sumandos con potencias negativas de t . Por las mismas razones será $C_k^n = 0$ para $0 \leq n < k$.

EXTRACCION DE RAICES CUADRADAS

Hemos demostrado la fórmula de Newton para todos los valores enteros del exponente. Pero, como ya indicamos, esta fórmula es válida no sólo para los valores enteros del exponente, sino también para los fraccionarios (o inclusive para los irracionales). Aquí no la demostraremos para dichos valores, limitándonos a escribir los desarrollos para $n = \frac{1}{2}$ y $n = -\frac{1}{2}$.

Para $n = \frac{1}{2}$, la fórmula de Newton adquiere la forma

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{1 \cdot 2}x^2 + \dots \\ &+ \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots \\ &\dots + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(\frac{1}{2}-k+1\right)}{1 \cdot 2 \dots k}x^k + \dots \quad (51) \end{aligned}$$

Transformando esta expresión, se obtiene:

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \dots \\ &\dots + (-1)^{k-1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-3)}{2 \cdot 4 \dots 2k}x^k + \dots \end{aligned}$$

Análogamente, para $n = -\frac{1}{2}$ deducimos que

$$\begin{aligned} (1+x)^{-\frac{1}{2}} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \dots \\ &\dots + (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)}{2 \cdot 4 \dots 2k}x^k + \dots \quad (52) \end{aligned}$$

Las fórmulas obtenidas se pueden escribir de otro modo. Para esto, obsérvese que

$$\frac{1 \cdot 3 \dots (2k-1)}{2 \cdot 4 \dots 2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k} (k!)^2} = \frac{1}{2^{2k}} C_k^{2k}.$$

Por esto,

$$\begin{aligned} (1+x)^{-\frac{1}{2}} &= 1 - \frac{1}{2^2} C_1^{2k} x + \frac{1}{2^4} C_2^{2k} x^2 - \dots \\ &\dots + \frac{(-1)^k}{2^{2k}} C_k^{2k} x^k + \dots \quad (53) \end{aligned}$$

Análogamente se obtiene que

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 2^2} C_1^{2k} x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2^3} C_2^{2k} x^3 - \dots \\ &\dots + \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^{2k-1}} C_{k-1}^{2k} x^k + \dots \quad (54) \end{aligned}$$

Estas expresiones convergen en la región $|x| < 1$. Con su ayuda se pueden extraer raíces cuadradas con cualquier grado de exactitud. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \sqrt{30} &= \sqrt{25+5} = 5 \sqrt{1+0.2} = 5(1+0.2)^{\frac{1}{2}} = \\ &= 5 \left[1 + \frac{1}{2} \cdot 0.2 - \frac{1}{2 \cdot 4} \cdot 0.2^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot 0.2^3 - \dots \right] = \\ &= 5.4775 \dots \end{aligned}$$

Sin embargo, no nos interesarán las aplicaciones de las fórmulas indicadas a la extracción de raíces cuadradas de números, sino las relaciones entre los coeficientes binomiales que se desprenden de los desarrollos obtenidos. Para obtener estas relaciones, elevemos ambos miembros de la igualdad (53) al cuadrado. En virtud de la regla del pro-

ducto de series de potencias, se obtiene que el coeficiente de x^k en el segundo miembro tiene la forma

$$\frac{(-1)^k}{2^{2k}} [C_k^{2k} + C_1^2 C_{k-1}^{2k-2} + C_2^4 C_{k-2}^{2k-4} + \dots + C_k^{2k}].$$

En el primer miembro de esta igualdad se obtiene

$$\left[(1+x)^{-\frac{1}{2}} \right]^2 = \frac{1}{1+x}.$$

Pero nosotros sabemos que

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k + \dots$$

Comparando los coeficientes de las potencias x^k en ambos miembros de la igualdad, se obtiene la identidad

$$C_k^{2k} + C_1^2 C_{k-1}^{2k-2} + C_2^4 C_{k-2}^{2k-4} + \dots + C_k^{2k} = 2^{2k}. \quad (55)$$

Razonamientos análogos, aplicados a la igualdad (54), nos conducen a la identidad

$$\frac{C_{k-2}^{2k-4}}{1 \cdot (k-1)} + \frac{C_1^2 C_{k-3}^{2k-6}}{2 \cdot (k-2)} + \frac{C_2^4 C_{k-4}^{2k-8}}{3 \cdot (k-3)} + \dots + \frac{C_{k-2}^{2k-4}}{(k-1) \cdot 1} = \frac{C_{k-1}^{2k-2}}{k}, \quad (56)$$

que es válida para $k \geq 2$.

Continuando, multipliquemos miembro a miembro los desarrollos (53) y (54). Se obtiene entonces

$$1 = \left[1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 2^3} C_1^2 x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2^5} C_2^4 x^3 - \dots + \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^{2k-1}} C_{k-1}^{2k-2} x^k + \dots \right] \times \left[1 - \frac{1}{2^2} C_1^2 x + \frac{1}{2^4} C_2^4 x^2 + \dots + \frac{(-1)^k}{2^{2k}} C_k^{2k} x^k + \dots \right]. \quad (57)$$

Abramos paréntesis en el segundo miembro de esta igualdad. Obtendremos una serie de potencias, con la particularidad de que se deduce de la igualdad (57) que todos los coeficientes de esta serie

(a excepción del término independiente) son iguales a cero. De aquí se obtiene la identidad

$$C_{k-1}^{2k-2} + \frac{1}{2} C_1^2 C_{k-2}^{2k-4} + \frac{1}{3} C_2^4 C_{k-3}^{2k-6} + \dots + \frac{1}{k} C_k^{2k-2} = \frac{1}{2} C_k^{2k}, \quad (58)$$

la cual es válida para $k \geq 1$.

Obsérvese, por último, que

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} (1+x)^{-1} = (1+x)^{-\frac{1}{2}},$$

de donde se desprende que

$$\left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 2^3} C_1^2 x^2 + \dots + \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^{2k-1}} C_{k-1}^{2k-2} x^k + \dots \right) \times \left(1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^k x^k + \dots \right) = 1 - \frac{1}{2^2} C_1^2 x + \frac{1}{2^4} C_2^4 x^2 - \dots + \frac{(-1)^k}{2^{2k}} C_k^{2k} x^k + \dots$$

Abriendo paréntesis en ambos miembros de esta igualdad y comparando los coeficientes de x^k en ambas partes, se obtiene la identidad

$$1 - \frac{1}{2 \cdot 2^2} C_1^2 - \frac{1}{3 \cdot 2^4} C_2^4 - \dots - \frac{1}{k \cdot 2^{2k-2}} C_{k-1}^{2k-2} = \frac{1}{2^{2k-1}} C_k^{2k}. \quad (59)$$

FUNCIONES GENERATRICES Y RELACIONES DE RECURRENCIA

Ya hemos expresado que la teoría de las funciones generatrices está estrechamente ligada a las relaciones de recurrencia. Volvamos a analizar la división de los polinomios. Sean

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

y

$$\varphi(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$$

dos polinomios, con la particularidad de que $b_0 \neq 0$. Además, supongamos que $n < m$, es decir, que el quebrado algebraico $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ es propio (en caso contrario se puede separar de éste la parte entera).

Sabemos que si

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + \dots, \quad (60)$$

entonces será

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = \\ = (b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m)(c_0 + c_1x + \dots \\ \dots + c_nx^n + \dots). \end{aligned}$$

Abramos paréntesis en el segundo miembro de esta igualdad y comparemos los coeficientes de iguales potencias de x en ambos miembros. Primeramente obtendremos m relaciones del tipo siguiente:

$$\begin{aligned} b_0c_0 &= a_0, \\ b_0c_1 + b_1c_0 &= a_1, \\ b_0c_2 + b_1c_1 + b_2c_0 &= a_2, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned} \quad (61)$$

$b_0c_{m-1} + b_1c_{m-2} + \dots + b_{m-1}c_0 = a_{m-1}$
(si $n < m-1$, consideramos que $a_{n+1} = \dots = a_{m-1} = 0$). Las demás relaciones son todas del mismo tipo:

$$\begin{aligned} b_0c_{m+k} + b_1c_{m+k-1} + \dots + b_{m+k}c_k = 0, \\ k = 0, 1, \dots \end{aligned} \quad (62)$$

(puesto que en $f(x)$ no hay términos que contengan a x^m, x^{m+1}, \dots). Así, pues, los coeficientes $c_0, c_1, \dots, c_k, \dots$ de la serie (60) satisfacen a la relación de recurrencia (62). Los coeficientes de esta relación dependen solamente del denominador de la fracción. A su vez el numerador es necesario para la determinación de los primeros términos c_0, c_1, \dots, c_{m-1} de la sucesión de recurrencia.

Recíprocamente, si se da la relación de recurrencia (62) y se fijan los términos c_0, c_1, \dots, c_{m-1} , primeramente, a partir de las fórmu-

las (61), calculamos los valores de a_0, \dots, a_{m-1} . Entonces, la función generatriz de la sucesión de números $c_0, c_1, \dots, c_k, \dots$ es el quebrado algebraico

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}. \quad (63)$$

A primera vista parecería ser que hemos ganado poco al sustituir la relación de recurrencia por la función generatriz. Porque de todos modos habrá que dividir el numerador por el denominador, lo que a su vez nos conducirá a la misma relación de recurrencia (62). Pero la ventaja consiste en que con la fracción (63) se pueden efectuar algunas transformaciones algebraicas, lo cual facilita la determinación de los números c_k .

DESARROLLO EN FRACCIONES ELEMENTALES

Ahora mostraremos cómo se pueden resolver las relaciones de recurrencia efectuando transformaciones algebraicas de la función generatriz. Supongamos que el denominador de la fracción (63) se halla desarrollado en factores de primer grado:

$$\varphi(x) = b_m(x - \alpha_1)^r \dots (x - \alpha_k)^s.$$

Obsérvese que para esto es necesario previamente resolver la ecuación $b_0 + \dots + b_mx^m = 0$, es decir, la ecuación característica de la relación (62).

Entonces queda claro que la fracción (63) fue obtenida como resultado de reducir a común denominador las siguientes fracciones elementales:

$$\frac{A_{11}}{(x - \alpha_1)^r}, \frac{A_{12}}{(x - \alpha_1)^{r-1}}, \dots, \frac{A_{1, r-1}}{(x - \alpha_1)},$$

$$\dots \dots \dots \frac{A_{k1}}{(x - \alpha_k)^s}, \frac{A_{k2}}{(x - \alpha_k)^{s-1}}, \dots, \frac{A_{k, s-1}}{x - \alpha_k}.$$

En otras palabras,

$$\frac{a_0 + \dots + a_{m-1}x^{m-1}}{b_m(x-\alpha_1)^r \dots (x-\alpha_h)^s} = \frac{A_{11}}{(x-\alpha_1)^r} + \dots \\ \dots + \frac{A_{1, r-1}}{x-\alpha_1} + \dots + \frac{A_{h1}}{(x-\alpha_h)^s} + \dots \\ \dots + \frac{A_{h, s-1}}{x-\alpha_h}. \quad (64)$$

Aquí desconocemos solamente los coeficientes $A_{11}, \dots, A_{h, s-1}$. Para hallarlos, hay que multiplicar ambos miembros de la igualdad (64) por el denominador $(x-\alpha_1)^r \dots (x-\alpha_h)^s$, abrir paréntesis y comparar los coeficientes de iguales potencias de x . Del sistema obtenido de ecuaciones se hallan, precisamente, los coeficientes buscados.

A veces se logra evitar la resolución del sistema de ecuaciones. Supongamos, por ejemplo, que hay que desarrollar la fracción

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 6x + 1}{x^4 - 5x^2 + 4}.$$

Como

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = \\ = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2),$$

este desarrollo deberá tener la forma

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 6x + 1}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)} = \\ = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{x+2}.$$

Reduciendo a denominador común, se obtiene que

$$x^3 - 2x^2 + 6x + 1 = A(x+1)(x-2)(x+2) + \\ + B(x-1)(x-2)(x+2) + \\ + C(x-1)(x+1)(x+2) + D(x-1)(x+1)(x-2).$$

Esta igualdad debe satisfacerse para todo valor de x . Pero para $x = 1$ todos los sumandos del segundo miembro de la igualdad, a excepción del primero, se anulan, y obtenemos $-6A = 6$. Por esto, $A = -1$. Análogamente, haciendo $x = -1$, $x = 2$, $x = -2$, se halla que $B = -\frac{4}{3}$,

$$C = \frac{13}{12}, D = \frac{9}{4}. \text{ De esto modo,} \\ \frac{x^3 - 2x^2 + 6x + 1}{x^4 - 5x^2 + 4} = -\frac{1}{x-1} - \frac{4}{3(x+1)} + \\ + \frac{13}{12(x-2)} + \frac{9}{4(x+2)}. \quad (65)$$

Para las fracciones del tipo $\frac{A}{(x-\alpha)^r}$, el desarrollo en serie se obtiene a partir de la fórmula de Newton. Por ejemplo,

$$\frac{13}{12(x-2)} = -\frac{13}{24} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1} = \\ = -\frac{13}{24} \left[1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2^2} + \dots + \frac{x^n}{2^n} + \dots\right].$$

Aplicando este desarrollo a todos los quebrados de la igualdad (65), se obtiene que

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 6x + 1}{x^4 - 5x^2 + 4} = (1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots) - \\ - \frac{4}{3}(1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots) - \\ - \frac{13}{24} \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2^2} + \dots + \frac{x^n}{2^n} + \dots\right) + \\ + \frac{9}{8} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2^2} - \dots + \frac{(-1)^n x^n}{2^n} + \dots\right).$$

Agrupando los términos con iguales potencias de x , se obtiene que el coeficiente de x^n se expresa mediante la fórmula

$$c_n = 1 - \frac{4}{3}(-1)^n - \frac{13}{24 \cdot 2^n} + \frac{9(-1)^n}{8 \cdot 2^n}.$$

Ya sabemos que el problema sobre el desarrollo de una fracción algebraica en serie de potencias es equivalente al de la resolución de cierta relación de recurrencia con condiciones iniciales dadas. De esta manera, mediante el desarrollo de los quebrados en elementales y el subsiguiente desarrollo de éstos en series de potencias se pueden resolver las relaciones lineales recurrentes con coeficientes constantes.

De esta forma, si se dan la relación de recurrencia (62) y los valores de c_0, \dots, c_{m-1} , hay

que hallar primeramente, según las fórmulas (61), los valores de a_0, \dots, a_{m-1} . Estos nos dan los coeficientes del polinomio que se halla en el numerador de la fracción

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = c_0 + c_1x + \dots + c_kx^k + \dots$$

El denominador de esta fracción es igual a $b_0 + \dots + b_mx^m$.

La fracción hallada $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ debe descomponerse en fracciones elementales, luego de lo cual cada una de ellas se desarrolla en serie de potencias según la fórmula de Newton. El coeficiente de x^k en la serie obtenida nos da, precisamente, el valor de c_k .

Resolvamos, por ejemplo, la relación de recurrencia

$$c_{k+2} - 5c_{k+1} + 6c_k = 0 \quad (66)$$

con las condiciones iniciales $c_0=1, c_1=-2$. Aquí será $b_0=1, b_1=-5, b_2=6$. De la fórmula (61) se obtiene que $a_0=b_0c_0=1, a_1=b_0c_1+b_1c_0=-7$. Por esto, el numerador de la fracción

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = c_0 + c_1x + \dots + c_kx^k + \dots$$

es igual a $1-7x$. El denominador de esta fracción se obtiene de inmediato de la relación (60). Este tiene la forma x^2-5x+6 . Por lo tanto, para hallar la solución debemos desarrollar en serie de potencias la fracción

$$\frac{1-7x}{x^2-5x+6}$$

Por lo $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$, por lo cual

$$\frac{1-7x}{x^2-5x+6} = \frac{1-7x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}.$$

Eliminando denominadores, obtenemos

$$1-7x = A(x-3) + B(x-2).$$

Haciendo $x=3$, se halla que $B=-20$, y haciendo $x=2$, se encuentra que $A=13$. Por consi-

guiente,

$$\begin{aligned} \frac{1-7x}{x^2-5x+6} &= \frac{13}{x-2} - \frac{20}{x-3} = \\ &= -\frac{13}{2} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1} + \frac{20}{3} \left(1 - \frac{x}{3}\right)^{-1} = \\ &= -\frac{13}{2} \left(1 + \frac{x}{2} + \dots + \frac{x^n}{2^n} + \dots\right) + \\ &\quad + \frac{20}{3} \left(1 + \frac{x}{3} + \dots + \frac{x^n}{3^n} + \dots\right). \end{aligned}$$

Por esto,

$$c_n = -\frac{13}{2} \cdot \frac{1}{2^n} + \frac{20}{3} \cdot \frac{1}{3^n} = -\frac{13}{2^{n+1}} + \frac{20}{3^{n+1}}.$$

SOBRE UNA RELACION UNICA NO LINEAL DE RECURRENCIA

Al resolver el problema sobre la partición de una sucesión, obtuvimos la relación de recurrencia

$$T_n = T_0T_{n-1} + T_1T_{n-2} + \dots + T_{n-1}T_0, \quad (67)$$

donde $T_0 = 1$ (véase la pág. 100). Esta relación fue resuelta de un modo muy artificioso: redujimos este problema al problema de la cola (véase la pág. 56), el cual ya sabíamos resolver. Pero la propia resolución del problema de la cola era bastante engorrosa.

Ahora mostraremos cómo se resuelve directamente la relación (67). Para esto, escribamos la función generatriz

$$f(x) = T_0 + T_1x + T_2x^2 + \dots + T_nx^n + \dots \quad (68)$$

Hagamos

$$F(x) \equiv xf(x) = T_0x + T_1x^2 + \dots + T_nx^{n+1} + \dots \quad (69)$$

y elevemos $F(x)$ al cuadrado. Se obtienen entonces que

$$F^2(x) = T_0^2x^2 + (T_0T_1 + T_1T_0)x^3 + \dots$$

$$+ \dots + (T_0T_{n-1} + \dots + T_{n-1}T_0)x^{n+1} + \dots$$

Pero, en virtud de la relación de recurrencia (67),

$$T_0T_{n-1} + \dots + T_{n-1}T_0 = T_n.$$

Por consiguiente,

$$F^2(x) = T_1x^2 + T_2x^3 + \dots + T_nx^{n+1} + \dots$$

La serie obtenida no es otra cosa que $F(x) - T_0x$; como $T_0 = 1$, ésta es igual a $F(x) - x$. Así, pues,

$$F^2(x) = F(x) - x. \quad (70)$$

Hemos obtenido para la función $F(x)$ la ecuación cuadrática (70). Resolviéndola, se halla que

$$F(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}.$$

Hemos escogido el signo de menos delante de la raíz, pues en caso contrario tendríamos, para $x=0$, $F(0)=2$, mientras que del desarrollo (69) se aprecia que $F(0)=0$.

En virtud de la fórmula (54), tendremos que

$$\begin{aligned} \sqrt{1-4x} &= (1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 - 2x - \frac{2}{3}C_2^2x^2 - \\ &\quad - \frac{2}{3}C_2^2x^2 - \dots - \frac{2}{n+1}C_n^{2n}x^{n+1} - \dots \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2} \left[1 - \left(1 - 2x - \dots \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \dots - \frac{2}{n+1}C_n^{2n}x^{n+1} - \dots \right) \right] = \\ &= x + C_1^1x^2 + \dots + \frac{1}{n+1}C_n^{2n}x^{n+1} + \dots \quad (71) \end{aligned}$$

Comparando las fórmulas (69) y (71), se obtiene que $T_n = \frac{1}{n-1}C_n^{2n}$. Esto corresponde totalmente a la solución obtenida antes por un método combinatorio (véase la pág. 100).

FUNCIONES GENERATRICES Y PARTICIONES DE LOS NUMEROS

En el capítulo IV resolvimos distintos problemas combinatorios sobre particiones de números. Estos problemas pueden resolverse con suma sencillez mediante las funciones generatrices.

Designemos mediante a_n el número de maneras de particiones para n , y escribamos la serie

$$a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$$

En muchos casos se logra formar una expresión algebraica $f(x)$ tal que después de quitar paréntesis en esta expresión el sumando x^n se repite exactamente a_n veces. Entónces

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$$

y, por lo tanto, $f(x)$ es la función generatriz de la sucesión $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$

Supongamos, por ejemplo, que se considera la partición del número N en sumandos, cada uno de los cuales sea igual a uno de los números n_1, \dots, n_k . Además, los sumandos no deben repetirse, y su orden no tiene importancia.

Para resolver el problema, formemos la expresión

$$(1+x^{n_1})(1+x^{n_2})\dots(1+x^{n_k}). \quad (72)$$

Al quitar paréntesis, se obtienen sumandos del tipo x^{m_1}, \dots, x^{m_s} , donde m_1, \dots, m_s son algunos de los números n_1, \dots, n_k . Por esto x^N se encontrará en la suma tantas veces, de cuantas maneras se pueda descomponer el número N en sumandos, de la forma requerida.

Por ejemplo, si hay que averiguar de cuántas formas se puede pagar 78 kopeks, tomando no más de una moneda de cada valor, hay que formar la expresión

$$\begin{aligned} (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^5) \times \\ \times (1+x^{10})(1+x^{15})(1+x^{20})(1+x^{50}), \quad (73) \end{aligned}$$

abrir paréntesis y hallar el coeficiente de x^{78} .

Resolvamos ahora mediante las funciones generatrices el siguiente problema:

¿De cuántas maneras se pueden pagar 29 kopeks en monedas de 3 y 5 k.?

En este problema hay que hallar el número de formas de descomponer el número 29 en sumandos, iguales a 3 y 5, sin que nos interese el orden de éstos. En otras palabras, hay que hallar el número de soluciones no negativas de la ecuación $3m + 5n = 29$.

Escribamos para esto la expresión

$$f(x) = (1 + x^3 + x^6 + \dots + x^{3m} + \dots) \times \\ \times (1 + x^5 + x^{10} + \dots + x^{5n} + \dots). \quad (74)$$

Los exponentes de x en el primer paréntesis toman todos los valores no negativos múltiplos de 3, y en el segundo, todos los no negativos múltiplos de 5. Está claro que después de quitar paréntesis x^N figurará con un coeficiente igual al número de soluciones de la ecuación $3m + 5n = N$. En particular, el coeficiente de x^{29} nos dará la respuesta de nuestro problema.

En lugar de quitar paréntesis, se puede proceder del siguiente modo. Apliquemos la fórmula de la progresión geométrica infinita. Entonces la expresión (74) se escribe en la forma

$$f(x) = \frac{1}{1-x^3} \frac{1}{1-x^5} = \frac{1}{1-x^3-x^5+x^8}.$$

Dividamos ahora el numerador por el denominador, según la regla de división de polinomios

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline x+x^2-x^7+x^9+x^{10}-x^{11} \\ \hline 2x^2+3x^3-x^7-x^8+x^9+2x^{10}-x^{12} \\ \hline 3x^3+2x^4-x^7-x^8-x^9+2x^{10}+2x^{11}+x^{12}-2x^{13} \\ \hline 5x^4+3x^5-x^7-x^8-x^9-x^{10}+2x^{11}-4x^{12}+x^{13}-3x^{14} \end{array}$$

(sólo que los dispondremos no en potencias decrecientes, sino en potencias crecientes de x). El comienzo de esta división es el siguiente:

$$\frac{1}{x^3+x^5-x^8} \quad \left| \frac{1-x^3-x^5+x^8}{1+x^3+x^5+x^8+x^8+\dots} \right.$$

$$\frac{1}{x^3+x^5-x^8} \quad \left| \frac{1-x^3-x^5+x^8}{x^6+x^8-x^{11}} \right.$$

$$\frac{1}{x^3+x^5-x^8} \quad \left| \frac{1-x^3-x^5+x^8}{x^6+x^8+x^{10}-x^{11}-x^{13}} \right.$$

$$\frac{1}{x^3+x^5-x^8} \quad \left| \frac{1-x^3-x^5+x^8}{x^8+x^9+x^{10}-x^{13}-x^{14}} \right.$$

Continuando la división, se halla el coeficiente buscado de x^{29} .

El problema general es aquí el siguiente:

Hallar de cuántas maneras se puede descomponer el número N en sumandos, iguales respectivamente a a, b, \dots, m , sin que se tenga en cuenta el orden de éstos.

En este caso, la función generatriz tiene la forma

$$f(x) = (1 + x^a + x^{2a} + \dots + x^{la} + \dots) \times \\ \times (1 + x^b + x^{2b} + \dots + x^{sb} + \dots) \times \\ \times (1 + x^m + x^{2m} + \dots + x^{qm} + \dots) = \\ = \frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)\dots(1-x^m)}. \quad (75)$$

Por ejemplo, en el problema sobre el cambio de la moneda de 10 kopeks (véase la pág. 69), hay que escribir la función generatriz

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^5)}.$$

Multiplicando las expresiones que están en el denominador de la fracción se obtiene

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2+x^2-x^3-x^5+x^{10}+x^{11}}.$$

Efectuando la división, se halla que

$$\left| \frac{1-x-x^2+x^2-x^3-x^5+x^{10}+x^{11}}{1+x+2x^2+3x^3+5x^4+\dots} \right.$$

El coeficiente de x^{10} da la respuesta del problema planteado.

Se sobrentiende que aquí es bastante complicado efectuar la división por el método habitual. En lugar de esto, se puede proceder de otra forma. Escribamos el resultado de la división en forma de una serie infinita con coeficientes indeterminados:

$$\frac{1}{1-x-x^2+x^2-x^3-x^5+x^{10}+x^{11}} = \\ = A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n + \dots$$

Multipiquemos ambos miembros de la igualdad por el denominador. Entonces, el coeficiente de x^n en el segundo miembro será igual a

$$A_n - A_{n-1} - A_{n-2} + A_{n-7} - A_{n-9} - A_{n-10} + A_{n-11}.$$

En el primer miembro, el coeficiente de x^n , $n \geq 1$, es igual a cero. Por consiguiente, para $n \geq 1$ los coeficientes A_n deben satisfacer a la relación de recurrencia

$$A_n = A_{n-1} + A_{n-2} - A_{n-7} + A_{n-9} + A_{n-10} - A_{n-11}.$$

Las condiciones iniciales tienen la forma: $A_n = 0$ para $n < 0$ y $A_0 = 1$. Utilizando estas condiciones, es fácil hallar sucesivamente todos los coeficientes A_n .

Como ejemplo, consideremos el problema del aspirante (véase la pág. 66). En éste había que hallar de cuántas maneras se puede representar el número 17 en forma de suma de 4 sumandos, que adquieren los valores 3, 4, 5, teniendo importancia el orden de los sumandos. Para este problema, hay que tomar como función generatriz $(x^3 + x^4 + x^5)^4$, puesto que al abrir paréntesis en la expresión $f(x) = (x^3 + x^4 + x^5)^4$, cada sumando x^N se encontrará tantas veces, de cuantas maneras N se descomponga en suma de 4 sumandos que adquieran los valores 3, 4, 5. Aquí se encontrarán también los términos que se obtienen uno del otro por permutación de los sumandos en el exponente (por ejemplo, $x^3 x^4 x^5 x^5$ y $x^4 x^3 x^5 x^5$).

La operación de abrir paréntesis en la expresión $(x^3 + x^4 + x^5)^4 = x^{12} (1 + x + x^2)^4$ se puede efectuar, por ejemplo, por el teorema polinómico. Pero es más sencillo otro método. Obsérvese que $1 + x + x^2 + \frac{1-x^3}{1-x}$. Por esto,

$f(x)$ se puede escribir en la forma

$$f(x) = \frac{x^{12} (1-x^3)^4}{(1-x)^4} = x^{12} (1-x^3)^4 (1-x)^{-4}.$$

Pero, en virtud de la fórmula del binomio de Newton, tendremos que

$$(1-x^3)^4 = 1 - 4x^3 + 6x^6 - 4x^9 + x^{12},$$

y por la fórmula de la serie de Newton (véase la pág. 122), será $(1-x)^{-4} = 1 + 4x + 10x^2 + 20x^3 + \dots$

$$\dots + \frac{4 \cdot 5 \dots (n+3)}{1 \cdot 2 \dots n} x^n + \dots$$

Por esto,

$$f(x) = x^{12} (1 - 4x^3 + 6x^6 - 4x^9 + x^{12}) \times \\ \times (1 + 4x + 10x^2 + 20x^3 + 35x^4 + 56x^5 + \dots).$$

Multiplicando término a término estos desarrollos, se halla que el coeficiente de x^{17} es igual a 16. En consecuencia, la partición se puede efectuar de 16 maneras.

En general, si hay que hallar de cuántas maneras se puede descomponer el número N en k sumandos, que adquieren los valores n_1, \dots, n_s , teniendo en cuenta el orden de los sumandos, la función generatriz tiene la forma

$$f(x) = (x^{n_1} + x^{n_2} + \dots + x^{n_s})^k. \quad (76)$$

El problema se simplifica si los números n_1, \dots, n_s forman una progresión aritmética. En este caso, x^{n_1}, \dots, x^{n_s} forman una progresión geométrica, lo cual permite simplificar la expresión de $f(x)$.

Hallemos, por ejemplo, de cuántas maneras se pueden obtener 25 tantos, echando 7 dados. Aquí hay que formar la función generatriz

$$f(x) = (x + x^2 + \dots + x^6)^7. \quad (77)$$

Por la fórmula de la suma de una progresión geométrica, esta función se puede escribir en la siguiente forma:

$$f(x) = \frac{x^7 (1-x^6)^7}{(1-x)^7} = x^7 (1-x^6)^7 (1-x)^{-7}.$$

Desarrollemos ahora $(1-x^6)^7$ según la fórmula del binomio de Newton, y $(1-x)^{-7}$, según la de la serie de Newton. Obtenemos entonces

$$f(x) = x^7 (1 - 7x^6 + 21x^{12} - 35x^{18} + 35x^{24} - 21x^{30} + \\ + 7x^{36} - x^{42}) (1 + 7x + 28x^2 + 84x^3 + \\ + 210x^4 + 462x^5 + \dots).$$

Multiplicando estos desarrollos, se calcula sin dificultad el coeficiente de x^{25} . Este nos dará, precisamente, la respuesta al problema planteado.

Análogamente se resuelven también, mediante las funciones generatrices, los otros problemas analizados en el capítulo IV.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS SOBRE
LA COMBINATORIA DE LA PARTICION

1. El número de formas de dividir n distintos objetos en r grupos diferenciables entre sí con la particularidad de que se admiten grupos vacíos, es igual a r^n .

2. El número de maneras de dividir n objetos distintos en r grupos diferenciables entre sí, siendo todos éstos no vacíos, es igual al coeficiente de x^n del desarrollo de la función $(e^x - 1)^r$ en serie de potencias, multiplicado por $n!$ Este número se puede escribir en la forma

$$r^n - \frac{r}{1} (r-1)^n + \frac{r(r-1)}{1 \cdot 2} (r-2)^n - \dots$$

3. Si en el mismo problema los grupos son indistinguibles, la cantidad de maneras es $r!$ veces menor.

4. El número de modos de dividir n objetos indistinguibles en r grupos diferenciables entre sí, en los cuales todos los grupos no son vacíos, es igual a C_{r-1}^{n-1} .

5. El número de maneras de dividir n objetos indiferenciables en r grupos distinguibles, admitiéndose grupos vacíos, es igual a C_{r-1}^{n+r-1} .

6. El número de formas de dividir n objetos indiferenciables en r grupos distinguibles, en los que cada grupo contenga por lo menos q objetos, es igual a $C_{r-1}^{n-1-(q-1)}$.

7. El número de modos de dividir n objetos indistinguibles en r grupos diferenciables, en los que el número de elementos de cada grupo se halle entre q y $q + s - 1$, $q \leq x \leq q + s - 1$, es igual al coeficiente de x^{n-rq} del desarrollo de la función $\left(\frac{1-x^s}{1-x}\right)^r$ en serie de potencias.

8. Designemos el número de formas de dividir n objetos indistinguibles en r grupos indiferenciables, en los que no hay ninguno vacío, mediante Π_r^n . Entonces tiene lugar la fórmula de recurrencia

$$\Pi_r^n = \Pi_{r-1}^{n-1} + \Pi_{r-1}^{n-r-1} + \Pi_{r-1}^{n-2r-1} + \dots$$

Tiene lugar la igualdad

$$\Pi_r^n = \Pi_{r-1}^{n-1} + \Pi_r^{n-r}.$$

Para $n - r < r$, se tiene que

$$\Pi_r^n = \Pi_{r-1}^{n-1}.$$

Conjuntamente con las particiones, se estudian las ordenaciones de elementos, en los que tiene importancia tanto el orden de los grupos como el de los elementos en éstos. Para las ordenaciones son válidas las afirmaciones siguientes:

9. Si n objetos distintos están ordenados en r grupos diferenciables, admitiéndose grupos vacíos, el número de ordenaciones es igual a

$$r(r+1) \dots (r+n-1).$$

10. Si n objetos distintos se ordenan en r grupos diferenciables, siendo todos ellos no vacíos, el número de ordenaciones es igual a

$$n! C_{r-1}^{n-1} = \frac{n! (n-1)!}{(n-r)! (r-1)!}.$$

Si, en cambio, los grupos son indistinguibles, por lo cual su orden no tiene importancia, el número de ordenaciones es igual a $\frac{n!}{r!} C_{r-1}^{n-1}$.

11. Supongamos que de n elementos diferentes se forman, de todas las maneras posibles, r grupos ordenados (se pueden tomar no todos los elementos, se admiten grupos vacíos y se tiene en cuenta el orden de los grupos). La cantidad de tales grupos es igual a

$$n! \left[\frac{1}{n!} + \frac{r}{1!(n-1)!} + \frac{r(r+1)}{2!(n-2)!} + \dots \right].$$

Esta expresión es el coeficiente de x^n del desarrollo de la función $e^x (1-x)^{-r}$ en serie de potencias, multiplicado por $n!$.

12. Si en el mismo problema se prohíben los grupos vacíos la respuesta es igual al coeficiente de x^{n-r} en el desarrollo de la función $e^x (1-x)^{-r}$ en potencias de x , multiplicado por $n!$

PROBLEMAS DE COMBINATORIA

1.
De la ciudad A hasta la B conducen cinco caminos, y de la B a la C , tres. ¿Cuántos caminos que pasan por B conducen desde A hasta C ?
2.
De dos sociedades deportivas, con 100 esgrimidores cada una, hay que escoger de a un espadachín para participar en una competición. ¿De cuántas formas se puede efectuar esta elección?
3.
Hay cinco tipos de sobres sin estampillas y cuatro tipos de estampillas de un mismo valor. ¿De cuántas maneras se puede escoger un sobre con estampilla para enviar una carta?
4.
¿De cuántos modos se puede escoger una vocal y una consonante de la palabra «cantora»?
5.
Lo mismo, pero de la palabra «trincea».
6.
Se echa un dado de seis caras y se hace girar un trompo con ocho caras. ¿De cuántas maneras diferentes pueden caer éstos?
7.
A la cumbre de una montaña conducen cinco caminos. ¿De cuántas maneras puede trepar un turista a la montaña y descender de ella? Lo mismo, pero con la condición de que el ascenso y el descenso tienen lugar por caminos diferentes.
8.
En una granja hay 20 ovejas y 24 cerdos. ¿De cuántos modos se puede escoger una oveja y un cerdo? Si esta elección ya fue efectuada, ¿de cuántas maneras se la puede efectuar nuevamente?
9.
¿De cuántas formas se pueden indicar en el tablero de ajedrez dos casillas, una blanca y una negra? ¿Y si no hay limitaciones en lo que respecta al color de las casillas escogidas?
10.
¿De cuántas maneras se pueden escoger en el tablero de ajedrez una casilla blanca y una negra que no estén en una misma horizontal ni vertical?
11.
De 12 palabras de género masculino, 9 de femenino y 10 de neutro hay que escoger una de cada género. ¿De cuántos modos se puede efectuar esta elección?
12.
Hay 6 pares de guantes de distintas medidas. ¿De cuántas maneras se pueden escoger entre ellos un guante de la mano izquierda y otro de la derecha, de forma que estos guantes sean de distintas medidas?
13.
De entre 3 ejemplares de un texto de álgebra, 7 de uno de geometría y 7 de uno de trigonometría hay que escoger un ejemplar de cada texto. ¿Cuántos modos existen de efectuarlo?
14.
En una librería hay 6 ejemplares de la novela de I. S. Turgénev «Rudin», 3 de la novela del mismo autor «Nido de Hidalgos» y 4 de la novela «Padres e Hijos». Además, hay 5 tomos que contienen las novelas «Rudin» y «Nido de Hidalgos» y 7 que contienen las novelas «Nido de Hidalgos» y «Padres e Hijos». ¿De cuántos modos se puede efectuar una compra que contenga un ejemplar de cada una de estas novelas?
15.
El mismo problema pero si, además, en la librería hay tres tomos en los que se incluyen «Rudin» y «Padres e Hijos».
16.
En una canasta hay 12 manzanas y 10 naranjas. Iván toma de ésta una manzana o una naranja, luego de lo cual Nadia escoge una manzana y una naranja. ¿En qué caso Nadia tendrá mayor libertad de elección: cuando Iván toma una manzana, o cuando éste toma una naranja?
17.
Hay tres trompos con 6, 8 y 10 caras respectivamente. ¿De cuántas maneras diferentes pueden caer éstos? El mismo problema, si se conoce que

PROBLEMAS DE COMBINATORIA

1.

De la ciudad A hasta la B conducen cinco caminos, y de la B a la C , tres. ¿Cuántos caminos que pasen por B conducen desde A hasta C ?

2.

De dos sociedades deportivas, con 100 esgrimidores cada una, hay que escoger de a un espadachín para participar en una competición. ¿De cuántas formas se puede efectuar esta elección?

3.

Hay cinco tipos de sobres sin estampillas y cuatro tipos de estampillas de un mismo valor. ¿De cuántas maneras se puede escoger un sobre con estampilla para enviar una carta?

4.

¿De cuántos modos se puede escoger una vocal y una consonante de la palabra «cantora»?

5.

Lo mismo, pero de la palabra «trineo».

6.

Se echa un dado de seis caras y se hace girar un trompo con ocho caras. ¿De cuántas maneras diferentes pueden caer éstos?

7.

A la cumbre de una montaña conducen cinco caminos. ¿De cuántas maneras puede trepar un turista a la montaña y descender de ella? Lo mismo, pero con la condición de que el ascenso y el descenso tienen lugar por caminos diferentes.

8.

En una granja hay 20 ovejas y 24 cerdos. ¿De cuántos modos se puede escoger una oveja y un cerdo? Si esta elección ya fue efectuada, ¿de cuántas maneras se la puede efectuar nuevamente?

9.

¿De cuántas formas se pueden indicar en el tablero de ajedrez dos casillas, una blanca y una negra? ¿Y si no hay limitaciones en lo que respecta al color de las casillas escogidas?

10.

¿De cuántas maneras se pueden escoger en el tablero de ajedrez una casilla blanca y una negra que no estén en una misma horizontal ni vertical?

11.

De 12 palabras de género masculino, 9 de femenino y 10 de neutro hay que escoger una de cada género. ¿De cuántos modos se puede efectuar esta elección?

12.

Hay 6 pares de guantes de distintas medidas. ¿De cuántas maneras se pueden escoger entre ellos un guante de la mano izquierda y otro de la derecha, de forma que estos guantes sean de distintas medidas?

13.

De entre 3 ejemplares de un texto de álgebra, 7 de uno de geometría y 7 de uno de trigonometría hay que escoger un ejemplar de cada texto. ¿Cuántos modos existen de efectuarlo?

14.

En una librería hay 6 ejemplares de la novela de I. S. Turgénev «Rudin», 3 de la novela del mismo autor «Nido de Hidalgos» y 4 de la novela «Padres e Hijos». Además, hay 5 tomos que contienen las novelas «Rudin» y «Nido de Hidalgos» y 7 que contienen las novelas «Nido de Hidalgos» y «Padres e Hijos». ¿De cuántos modos se puede efectuar una compra que contenga un ejemplar de cada una de estas novelas?

15.

El mismo problema pero si, además, en la librería hay tres tomos en los que se incluyen «Rudin» y «Padres e Hijos».

16.

En una canasta hay 12 manzanas y 10 naranjas. Iván toma de ésta una manzana o una naranja, luego de lo cual Nadia escoge una manzana y una naranja. ¿En qué caso Nadia tendrá mayor libertad de elección: cuando Iván toma una manzana, o cuando éste toma una naranja?

17.

Hay tres trompos con 6, 8 y 10 caras respectivamente. ¿De cuántas maneras diferentes pueden caer éstos? El mismo problema, si se conoce que

por lo menos dos trompos cayeron sobre el lado marcado con la cifra 1.

18.

¿De cuántos modos se pueden escoger tres pinturas diferentes de las cinco en existencia?

19.

¿De cuántas formas se puede confeccionar una bandera de franjas de tres colores, si se tiene tela de 5 colores distintos? El mismo problema, si una de las franjas debe ser roja.

20.

¿Cuántos diccionarios hay que editar para que se puedan efectuar directamente traducciones entre cualquiera de los cinco idiomas: español, ruso, inglés, francés, alemán?

21.

¿Cuántos diccionarios habrá que agregar si el número de idiomas diferentes es igual a 10?

22.

¿De cuántas maneras se puede escoger, de una baraja completa, una carta de cada palo? Lo mismo, pero con la condición de que entre las cartas escogidas no haya ningún par igual, es decir, dos reyes, dos diez, etc.

23.

¿De cuántos modos se puede escoger de una baraja completa (que contenga 52 cartas) una carta de cada palo de forma que las de palos rojos y las de palos negros formen parejas (por ejemplo, los nueve de picas y de tréboles y los valets de cuadrados y de corazones)?

24.

Los ingleses suelen dar varios nombres a sus hijos. ¿De cuántas formas se puede dar un nombre al niño, si el número general de nombres es igual a 300, y le dan no más de tres nombres?

25.

Varias personas se sientan a una mesa redonda. Consideraremos que dos formas de sentarse coinciden, si cada persona tiene los mismos vecinos en ambos casos. ¿De cuántos modos diferentes

se puede sentar a cuatro personas? ¿Y a siete? ¿En cuántos casos dos personas dadas de entre siete serán vecinos? ¿En cuántos casos una persona dada (de entre siete) tendrá dos vecinos dados?

26.

Cinco muchachas y tres muchachos juegan a la pelota. ¿De cuántas formas pueden dividirse en dos equipos de 4 personas cada uno, si en cada equipo debe haber por lo menos un muchacho?

27.

Hay que enviar 6 cartas urgentes. ¿De cuántas maneras puede efectuarse esto, si para transmitir las cartas se pueden enviar tres agentes, y cada carta se puede entregar a cualquiera de ellos?

28.

Una persona tiene 7 libros de matemáticas, y otra, 9. ¿De cuántos modos pueden cambiar un libro de uno por uno del otro?

29.

El mismo problema, pero se intercambian dos libros de uno por dos del otro.

30.

En una reunión deben intervenir 5 personas: A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir en la lista de oradores, con la condición de que B no debe intervenir antes que A?

31.

El mismo problema, pero con la condición de que A deba intervenir inmediatamente antes que B.

32.

¿De cuántas formas se puede sentar alrededor de una mesa redonda a 5 hombres y 5 mujeres de modo que no haya juntas dos personas de un mismo sexo?

33.

El mismo problema, pero se sientan no alrededor de una mesa redonda, sino en una calesita, y las formas que se transforman una en la otra al girar la calesita se consideran coincidentes.

* Se toma una baraja de 52 cartas (N. del T.).

34.

De una baraja que contiene 52 cartas se han extraído 10. ¿En cuántos casos entre ellas habrá por lo menos un as? ¿En cuántos habrá exactamente un as? ¿En cuántos habrá no menos de dos ases? ¿Y exactamente dos ases?

35.

En una estación del ferrocarril hay m semáforos. ¿Cuántas señales diferentes se pueden dar, si cada uno de ellos tiene tres estados: rojo, amarillo y verde?

36.

En cierto Estado no había dos habitantes con igual cantidad de dientes. ¿Cuál puede ser la población máxima en este Estado (el mayor número de dientes es igual a 32)?

37.

En el coupé de un vagón del ferrocarril hay dos divanes opuestos, de 5 lugares cada uno. De 10 pasajeros, cuatro desean sentarse cara a la locomotora, y tres, de espaldas a ella; a los tres restantes les es indiferente cómo sentarse. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar los pasajeros?

38.

En un Comité Sindical se han escogido 9 personas. De entre ellas hay que elegir al presidente, al vicepresidente, al secretario y al organizador cultural. ¿De cuántos modos se puede efectuar esto?

39.

De entre los integrantes de una conferencia, en la que toman parte 52 personas, hay que escoger una delegación formada por 5 personas. ¿De cuántas formas puede hacerse?

40.

Los números de automóvil están formados por una, dos o tres letras y cuatro cifras. Hallar la cantidad total de estos números, si se utilizan las 32 letras del alfabeto ruso.

41.

La mamá tiene 2 manzanas y 3 peras. Cada día, durante cinco días seguidos, da al hijo una fruta. ¿De cuántas maneras puede efectuarse esto?

42.

Resolver un problema análogo, pero con m manzanas y n peras.

43.

Resolver un problema análogo, en el caso en que haya 2 manzanas, 3 peras y 4 naranjas.

44.

El padre tiene 5 naranjas distintas dos a dos, las que entrega a sus ocho hijos de forma que cada uno obtiene o una naranja o nada. ¿De cuántos modos puede hacerlo?

45.

Un problema análogo, pero si el número de naranjas que obtiene cada hijo es ilimitado.

46.

¿Cuántas palabras diferentes se pueden obtener mutando las letras de la palabra «matemática»? ¿Y de la palabra «parábola»? ¿Y de la palabra «ingrediente»?

47.

En un club deportivo, con 30 miembros, hay que formar un equipo de 4 personas, para participar en una carrera de 1000 m. ¿De cuántas maneras puede hacerse? ¿Y de cuántas se puede formar un equipo de 4 personas para participar en la carrera de relevos $100 + 200 + 400 + 800$?

48.

¿De cuántas formas se pueden colocar las figuras blancas (2 caballos, 2 torres, 2 alfiles, el rey y la reina) en la primera fila del tablero de ajedrez?

49.

Hay n abonados en una red telefónica. ¿De cuántos modos se pueden unir al mismo tiempo tres pares?

50.

En una oficina de correos se venden estampillas de 10 tipos. ¿De cuántas formas se pueden comprar en ella 12 estampillas? ¿Y 8 estampillas? ¿Y 8 estampillas diferentes?

¹ Se da la forma rusa de la palabra «ingrediente» (N. del T.).

51.

De un grupo formado por 7 hombres y 4 mujeres hay que escoger 6 personas de forma que entre ellas haya no menos de 2 mujeres. ¿De cuántas maneras puede efectuarse la elección?

52.

¿Cuántos números distintos de cuatro cifras, que se dividan por 4, pueden formarse a partir de las cifras 1, 2, 3, 4, 5, si cada cifra puede emplearse en la escritura de un número varias veces?

53.

Un tren, en el que se encuentran n pasajeros, debe efectuar m paradas. ¿De cuántos modos pueden distribuirse los pasajeros entre estas paradas? El mismo problema, si se tiene en cuenta sólo la cantidad de pasajeros que se bajaron en una parada prefijada.

54.

¿Cuántas permutaciones distintas pueden efectuarse con n elementos, en las que dos de ellos, a y b , no estén juntos? ¿Y en las que no lo estén tres, a , b , c (en cualquier orden)? ¿Y en las que ningún par de los elementos a , b , c esté junto?

55.

En un torneo de gimnasia participan 10 personas. Tres jueces deben numerarlos, independientemente el uno de los otros, en un orden que refleje sus éxitos en el torneo, según la opinión de cada juez. Se considera ganador el que haya sido nombrado primero por lo menos por dos jueces. ¿En qué porcentaje de los casos del torneo se habrá determinado un ganador?

56.

Cuatro estudiantes rinden un examen. ¿De cuántas maneras se les pueden poner las calificaciones, si se sabe que ninguno de ellos obtuvo insuficiente?

57.

¿Cuántos collares diferentes se pueden confeccionar de siete cuentas de distinto tamaño (hay que utilizar las 7)?

58.

¿Cuántos collares diferentes se pueden confeccionar de cinco cuentas iguales y dos de mayor dimensión?

59.

En una aldea hay 2000 habitantes. Demostrar que por lo menos dos de ellos tienen iguales iniciales¹.

60.

Un grupo de siete muchachos y diez chicas baila. Si en algún baile participan todos los muchachos, ¿cuántas variantes existirán de la participación de las muchachas en este baile? ¿Cuántas variantes habrá, si se tiene en cuenta sólo qué chicas quedaron sin ser invitadas? Resolver las mismas cuestiones si se puede decir con seguridad que dos chicas determinadas serán invitadas al baile?

61.

Una compañía está formada por 3 oficiales, 6 sargentos y 60 soldados rasos. ¿De cuántos modos se puede elegir entre ellos un destacamento formado por un oficial, dos sargentos y 20 soldados rasos? El mismo problema, pero en el destacamento debe figurar el jefe de la compañía y el mayor de los sargentos.

62.

En una fiesta escolar hay 12 niñas y 15 niños. ¿De cuántas maneras se pueden escoger de entre ellos 4 pares para un baile?

63.

Hay 3 gallinas, 4 patos y 2 gansos. ¿Cuántas agrupaciones existen para la elección de varias aves, de forma que entre las escogidas haya tanto gallinas como patos y gansos?

64.

¿De cuántos modos se pueden dividir $m + n + p$ objetos en tres grupos, de forma que en uno haya m objetos, en otro n , y en el tercero p ?

65.

En un estante hay $m + n$ libros diferentes, de los cuales m están encuadernados en negro, y n , en rojo. ¿Cuántas permutaciones existen de estos

¹ En los exámenes de la URSS hay tres notas de promoción: 3, 4 y 5 (véase también la nota de la pág. 21) (N. del T.).

² En ruso hay dos iniciales (del nombre y del patronímico), utilizándose para ellas 29 letras del alfabeto (N. del T.).

libros, en las que los encuadernados en negro ocupen los primeros m lugares? ¿Cuántas posiciones hay, en las que todos los libros encuadernados en negro se hallen juntos?

66.

¿De cuántas formas se puede escoger entre 15 personas un grupo para trabajar? En el grupo puede haber 1, 2, 3, . . . 15 personas. El mismo problema, pero para el caso en que haya que elegir de entre n personas.

67.

Sean p_1, \dots, p_n números primos diferentes. ¿Cuántos divisores tiene el número

$$q = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n},$$

siendo $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ números naturales (incluyendo los divisores 1 y q)? ¿A qué es igual su suma?

68.

¿De cuántas maneras se pueden distribuir 12 monedas de 50 kopeks en cinco paquetes diferentes, si ninguno de éstos debe ser vacío?

69.

¿De cuántas formas se pueden distribuir 20 libros en una biblioteca con 5 estantes, si cada estante puede contener todos los 20?

70.

¿De cuántos modos se pueden poner 5 anillos diferentes en los dedos de una mano, omitiendo el pulgar?

71.

30 personas votan por 5 mociones. ¿De cuántas formas se pueden distribuir los votos, si cada uno vota por una moción y se tiene en cuenta solamente el número de votos que obtuvo cada una?

72.

Un encuadernador debe encuadernar 12 libros diferentes en rojo, verde y marrón. ¿De cuántos modos puede hacerlo, si por lo menos un libro debe estar encuadernado en cada color?

73.

¿De cuántas maneras se pueden formar 6 palabras de 32 letras, si en el conjunto de estas 6 palabras cada letra se utiliza una vez, y sólo una vez?

74.

¿Cuántas formas existen de escoger 12 personas de entre 17, si dos personas dadas de estas 17 no pueden ser elegidas juntas?

75.

¿Cuántos brazaletes distintos se pueden confeccionar de cinco esmeraldas iguales, seis rubíes iguales y siete zafiros iguales (en el brazaletes deben figurar todas las 18 piedras)?

76.

¿De cuántos modos se pueden escoger, de las mismas piedras, tres para un anillo?

77.

En una pieza de la residencia estudiantil viven tres estudiantes. Estos tienen 4 tazas, 5 platillos y 6 cucharillas de té (todas las tazas, platillos y cucharillas se diferencian entre sí). ¿De cuántas maneras pueden servir una mesa para tomar el té (cada uno obtiene una taza, un platillo y una cucharilla)?

78.

El marido tiene 12 conocidos, 5 mujeres y 7 hombres, y la esposa, 7 mujeres y 5 hombres. ¿De cuántas formas se puede formar un grupo de 6 hombres y 6 mujeres, de modo que 6 personas sean invitadas por el marido y 6 por la esposa?

79.

A cada costado del bote hay sentadas 4 personas. ¿De cuántas maneras se puede escoger un equipo para este bote, si hay 31 candidatos, y además 10 quieren sentarse en el costado izquierdo de éste, 12, en el derecho, y a 9 les es igual dónde sentarse?

80.

En una urna hay fichas con los números 1, 2, 3, . . . , 10. De ella se sacan 3 fichas. ¿En cuántos casos la suma de los números escritos en ellas será igual a 9? ¿Y no menor que 9?

81.

¿De cuántas formas se pueden escoger 6 cartas de una baraja de 52, de manera que entre ellas haya de cada uno de los cuatro palos?

82.

Un coro está formado por 10 participantes. ¿De cuántos modos se pueden escoger 6 participantes durante tres días, de forma que cada día el coro tenga distinta composición?

83.

Una persona tiene 6 amigos y durante 20 días invita a su casa a 3 de ellos, de modo que el grupo no se repite ni una sola vez. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?

84.

Tres muchachos y dos muchachas escogen lugar de trabajo. En la ciudad hay tres fábricas en las que son necesarios obreros en los talleres de fundición (donde se admiten solamente hombres), dos fábricas de tejidos (en las que se aceptan sólo mujeres) y dos fábricas en las que se necesitan hombres y mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre estas fábricas?

85.

¿Cuántas palabras que contengan cinco letras cada una se pueden formar con 33 letras, si se admiten repeticiones, pero no puede haber dos letras vecinas que coincidan, es decir, si palabras tales como «llama» o «perro» no se admiten?

86.

Para los premios de una olimpiada matemática se prepararon 3 ejemplares de un libro, 2 de otro y 1 de un tercero. ¿De cuántos modos se pueden entregar los premios, si en la olimpiada participaron 20 personas y a nadie se le otorgan dos libros de golpe? El mismo problema, pero considerando que a nadie se le otorgan dos ejemplares de un mismo libro, pero se le pueden entregar dos o tres libros diferentes.

87.

Se toma un dominó desde el $(0, 0)$ hasta el (n, n) . Mostrar que el número de dominós con suma de tantos $n - r$ es igual al número de éstos con suma de puntos $n + r$, y que dicho número es igual a $\frac{1}{4}(2n - 2r + 3)$. Hallar el número total de todos los dominós.

88. ¿De cuántas formas se pueden sentar alrededor de una mesa redonda 7 hombres y 7 mujeres, de manera que no haya 2 mujeres juntas?

89.

¿De cuántos modos se pueden escoger de entre 16 caballos seis para enganchar, de forma que figuren tres caballos del sexteto $ABC'A'B'C'$, pero que no haya ningún par AA' , BB' , CC' ?

90.

¿De cuántas maneras se pueden formar palabras a partir de 9 consonantes y 7 vocales, en las que figuren 4 consonantes distintas y 3 vocales diferentes? ¿En cuántas de estas palabras no habrá dos consonantes juntas?

91.

En una sección de un instituto de investigación científica trabajan varias personas, y cada una de ellas conoce por lo menos una lengua extranjera. Seis saben inglés; seis, alemán; siete, francés. Cuatro saben inglés y alemán; tres, alemán y francés; dos, francés e inglés. Una persona sabe los tres idiomas. ¿Cuántas personas trabajan en la sección? ¿Cuántas de ellas saben solamente inglés? ¿Y solamente francés?

92.

A un paseo a las afueras de la ciudad fueron 92 personas. 47 de ellas llevaron sandwiches de fiambre; 38, de queso; 42, de jamón; 28, de queso y fiambre; 31, de fiambre y jamón; 26, de queso y jamón. 25 personas llevaron los tres tipos de sandwiches, y varias llevaron empanadas en lugar de sandwiches. ¿Cuántas personas llevaron empanadas?

93.

Un grupo formado por 10 parejas de casados se divide en 5 grupos de 4 personas para un paseo en bote. ¿De cuántas formas se las puede dividir, de manera que en cada bote haya dos hombres y dos mujeres?

94.

¿En cuántos casos un hombre dado quedará en el mismo bote que su esposa?

95.

¿En cuántos casos dos hombres dados quedarán en un solo bote junto con sus mujeres?

96.

¿Cuántos números distintos de cuatro cifras se pueden formar a partir de las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si cada una de ellas puede repetirse varias veces?

97.

Hallar la cantidad de números de seis cifras, tales que la suma del número formado por las tres primeras cifras, de éstas seis, y del formado por las tres últimas, sea menor que 1000.

98.

¿De cuántos modos se pueden disponer 12 fichas blancas y 12 negras en las casillas negras de un tablero de ajedrez?

99.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «oliva», de manera que las vocales vayan en orden alfabético?

100.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «Maracañá», de modo que las cuatro «a» no vayan juntas?

101.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «engorro», de forma que la letra «g» vaya inmediatamente después de una «o»?

102.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «cloroformo», de modo que no haya dos «o» juntas?

103.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «cerámica», de manera que no haya dos vocales juntas?

104.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «Carelia», de modo que no cambie el orden de las vocales?

105.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «parallelism», de modo que no cambie el orden de las vocales?

106.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «pastor», de forma que entre las dos vocales haya dos consonantes?

107.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «logarifm», de modo que el segundo, cuarto y sexto lugares estén ocupados por consonantes?

108.

¿De cuántas maneras se pueden escoger de la palabra «logarifm» dos consonantes y una vocal? El mismo problema, pero si entre las letras escogidas debe hallarse la «f».

109.

¿De cuántos modos se pueden permutar las letras de la palabra «coloso», de forma que las tres «o» no estén juntas?

110.

El mismo problema, pero se prohíbe que haya dos «o» juntas.

111.

¿De cuántos modos diferentes se pueden escoger letras de la frase «Oko za oko, zub za zub»? El orden de las letras no se tiene en cuenta.

112.

¿De cuántas maneras se pueden escoger tres letras de esta frase?

113.

¿De cuántas formas se pueden escoger tres letras de esta frase, si se tiene en cuenta el orden de las letras escogidas?

¹ Se da la forma rusa de la palabra «parallelism» (N. de la Ed.).

² Lo mismo con la palabra «logarifm».

³ Ojo por ojo, diente por diente.

114.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «lectura», de modo que tanto las vocales como las consonantes estén en orden alfabético?

115.

¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra «espirales», de modo que se alternen las vocales y las consonantes? Lo mismo, pero para la palabra «samovar».

116.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra «Abacá», si las consonantes deben estar en orden alfabético? Lo mismo, pero con la condición complementaria de que no haya dos «a» juntas.

117.

¿De cuántos modos se pueden permutar las letras de la palabra «tic-tac», si dos letras iguales no pueden ir una a continuación de la otra? Lo mismo, pero para la palabra «tam-tam».

118.

¿De cuántas formas se pueden escoger 4 letras de la palabra «tam-tam», si no se considera el orden de las letras elegidas? ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden escribir a partir de las cifras del número 132 132?

119.

¿Cuántos números enteros no negativos, menores que un millón, contienen a todas las cifras 1, 2, 3, 4? ¿Cuántos están formados solamente por estas cifras?

120.

Hallar la suma de los números de cuatro cifras que se obtienen al permutar de todas las formas posibles las cifras 1, 2, 3, 4.

121.

Lo mismo para las cifras 1, 2, 2, 5.

122.

Lo mismo para las cifras 1, 3, 3, 3.

123.

Lo mismo para las cifras 1, 1, 4, 4.

124.

Lo mismo para todos los números de cinco cifras que se pueden obtener permutando las cifras 0, 1, 2, 3, 4. La cifra 0 no debe hallarse en el primer lugar.

125.

¿Cuántos números menores que un millón se pueden escribir mediante las cifras 8 y 9.

126.

Lo mismo, pero mediante las cifras 9, 8, 7.

127.

Lo mismo, pero mediante las cifras 9, 8, 0 (no se admiten escrituras que comiencen con cero).

128.

Hallar la suma de todos los números de tres cifras que pueden escribirse mediante las cifras 1, 2, 3, 4.

129.

Hallar la suma de todos los números posibles de cinco cifras que se pueden escribir mediante las cifras 1, 2, 3, 4, 5, y en los cuales cada cifra se repite una vez, y una sola? El mismo problema, pero para los números de cinco cifras que pueden ser escritos con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

130.

¿Cuántos números impares pueden formarse a partir de las cifras del número 3694 (cada cifra puede ser utilizada no más de una vez)? ¿Y números pares?

131.

¿Cuántos números de seis cifras existen, en los cuales tres cifras son pares y tres, impares?

132.

El mismo problema, si se admiten también números «de seis cifras» que comiencen a partir de cero.

133.

¿Cuántos números de seis cifras existen, en los cuales la suma de las cifras es par (se supone que la primera es diferente de cero)? El mismo problema, si se toman todos los números del 1 al 999 999.

134.

¿Cuántos números de diez cifras existen, en los cuales la suma de éstas es igual a tres (se supone que la primera es diferente de cero)? El mismo problema, pero se toman todos los números del 1 al 9 999 999 999.

135.

¿Cuántos números de nueve cifras existen, para los cuales todas las cifras son diferentes?

136.

¿Cuántos números enteros existen del 0 al 999, que no se dividan ni por 2, ni por 5 ni por 7?

137.

¿Cuántos números enteros existen del 0 al 999, que no se dividan por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7?

138.

¿En cuántos números del 0 al 999 figura la cifra 9? ¿En cuántos ésta figura dos veces? ¿En cuántos figura la cifra 0? ¿En cuántos ésta figura dos veces? ¿En cuántos figuran las cifras 0 y 9? ¿Y las cifras 8 y 9? ¿Cuántos números hay del 0 al 999 999 en los que no figuren dos cifras iguales juntas?

139.

¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar a partir de las cifras del número 123 153?

140.

¿Cuántos números de cinco cifras se pueden formar a partir de las cifras del número 12 335 233?

141.

¿Cuántos números de seis cifras se pueden escribir a partir de las cifras del número 1 233 145 254, de forma que no haya dos cifras iguales juntas?

142.

¿Cuántos números de cinco cifras se pueden formar a partir de las cifras del número 12 312 343, de manera que las tres cifras 3 no vayan juntas?

143.

¿De cuántos modos se pueden permutar las cifras del número 12 341 234, de forma que no haya dos cifras iguales juntas?

144.

El mismo problema para el número 12 345 254.

145.

¿De cuántas maneras se pueden permutar las cifras del número 1 234 114 546, de forma que no haya tres cifras iguales juntas?

146.

¿De cuántos modos se puede hacer esto, de manera que no haya dos cifras iguales juntas?

147.

¿De cuántas formas se pueden escoger de los números naturales del 1 al 20 dos, de modo que su suma sea impar?

148.

¿De cuántas maneras se pueden escoger de los números naturales del 1 al 30 tres, de forma que su suma sea par?

149.

Desde Londres hasta Brighton conducen dos carreteras, unidas por 10 caminos vecinales




Fig. 34.

(fig. 34). ¿De cuántos modos se puede viajar desde Londres hasta Brighton, de forma que el camino no se corte a sí mismo?

150.

Supongamos que, en las mismas condiciones, dos viajeros parten desde Londres por carreteras diferentes. ¿De cuántas maneras puede tener lugar el recorrido de forma que éstos no pasen por ningún segmento de carretera en un mismo sentido?

151.

De Londres a Cambridge conducen 3 carreteras, que son cruzadas por 4 caminos vecinales (fig. 35). ¿De cuántas formas se puede efectuar el viaje,




Fig. 35.

si no se viaja en dirección a Londres por ningún segmento de carretera, y ningún segmento es recorrido dos veces?

152.

Hay una cantidad ilimitada de monedas por valor de 10, 15 y 20 kopeks. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 20 monedas?

153.

Hay que adivinar qué cinco monedas tiene en sus manos el contrincante. Las monedas pueden ser por valor de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 kopeks y 1 rublo. ¿Cuántas respuestas incorrectas se pueden dar?

154.

¿Cuántos números de cinco cifras hay? ¿En cuántos de ellos todas las cifras son pares? ¿En cuántos son todas impares? ¿En cuántos no figuran cifras menores que 6? ¿En cuántos no hay cifras mayores que 3? ¿Cuántos de ellos contienen a todas las cifras 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos contienen a todas las cifras 0, 2, 4, 6, 8?

155.

Los lados de cada uno de dos dados están marcados con los números 0, 1, 3, 7, 15, 31. ¿Cuántas sumas diferentes pueden ser obtenidas al echar estos dados?

156.

Los lados de cada uno de tres dados están marcados con los números 1, 4, 13, 40, 121, 364. ¿Cuántas sumas distintas se pueden obtener al tirarlos?

157.

Se tiran seis dados, marcados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En cuántos casos éstos darán un solo tipo de puntos? ¿Y dos tipos? ¿Y tres? ¿Y cuatro? ¿Y cinco? ¿Y seis? (Todos los dados se consideran diferentes entre sí.)

158.

Se echan n dados. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtenerse (los que se diferencian sólo en el orden de los puntos se consideran iguales; en cada dado están marcados los números 1, 2, 3, 4, 5, 6)?

159.

¿De cuántas maneras diferentes se puede representar el número 1 000 000, en forma de producto de tres factores? Las representaciones que se diferencian en el orden de los factores se considerarán distintas.

160.

El mismo problema, pero con la condición de que el orden de los factores no se tiene en cuenta.

161.

¿De cuántas formas se pueden distribuir nueve monedas de distinto valor en dos bolsillos?

162.

¿De cuántos modos se pueden distribuir $3n$ objetos diferentes entre tres personas, de forma que cada uno obtenga n objetos?

163.

Se dan $2n$ elementos. Se consideran todas las particiones posibles en pares, y las que se diferencian entre sí sólo en el orden de los elementos dentro del par y en el orden de ubicación de los pares, se consideran coincidentes. ¿Cuántas particiones distintas de este tipo existen?

164.

El mismo problema, pero se dividen nk elementos en n grupos de k elementos cada uno.

165.

¿De cuántas maneras se pueden dividir 30 obreros en 3 brigadas de 10 personas cada una? ¿Y en 10 grupos de 3 personas cada uno?

166.

¿De cuántas formas se puede dividir una baraja de 36 cartas en dos mitades, de modo que haya dos ases en cada uno de los montones resultantes.

167.

¿De cuántos modos se pueden distribuir 10 libros en 5 encomiendas de 2 libros cada una (el orden de éstas no se tiene en cuenta)?

168.

¿De cuántas maneras se pueden distribuir 9 libros en 4 encomiendas de 2 libros y en una de 1 libro?

169.

El mismo problema, si hay que hacer 3 encomiendas con 3 libros cada una.

170.

¿De cuántas formas 3 personas pueden repartir entre sí 6 manzanas iguales, 1 naranja, 1 ciruela, 1 limón, 1 pera, 1 membrillo y 1 dátil?

171.

¿De cuántos modos se puede efectuar este reparto, de forma que cada uno obtenga 4 frutos?

172.

Las personas A , B y C tienen 3 manzanas cada una y, además, A tiene 1 pera, 1 ciruela y 1 membrillo, B tiene 1 naranja, 1 limón y 1 dátil, y C tiene 1 mandarina, 1 damasco y 1 durazno. ¿De cuántas maneras pueden distribuir entre sí estas frutas, de modo que cada uno obtenga 6 unidades?

173.

¿De cuántas formas se puede repartir una baraja de 52 cartas entre 13 jugadores, dando 4 a cada uno? El mismo problema, pero con la condición de que cada uno obtenga una carta de cada palo. El mismo problema, pero con la condición de que uno tiene cartas de los cuatro palos, y todos los restantes, cartas de un mismo palo.

174.

¿De cuántas maneras se pueden extraer 4 cartas de una baraja completa, de forma que haya 3 palos? ¿Y de modo que haya 2 palos?

175.

¿De cuántas maneras se pueden repartir 52 cartas entre cuatro jugadores, de forma que cada uno obtenga tres cartas de tres palos y cuatro del cuarto palo?

176.

¿De cuántas formas se pueden repartir 18 objetos diferentes entre 5 participantes, de modo que cuatro de ellos obtengan 4 objetos cada uno, y el quinto, 2? El mismo problema, pero ahora tres obtienen 4 objetos cada uno, y dos, 3.

177.

Se tienen 14 pares de objetos distintos. Hallar el número total de elecciones que se pueden efectuar a partir de éstos (dos elecciones se diferencian entre sí por la composición, pero no por el orden de los objetos).

178.

¿De cuántas maneras se pueden distribuir 4 esferas negras, 4 blancas y 4 azules en 6 paquetes diferentes (algunos de ellos pueden estar vacíos)?

179. ¿De cuántos modos se pueden distribuir 3 rublos y 10 monedas de 50 kopeks en 4 paquetes distintos?

180.

Demostrar que la cantidad de particiones del número n en varios sumandos es igual a la de particiones del número $2n$ en n sumandos (el orden de éstos no se tiene en cuenta).

181.

Se han dispuesto n objetos en fila. ¿De cuántos modos se pueden escoger tres de ellos, si no se toman dos elementos vecinos?

182.

Un niño coloca en las dos primeras líneas del tablero de ajedrez figuras blancas y negras (de a dos caballos, dos torres, dos alfiles, la reina y el rey de cada color). ¿De cuántas maneras lo puede efectuar?

183.

¿De cuántas formas se pueden distribuir estas figuras en todo el tablero?

184.

Resuélvase el mismo problema si se colocan además todos los peones (8 de cada color).

185.

¿De cuántas formas se pueden colocar 15 fichas blancas y 15 negras en 24 casillas, de manera que en cada una haya sólo fichas blancas o sólo negras? (Así se distribuyen las fichas en el juego oriental llamado «nardy»).

186.

¿De cuántos modos se pueden distribuir 20 fichas blancas en el tablero de ajedrez, de forma que cada disposición se transforme en sí misma al girar el tablero 90° ?

187.

¿De cuántas maneras se pueden disponer 20 fichas blancas en el tablero de ajedrez, de forma que cada disposición sea simétrica con respecto a la línea que divide el tablero a la mitad?

188.

Lo mismo, pero con la condición de que las fichas se coloquen en las casillas negras.

189.

¿De cuántas maneras se pueden distribuir 12 fichas blancas y 12 negras en las casillas negras de un tablero de ajedrez, de forma que cada posición sea simétrica con respecto al centro del tablero?

190.

Lo mismo, pero en la simetría deben cambiar los colores de las fichas.

191.

¿De cuántos modos se pueden colocar 20 fichas blancas en las casillas del borde de un tablero de ajedrez, de forma que cada distribución no varíe al girar el tablero 90° ?

192.

¿De cuántas maneras se pueden colocar 20 fichas blancas en las casillas de los bordes de un tablero de ajedrez, de forma que en los lados opuestos del tablero las fichas se dispongan simétricamente con respecto a la línea que divide el tablero por la mitad?

193.

¿De cuántos modos se pueden distribuir en 9 hoyos 7 esferas blancas y 2 negras? Una parte de los hoyos puede estar vacía, y éstos se consideran diferentes.

194.

¿De cuántas formas se pueden distribuir en 9 hoyos 7 esferas blancas, 1 negra y 1 roja?

195.

¿De cuántas formas se pueden repartir 27 libros entre las personas A , B , y C , de modo que A y B juntas obtengan el doble de libros que C ?

196.

A un ascensor subieron 8 personas. ¿De cuántas maneras pueden bajarse en cuatro pisos, de modo que en cada piso salga por lo menos una persona?

197.

¿De cuántas formas se pueden escoger de los números del 1 al 100 tres, de modo que su suma se divida por 3?

198.

¿De cuántas maneras se pueden escoger de 3n números enteros sucesivos tres, tales que su suma se divida por 3?

199.

Se tienen n esferas blancas y una negra. ¿De cuántas formas se pueden colocar algunas de estas esferas en $n + 1$ hoyos, si en cada uno cabe no más de una esfera?

200.

¿De cuántas maneras se pueden distribuir m esferas blancas y n negras, de modo que entre las esferas blancas y las negras haya $2r - 1$ contactos? ¿Y $2r$ contactos?

201.

¿De cuántas formas se pueden obtener 8 calificaciones no menores que 3 en distintas disciplinas, de modo que su suma sea igual a 30?

202.

Mostrar que $m + n$ objetos se pueden permutar, de modo que exactamente n queden en su lugar, de $\frac{(m+n)! D_m}{m! n!}$ maneras (véase la pág. 47).

203.

Mostrar que r cosas diferentes se pueden distribuir entre $n + p$ personas, de modo que n dadas obtengan por lo menos un objeto, de

$$S_r = (n+p)^r - n(n+p-1)^r + C_2^n (n+p-2)^r - \dots \\ \dots + (-1)^n n^r$$

formas.

204.

Mostrar que la cantidad de particiones del número $2r + x$ en $r + x$ sumandos diferentes de cero es la misma que la de descomposiciones de n en sumandos no negativos.

205.

Una sociedad con n miembros escoge entre ellos un representante. ¿De cuántas maneras puede tener lugar la votación, si cada uno vota por una persona (puede ser que por sí mismo)? El mismo problema, pero se tiene en cuenta sólo el número de votos que obtuvo cada candidato, y no quién votó por él.

206.

Mostrar que el número de formas de dividir $2n$ objetos indistinguibles en tres partes indistinguibles, de modo que la suma de dos cualesquiera sea mayor que la tercera, es igual al número de maneras de dividir de la misma forma $2n - 3$ objetos.

207.

Mostrar que un número impar de objetos puede ser escogido de n objetos de 2^{n-1} maneras.

208.

Mostrar que el número de formas con que dos personas pueden repartir entre sí $2n$ objetos de un tipo, $2n$ de otro y $2n$ de un tercero, de modo que cada uno obtenga $3n$ objetos, es igual a $3n^2 + 3n + 1$.

209.

Si se agregan $2n$ objetos de un cuarto tipo, el número de formas de reparto, en las que cada persona obtiene $4n$ objetos, es igual a

$$\frac{1}{3} (2n+1)(8n^2+8n+3).$$

210.

Si los objetos se dividen en partes indiferenciables, las respuestas serán

$$\frac{1}{2} (3n^2+3n+2) \text{ y } \frac{1}{3} (n+1)(8n^2+4n+3).$$

211.

Mostrar que si se tienen m tipos de objetos, con $2n$ objetos cada tipo, el número de maneras de dividirlos en dos partes iguales se expresa mediante la fórmula

$$C_{m-1}^{2n+m-1} - C_1^m C_{m-1}^{2n+m-2} + \\ + C_2^m C_{m-1}^{2n+m-4n-3} - \dots \\ \dots \pm C_x^m C_{m-1}^{2n+m-1-x(2n+1)} \mp \dots$$

212.

¿De cuántas formas se pueden colocar cinco esferas blancas, cinco negras y cinco rojas en tres cajones diferentes, poniendo cinco esferas en cada cajón?

213.

Si hay tres tipos de objetos, habiendo n de cada tipo, se pueden distribuir entre tres personas A, B, C , de modo que cada una obtenga n objetos, de

$$C_2^{n+2} C_2^{n+2} - 3C_3^{n+3} = \frac{1}{8} (n+1)(n+2)(n^2+3n+4)$$

maneras.

214.

¿De cuántas formas se pueden sentar juntos 3 ingleses, 3 franceses y 3 turcos, de modo que no haya tres compatriotas juntos?

215.

El mismo problema, pero con la condición de que no haya dos compatriotas juntos.

216.

¿De cuántas maneras se pueden sentar a una mesa redonda 3 ingleses, 3 franceses y 3 turcos, de modo que no haya dos compatriotas juntos?

217.

¿De cuántas formas se pueden pegar estampillas a suma de 40 kopeks, utilizando estampillas por valor de 5, 10, 15, y 20 k., situadas en una fila? (Las disposiciones que se diferencian en el

orden de las estampillas se consideran distintas; el número de estampillas es ilimitado.)

218.

¿De cuántas maneras se puede cambiar un rublo en monedas por valor de 10, 15, 20 y 50 k.?

219.

¿De cuántos modos se pueden obtener 78 g. utilizando 8 pesas de 1, 1, 2, 5, 10, 10, 20 y 50 g? Aquí se considera que la utilización de dos pesas distintas, aunque sean de un mismo peso, conduce a combinaciones diferentes.

220.

Hay seis esferas: 3 negras, 1 roja, 1 blanca y 1 azul. ¿De cuántas formas se puede formar con ellas una fila que contenga 4 esferas?

221.

¿De cuántas maneras se puede representar el número natural n en forma de suma de tres términos, cada uno de los cuales sea también un número natural (las representaciones que se diferencien en el orden de los sumandos se considerarán distintas)?

222.

¿Cuántas y qué cifras serán necesarias para escribir todos los números del 1 al 999 999 inclusive? ¿Y del 1 al $10^n - 1$ inclusive?

223.

¿Cuántos números diferentes de diez cifras se pueden escribir utilizando las tres cifras 1, 2, 3, con la condición complementaria de que la cifra 3 se utilice en cada número exactamente dos veces? ¿Cuántos de los números escritos se dividen por 9?

224.

Diremos que dos números, que figuran en un arreglo, forman una inversión, si el mayor de ellos está escrito antes que el menor. ¿Cuántas inversiones hay en todas las permutaciones de los números 1, 2, ..., n ?

225.

Demostrar que el número de particiones de n en 3 partes tales que no haya dos iguales, es igual a

$$E \left[\frac{1}{12} (n^2 - 6n + 12) \right].$$

226.

Demostrar que el número de particiones de $12n + 5$ en 4 partes, tales que ninguna de ellas supere a $6n + 2$, es igual a

$$\frac{1}{2} (n+1) (12n^2 + 9n + 2).$$

227.

Demostrar que el número de particiones de $12n + 5$ en 4 partes, en las que ninguna supere a $6n + 2$ y no hay dos iguales, es

$$\frac{n}{2} (12n^2 + 3n - 1).$$

228.

Hallar la cantidad de ternas de números naturales que formen progresión geométrica y no superen a 100.

229.

¿De cuántas maneras se pueden disponer en fila 6 ingleses, 7 franceses y 10 turcos, de modo que cada inglés esté entre un francés y un turco y que no haya ningún francés junto a un turco?

230.

Lo mismo, pero para 5 ingleses, 7 franceses y 10 turcos.

231.

¿Cuántas soluciones tiene el problema siguiente: hallar dos números tales que su máximo común divisor sea igual a G , y su mínimo común múltiplo, a $M = G^{\alpha} b^{\beta} c^{\gamma} d^{\delta}$ (a, b, c y d son números primos)?

232.

Resolver el mismo problema, pero sin las palabras «mínimo» y «máximo».

233.

¿Cuántas combinaciones se pueden formar de 20 letras, tomadas de a 6, de modo que en cada una no haya ninguna letra que figure más de dos veces?

234.

Hay $p + q + r$ letras: p letras α , q letras β y r letras γ . Estas se permutan de todas las maneras

posibles, de forma que las α comiencen antes que las β , y las β , antes que las γ . ¿De cuántos modos es posible esta permutación?

235.

Una línea de 30 cm se pinta en el orden siguiente: rojo, blanco, azul, rojo, blanco, azul, etc. Se comienza por el color rojo, y se termina en el azul. Cada color ocupa en total 10 cm, las franjas no son menores que 2 cm, siendo las longitudes de éstas números enteros. ¿Cuántas maneras posibles hay de pintarla? ¿Y si se quita la condición de que todo culmina en el azul? Demostrar que si ninguna franja es menor de 3 cm, en 153 casos el último será el color azul, en 71, el blanco, y en 81, el rojo.

236.

Tengo 6 amigos, con cada uno de los cuales he almorzado 8 veces; con cada dos, 5 veces; con cada tres, 4 veces; con cada cuatro, 3 veces; con cada cinco, 2 veces; con todos los seis, 1 vez, y sin cada uno de ellos, 8 veces. ¿Cuántas veces he almorzado solo?

237.

Dos examinadores, trabajando a un tiempo, examinan un grupo de 12 personas en dos disciplinas. Cada examinado responde durante 5 minutos a cada disciplina. ¿De cuántas formas pueden distribuir los examinadores entre sí el trabajo, de modo que a ningún escolar le toque responder las dos disciplinas a la vez?

238.

¿De cuántas maneras 6 personas pueden escoger de 6 pares de guantes uno derecho y uno izquierdo, de modo que ninguno obtenga un par? Lo mismo para 9 pares y 6 personas.

239.

Las letras que figuran en la expresión $\alpha^2\beta^2\gamma^2$ se permutan de todas las maneras posibles, en las que junto a cada letra (a su izquierda o a su derecha) se halle la misma letra. Demostrar que el número de estas permutaciones es igual a 6. Para $\alpha^3\beta^2\gamma^2$ es también 6. Para $\alpha^4\beta^3\gamma^4$, 90, y para $\alpha^5\beta^4\gamma^5$, 426.

240.

En una olimpiada de ajedrez participan representantes de n países, de a 4 representantes de cada

país. ¿De cuántas formas se pueden colocar en fila, de modo que al lado de cada uno se halle un representante del mismo país?

241.

Las casillas de un tablero de ajedrez se pintan de 8 colores, de modo que en cada fila horizontal se encuentren los 8 colores, y en cada vertical no se encuentren dos casillas juntas pintadas del mismo color. ¿De cuántas maneras es posible este pintado?

242.

Hay n cosas iguales, y otras n diferentes. ¿De cuántas formas se pueden escoger n cosas de entre ellas? ¿De cuántas se pueden ordenar todas las $2n$ cosas?

243.

m franceses y n ingleses están parados en fila, de modo que al lado de cada uno se halla por lo menos uno de sus compatriotas. Mostrar que el número de disposiciones posibles de este tipo es igual a

$$m!n! \{1 + (C_0^{m-2} + C_1^{m-3})(C_0^{n-2} + C_1^{n-3}) + (C_1^{m-3} + C_2^{m-4})(C_1^{n-3} + C_2^{n-4}) + (C_2^{m-4} + C_3^{m-5})(C_2^{n-4} + C_3^{n-5}) + \dots\}$$

244.

¿Cuántos números de seis cifras contienen exactamente tres cifras diferentes?

245.

¿Cuántos números de m cifras contienen exactamente k cifras distintas?

246.

Se analizan todos los k -arreglos de los números $1, 2, \dots, n$, en los cuales los números pares se hallan en los lugares con números pares, y los impares, en los que tienen números impares. ¿Cuántos de estos arreglos están dispuestos en orden creciente de los números (por ejemplo, tienen la forma 3678)?

247.

Se dan $2n$ elementos $a_1, a_1, a_2, a_2, \dots, a_n, a_n$, siendo $a_i \neq a_j$, si $i \neq j$. ¿En cuántas permutaciones de estos $2n$ elementos ningún par de elementos iguales estará junto?

248.

Se dan n conjuntos, en cada uno de los cuales figuran q elementos iguales, siendo los elementos de distintos conjuntos diferentes. ¿En cuántas permutaciones de estos nq elementos no habrá elementos iguales juntos?

249.

Resolver el mismo problema, con la condición de que los elementos se disponen en círculo.

250.

En un estante de biblioteca hay n libros. ¿De cuántas formas se pueden escoger p de éstos, de modo que entre dos cualesquiera de los escogidos, al igual que después del p -ésimo tomado, haya no menos de s libros?

251.

Los números que expresan la cantidad de participantes de una olimpiada matemática de las clases 5, 6, 7, 8, 9 y 10, forman una progresión aritmética. El número de premios para cada clase es igual a la razón de esta progresión. Demostrar que el número de maneras de entregar los premios no varía si se entregan todos a los alumnos de la 10-ma clase (se supone que todos los premios son distintos).

252.

En un papel cuadrículado se ha dibujado un cuadrado $ABCD$ de lado igual a 4 casillas, después de lo cual se han trazado todos los caminos más cortos desde el vértice A al C , que pasan por los lados de las casillas. Demostrar que el número de caminos es igual a 70, pasando 35 caminos por 4 segmentos; 20 caminos por 8; 18 por 4; 15 por 4; 12 por 4; 10 por 4; 5 por 4; 4 por 4; 1 por 4.

Estudiar análogamente los cruces: 1 es pasado 36 veces; 4, 35 veces; 4, 30 veces; 4, 15 veces; 4, 5 veces; 4, 40 veces; 2, 1 vez (los puntos extremos se excluyen).

253.

¿Cuántos triángulos existen, cuyos vértices sean vértices de un hexágono convexo dado?

254.

¿Cuántos triángulos existen, cuyas longitudes de los lados adquieran uno de los valores 4, 5, 6, 7?

255.

¿Cuántos paralelepípedos rectángulos distintos se pueden construir, para los cuales la longitud de cada arista sea un entero del 1 al 10?

256.

En el plano se han trazado 4 rectas, entre las cuales no hay dos paralelas y no hay 3 que pasen por un mismo punto. ¿Cuántos triángulos se obtuvieron?

257.

En el plano se han fijado n puntos, de los cuales p se hallan en una misma recta y , a excepción de éstos, no hay 3 puntos sobre una misma recta. ¿Cuántos triángulos existen, cuyos vértices sean estos puntos?

258.

En una recta se han tomado p puntos, y en una paralela a ella, otros q puntos. ¿Cuántos triángulos existen, cuyos vértices sean estos puntos?

259.

Supongamos que, en las mismas condiciones, en una paralela más se han tomado r puntos, y no hay tres que se hallen sobre una misma recta que corte las tres paralelas. ¿Cuántos triángulos complementarios se obtendrán?

260.

Cada lado de un cuadrado se ha dividido en n partes. ¿Cuántos triángulos se pueden construir, cuyos vértices sean los puntos de división?

261.

En el plano se han trazado n líneas rectas, entre las cuales no hay dos paralelas ni tres que se corten en un mismo punto. ¿Cuántos puntos de intersección tienen estas rectas?

262.

En el plano se han trazado n rectas, de las cuales p pasan por el punto A y q por el B y, además, no hay tres que pasen por un mismo punto, ninguna que pasa por ambos puntos A y B , y ningún par de paralelas. ¿Cuántos puntos de intersección tienen estas rectas?

263.

¿En cuántas partes dividen al plano n rectas, entre las cuales no hay dos paralelas ni tres que pasen por un mismo punto?

264.

¿En cuántas partes dividen al espacio n planos, entre los cuales no hay 4 que pasen por un mismo punto, ni 3 que pasen por una misma recta, ni 2 paralelos?

265.

En el plano se han tomado cinco puntos. Entre las rectas que los unen no hay paralelas, perpendiculares ni coincidentes. Tracemos por cada punto las perpendiculares a todas las rectas que se pueden formar uniendo de a pares los cuatro puntos restantes. ¿Cuál es el número máximo de puntos de intersección de estas perpendiculares entre sí, si no se consideran los cinco puntos dados?

266.

¿De cuántas maneras se pueden formar triángulos, cuyos lados sean enteros mayores que n y que no superen $2n$? ¿Cuántos de ellos son isósceles, y cuántos equiláteros?

267.

Mostrar que el número de triángulos de lados enteros, cuya longitud no supere $2n$, es igual a $\frac{1}{6}n(n+1)(4n+5)$. Si se excluyen los isósceles, este número será igual a $\frac{1}{6}n(n-1)(4n-5)$.

268.

Mostrar que el número de triángulos cuya longitud de los lados no supere a $2n-1$, es igual a $\frac{1}{6}n(n+1)(4n-1)$, y después de excluir a los isósceles quedan $\frac{1}{6}(n-1)(n-2)(4n-3)$ triángulos.

269.

En el plano se han trazado n rectas, entre las cuales no hay tres que pasen por un mismo punto. Demostrar que el número de grupos no ordenados

¹ Aquí también se considera que los lados son enteros (N. del T.).

de n puntos de intersección cada uno, de los cuales no haya tres sobre una misma recta, es igual a $\frac{1}{2}(n-1)$.

270.

Hay n puntos en el plano, entre los cuales no hay tres sobre una misma recta. ¿Cuántas quebradas cerradas de r segmentos existen, con vértices en estos puntos?

271.

Sobre una recta se han tomado n puntos, y sobre una paralela a ella, m . Estos puntos se unen mediante rectas. Demostrar que el número de puntos de intersección de las rectas trazadas es igual a $\frac{mn(m-1)(n-1)}{2}$. (Consideramos que entre las rectas trazadas no hay tres que se corten en un mismo punto, y los $m+n$ puntos dados no se tienen en cuenta.)

272.

Hay n puntos en el plano, entre los cuales no hay tres sobre una misma recta ni 4 sobre una misma circunferencia. Por cada dos de estos puntos se traza una recta, y por cada tres, una circunferencia. Hallar la mayor cantidad posible de puntos de intersección de todas estas rectas trazadas con todas las circunferencias.

273.

En el espacio se han dado n puntos, entre los cuales no hay cuatro sobre un mismo plano. Por cada tres puntos se traza un plano, y entre éstos no hay dos paralelos. Hallar el número de rectas que se obtienen en la intersección de estos planos, así como también el de rectas que no pasen por ninguno de los puntos dados.

274.

Entre n segmentos de longitud 1, 2, ..., n , se escogen 4, de modo que se obtenga un cuadrilátero circunscrito. Demostrar que esto se puede efectuar de $\frac{2n(n-2)(2n-5)-3+3(-1)^n}{48}$ maneras. ¿Cuántos cuadriláteros se obtienen si se pueden tomar lados de igual longitud?

275.

Se dan n puntos, entre los cuales no hay cuatro sobre una misma circunferencia. Se traza una

circunferencia por cada tres de ellos. ¿Cuál es el máximo número de puntos de intersección de estas circunferencias?

276.

Mostrar que si n planos pasan por el centro de una esfera, en el caso general la dividen en no más de $n^2 - n + 2$ partes.

277.

¿De cuántas formas geoméricamente distintas se pueden pintar las caras de un cubo con seis pinturas diferentes? Dos métodos se consideran geoméricamente coincidentes, si se puede transformar uno en el otro moviendo el cubo como si fuese un cuerpo rígido.

278.

¿De cuántas maneras geoméricamente diferentes se pueden pintar las caras de un tetraedro con cuatro pinturas distintas?

279.

¿De cuántos modos geoméricamente diferentes se pueden pintar las caras de un octaedro con ocho pinturas distintas?

280.

Resolver un problema análogo para el dodecaedro e icosaedro regulares.

281

En los problemas anteriores considerar los casos en el número de pinturas sea menor que el de caras (por ejemplo, el cubo se pinta con dos colores, con tres, cuatro, cinco).

282.

¿Cuántos triángulos existen con lados enteros y perímetro 40? ¿Y con perímetro 43?

283.

Mostrar que el número de triángulos de lados enteros y perímetro $4n + 3$ es mayor en $n + 1$ que el de triángulos de lados enteros y perímetro $4n$.

284.

Mostrar que el número de triángulos de lados enteros y perímetro N se expresa por la tabla

N	Número de triángulos	N	Número de triángulos
12n	$3n^2$	12n + 6	$3n^2 + 3n + 1$
12n + 1	$n(3n + 2)$	12n + 7	$(n + 1)(3n + 2)$
12n + 2	$n(3n + 1)$	12n + 8	$(n + 1)(3n + 1)$
12n + 3	$3n^2 + 3n + 1$	12n + 9	$3n^2 + 6n + 3$
12n + 4	$n(3n + 2)$	12n + 10	$(n + 1)(3n + 2)$
12n + 5	$(n + 1)(3n + 1)$	12n + 11	$3n^2 + 7n + 4$

285.

La red de autobuses de una ciudad está formada de la siguiente manera:

1. De cualquier parada se puede llegar, sin hacer transbordo, a cualquier otra.

2. Para cualquier par de recorridos existe una parada, y sólo una, en la cual se puede pasar de uno de estos recorridos a otro.

3. Cada recorrido tiene exactamente n paradas. ¿Cuántos recorridos de autobús hay en la ciudad?

286.

En la ciudad hay 57 recorridos de autobús. Se conoce que

1. De cualquier parada se puede llegar a cualquier otra sin hacer transbordo.

2. Para cualquier par de recorridos existe una parada, y sólo una, en la cual se puede pasar de uno de estos recorridos al otro.

3. Cada recorrido tiene no menos de tres paradas.

¿Cuántas paradas posee cada uno de los 57 recorridos?

287.

¿Se pueden trazar en la ciudad 10 recorridos de autobús y establecer en éstos las paradas de forma que cualesquiera que sean los 8 recorridos que tomemos existirá una parada que no se encuentre en ninguno de ellos y que 9 recorridos cualesquiera pasen por todas las paradas?

288.

¿Cuál es el máximo número de esferas distintas que se pueden trazar en el espacio, de modo que sean tangentes a tres planos dados y a una esfera dada?

289.

Tracemos m rectas por cada uno de tres puntos dados, de manera que entre ellas no haya dos paralelas entre sí ni tres que se corten en un mismo punto. Hallar el número de puntos de intersección de estas rectas.

290.

En el espacio se han fijado n puntos, de los cuales m se hallan en un mismo plano P , y los demás están situados de modo que no haya cuatro sobre un mismo plano. ¿Cuántos planos se pueden trazar que contengan de a tres de los puntos dados?

291.

En el plano se dan tres puntos, A, B, C . Tracemos por el punto A m rectas, por el B , n , y por el C , p . Además, entre las rectas trazadas no debe haber tres que se corten en un mismo punto ni dos paralelas. Hallar la cantidad de triángulos cuyos vértices sean los puntos de intersección de estas rectas y no coincidan con los puntos dados A, B, C .

292.

¿Cuántos triángulos existen, cuyos vértices son vértices de un polígono convexo dado de n lados y cuyos lados no coincidan con los de esta figura?

293.

En el plano se han trazado n rectas, y en cada una de ellas se han tomado p puntos, de forma que ninguno de éstos sea punto de intersección de las rectas y no haya tres sobre una recta distinta de las dadas. Hallar el número de triángulos con vértices en estos puntos.

294.

Mostrar que el número de puntos de intersección de las diagonales de un polígono convexo de n lados, que se hallan fuera de este polígono, es igual a $\frac{1}{12}n(n-3)(n-4)(n-5)$, y el de los que se hallan dentro de él, a $\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$ (se supone que no hay dos diagonales paralelas ni tres que se corten en un mismo punto).

295.

En una circunferencia hay n puntos. ¿Cuántos polígonos distintos existen (no forzosamente con-

vexos) inscritos en esta circunferencia, cuyos vértices sean los puntos dados? ¿Y cuántos polígonos convexos?

296.

En el plano se han trazado m rectas paralelas. Además, en el mismo plano se han trazado n rectas no paralelas ni entre sí, ni a las que ya se han trazado antes. Ninguna recta pasa por el punto de intersección de otras dos. ¿En cuántas regiones queda dividido el plano por las rectas trazadas?

297.

Se dan 11 puntos, de los cuales hay 5 en una misma circunferencia. Además de éstos, no hay 4 que se hallen sobre una misma circunferencia. ¿Cuántas circunferencias se pueden trazar, de modo que cada una de ellas contenga por lo menos 3 puntos de los dados?

298.

En el plano se han fijado 10 rectas que se cortan dos a dos, sin que haya 3 de ellas que pasen por un mismo punto ni 4 que sean tangentes a una misma circunferencia. ¿Cuántas circunferencias se pueden trazar, cada una de las cuales sea tangente a 3 de las 10 rectas dadas?

299.

Hallar la cantidad de todos los polígonos convexos de k lados, cuyos vértices sean k de los n vértices de un polígono convexo de n lados, con la particularidad de que dos vértices vecinos del polígono de k lados deben estar separados por lo menos por s vértices del polígono de n lados.

300.

Un paralelogramo se corta por dos series de rectas paralelas a sus lados; cada serie está formada por r líneas. ¿Cuántos paralelogramos hay en la figura obtenida?

301.

¿En cuántas partes se divide un polígono convexo de n lados por sus diagonales, si no hay tres de ellas que se corten en un mismo punto dentro del polígono?

302.

Sea dada una carta con número 1, dos con número 2, tres con el 3, etc. Demostrar que el número de formas de extraer dos cartas, de modo que

se obtenga como suma n , es igual a $\frac{n}{12}(n^2 - 1)$,

o a $\frac{n}{12}(n^2 - 4)$, según sea impar o par n .

303.

Se tienen $3n + 1$ objetos, de los cuales hay n iguales, y los demás son distintos. Demostrar que de ellos se pueden extraer n objetos de 2^{2n} maneras.

304.

Se da la sucesión de números $1, 2, 3, \dots, 2n$. ¿De cuántas formas se pueden extraer de éstos tres números que formen una progresión aritmética? Lo mismo para la sucesión numérica $1, 2, 3, \dots, 2n + 1$.

305.

En el plano se han trazado varias curvas cerradas, cada una de las cuales corta todas las restantes por lo menos en dos puntos. Sea n , el número de puntos, en los que se cortan r curvas. Demostrar que el número de regiones cerradas, delimitadas por arcos de estas curvas y que no contengan dentro de sí a tales arcos, es igual a

$$1 + n_2 + 2n_3 + \dots + rn_{r+1} + \dots$$

306.

En el plano se han trazado dos haces de rectas con centros en los puntos A y B , uno de los cuales contiene m rectas, y el otro, n . Supongamos que no hay dos rectas paralelas y ninguna que pase por ambos puntos A y B . ¿En cuántas partes dividen al plano las rectas de estos haces?

307.

¿Se puede unir cada uno de 77 teléfonos dados exactamente con otros 15?

308.

Hallar la suma de los coeficientes del polinomio que se obtiene después de abrir paréntesis en la expresión

$$(7z^3 - 13y^3 + 5z^2)^{1964} (y^3 - 8y^2 + 6y + z)^2 + (2x^2 + 18y^3 - 21)^{1965}$$

309.

En un cajón hay 100 bolas de distintos colores: 28 rojas, 20 verdes, 12 amarillas, 20 azules, 10 blancas y 10 negras. ¿Cuál es el mínimo número

de bolas que deben ser extraídas para que entre ellas haya forzosamente 15 de un mismo color?

310.

Se pueden pintar todas las caras de un cubo de blanco, o bien de negro, o bien una parte de blanco y otra de negro. ¿Cuántas formas distintas de pintado existen? (Dos cubos se consideran pintados de diferente manera, si no se los puede confundir, por más que giremos al cubo.)

311.

Resúlvase el mismo problema, con la condición de que no se pinten las caras, sino los vértices del cubo.

312.

Los modelos de poliedros se confeccionan de desarrollos planos. En el desarrollo las caras están unidas unas a las otras por sus aristas, y el modelo se construye doblando el desarrollo en cartulina a lo largo de las aristas. El tetraedro regular tiene dos distintos desarrollos de este tipo. ¿Cuántos tiene el cubo?

313.

Un dodecaedro regular se puede pintar de 4 colores, de modo que cualesquiera dos caras adyacentes tengan distinto color. ¿Cuántas soluciones geométricamente distintas tiene este problema?

314.

De seis aristas del tetraedro se pueden escoger cuatro que formen un cuadrilátero espacial cerrado. Este cuadrilátero contiene todos los vértices del tetraedro. Lo mismo puede hacerse con el cubo: obtendremos un octógono que contiene todos los vértices del cubo. ¿Puede ser efectuado lo mismo con el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro? ¿Cuántas soluciones habrá para cada poliedro?

315.

En el origen de coordenadas hay una partícula. Al cabo de una unidad de tiempo, ésta se desintegra en dos, una de las cuales se desplaza en una unidad de longitud hacia la izquierda, y la otra, hacia la derecha. Este proceso se repite al cabo de cada unidad de tiempo, con la particularidad de que dos partículas que quedaron en un mismo punto se aniquilan mutuamente (de forma que, por ejemplo, al cabo de dos unidades de tiempo

quedarán dos partículas). ¿Cuántas partículas habrá al cabo de 129 unidades de tiempo? ¿Y al cabo de n unidades?

316.

Cierto alfabeto está formado por seis letras, las cuales han sido codificadas, para transmitir las por el telegrafo, como sigue:

·; -; ··; - -; ·-; -·.

Al transmitir una palabra, no fueron hechos intervalos que separasen una letra de la otra, de modo que se obtuvo una cadena uniforme de puntos y rayas, formada por 12 signos. ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra transmitida?

317.

¿Qué números, del 1 al 10 000 000, habrá más: aquellos en cuya escritura se encuentra la unidad, o aquellos que no la contienen en su escritura?

318.

De puntos y rayas se forman todas las palabras posibles, en las cuales figuran exactamente siete símbolos. ¿Cuál es el mayor número de palabras que se pueden formar, de modo que dos de ellas se diferencien por lo menos en tres signos?

319.

¿De cuántas formas se puede pintar con n colores una circunferencia dividida en p partes (p es primo)? Las formas que coinciden en un giro de la circunferencia alrededor de su centro se consideran coincidentes.

320.

En una hoja de papel cuadriculado de $n \times n$ cuadrículas, se han dispuesto los números 1, 2, 3, ..., n^2 , de a uno en cada cuadrícula, de modo que los números de cada vertical y horizontal formen una progresión aritmética. Hallar la cantidad de tales disposiciones.

321.

El hombre no tiene más de 300 000 pelos en su cabeza. Demostrar que en Moscú viven no menos de 10 personas con igual número de pelos (la población de Moscú es alrededor de 7 millones de personas).

322.

Se dan $2n + 1$ objetos. Demostrar que entre ellos se puede escoger un número impar de objetos mediante la misma cantidad de formas que un número par de ellos.

323.

Demostrar que 1 rublo se puede cambiar en monedas de 2 y 5 kopeks mediante un número mayor de formas que en monedas de 3 y 5 k.

324.

¿De cuántas maneras se pueden cambiar 20 kopeks en monedas por valor de 1, 2 y 5 k.?

325.

Demostrar que mediante una colección standard de pesas: 1 mg, 2 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 200 mg, 500 mg, 1 g, etc., se puede formar cualquier peso, expresado mediante un número entero de miligramos.

326.

Se dan 6 cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hallar la suma de todos los números pares de cuatro cifras que se pueden escribir con estas cifras (una misma cifra puede repetirse).

327.

Una baraja de $2n$ cartas se mezcla de la siguiente manera: se divide por la mitad, y las cartas de la primera mitad se distribuyen de a una entre las de la segunda (en el orden dado). Por ejemplo, la carta de número $n + 1$ será la primera; la primera será segunda; la de número $n + 2$, tercera; la segunda, cuarta, etc. Demostrar que después de r veces la carta que al principio se hallaba en el p -ésimo lugar quedará en el lugar x , siendo x el resto de la división de $p2^r$ por $2n + 1$.

328.

Demostrar que si en las condiciones del problema 327 la baraja contiene $6m + 2$ cartas, las cartas de números $2m + 1$ y $4m + 2$ todo el tiempo se intercambiarán de lugar.

329.

Si en las mismas condiciones la baraja contiene $14m + 6$ cartas, después de mezclar tres veces de la manera indicada, las cartas $2m + 1$,

$2(2m+1)$, $3(2m+1)$, $4(2m+1)$, $5(2m+1)$,
 $6(2m+1)$ volverán a sus lugares iniciales.

330.

Si en las mismas condiciones $2x-1$ se divide por $2n+1$, una baraja de $2n$ cartas, después de x mezclas, volverá a su posición inicial.

331.

Una baraja de cartas se mezcla como sigue: primero se toma la primera carta, la segunda se coloca sobre ella, la tercera, debajo de ella, etc. Demostrar que si la baraja contiene $6n-2$ cartas, la carta $2n$ quedará en su lugar.

332.

22 cartas se someten a la mezcla indicada más arriba. Demostrar que la carta 8 quedará todo el tiempo en su lugar, la 5 y la 14 se intercambiarán sus lugares, y las, 3, 13, 18 pasan una a la otra en forma circular.

333.

Demostrar que, bajo las mismas condiciones: una baraja de 16 cartas vuelve a su posición inicial cada 5 veces; una de 32 cartas, al cabo de 6 veces; una de 42, luego de 8 veces; las de 28 y 36, después de 9 veces; las de 12, 20 y 40, al cabo de 10 veces; las de 22 y 52, después de 12; una de 14, al cabo de 14 veces; una de 18, después de 18; una de 26, luego de 26, una de 30, después de 30, y una de 50, al cabo de 50 veces.

334.

Un cuadrado está dividido en 16 cuadrados iguales. ¿De cuántas maneras se pueden pintar de blanco, negro, rojo y azul, de modo que en cada horizontal y en cada vertical estén los cuatro colores?

335.

15 escolares se forman, para un paseo, en 5 filas de 3 personas cada una. ¿Cuántas veces puede efectuarse esto, de modo que no haya dos escolares que queden dos veces juntos?

336.

Demostrar que si n es un entero, $(n^2)!/(n!)^{n+1}$ también lo será, y si m y n son impares,

$$\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}} (n!)^{\frac{m+1}{2}}} \text{ es entero.}$$

337.

n objetos se hallan distribuidos en círculo. Demostrar que si f_n es el número de permutaciones de estos objetos, en las que ninguno de ellos sigue tras aquel que seguía al principio, entonces será

$$f_n + f_{n+1} = D_n$$

(véase la pág. 47).

338.

Hallar el número de soluciones enteras de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_p = m$, si todas las incógnitas satisfacen a la desigualdad $0 \leq x_i \leq x_h < n$.

339.

Se tienen 7 ejemplares de un libro, 8 de otro y 9 de un tercero. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre dos personas, de modo que cada una obtenga 12 libros?

340.

Se han escrito todas las n -combinaciones con repetición, formadas a partir de n letras. Demostrar que cada letra se encontrará C_n^{n-1} veces.

341.

Desde A hasta B hay 999 km. A lo largo del camino hay postes indicadores de los kilómetros, en los cuales están escritas las distancias hasta A y hasta B (0, 999), (1, 998), ..., (999, 0). ¿Cuántos habrá, entre ellos, en los que haya sólo dos cifras distintas?

342.

Se forman todos los arreglos posibles con repetición que pueden efectuarse con m esferas blancas y n negras. Demostrar que su número es igual a $P(m+1, n+1) - 2$.

343.

Se han formado todos los arreglos posibles con repetición que pueden efectuarse a partir de m esferas blancas y n negras. Demostrar que el número total de esferas blancas en todos los arreglos es de

$$1 + \frac{mn+m-1}{n+2} P(m+1, n+1),$$

y el de las negras, de

$$1 + \frac{mn+n-1}{m+2} P(m+1, n+1).$$

Comprobar la respuesta de este problema en la palabra «Gaaga».

344.

Demstrar que el número de arreglos tomados de a 1, 2, ..., $m+n+1$, que se pueden formar a partir de m esferas blancas, n negras y una roja, on los que figure la roja, es igual a

$$1 + \frac{mn+m+n}{m+n+4} P(m+2, n+2).$$

345.

El número total de arreglos que se pueden formar a partir de m esferas blancas, n negras y una roja, es igual a

$$\frac{(m+1)(n+1)}{m+n+3} P(m+2, n+2) - 1.$$

Comprobar la respuesta en la palabra «okorok».

346.

Tengo 7 amigos. ¿De cuántas maneras los puedo invitar a almorzar de a 3 durante 7 días, de modo que no haya 3 que se encuentren en mi casa dos veces?

347.

Si quiero tener 7 grupos diferentes de a 3 y no dejar a nadie sin invitar, esto se puede efectuar de $A_3^7 - 7A_3^6 + 21A_3^5$ formas.

348.

Si quiero tener 7 grupos distintos de a 3 y que no haya ningún amigo que venga cada día, esto se puede efectuar de $A_3^7 - 7A_3^6$ maneras.

349.

Demstrar que el número total de arreglos de $n \geq 2$ objetos (tomados de a 1, 2, ..., n) es el entero más próximo a $en! - 1$.

350.

Si se escriben todos estos arreglos, el número de veces que se encontrará cada objeto es el entero más próximo a $e(n-1)(n-1)!$.

351.

Se tira una moneda $2n$ veces. Demostrar que el número de variantes, en las cuales la cara no cayó en ningún momento con mayor frecuencia que la cruz, es igual a

$$1 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_n^{2n}.$$

352.

¿De cuántas formas se pueden distribuir $3n$ libros distintos entre tres personas, de modo que las cantidades de libros formen una progresión aritmética?

353.

Hay n pares, formados por letras iguales, con la particularidad de que pares distintos contienen distintas letras. Estas letras se ordenan de todas las formas posibles, de modo que no haya dos letras iguales juntas. Demostrar que el número de ordenamientos diferentes es igual a

$$\frac{1}{2^n} \left[(2n)! - \frac{n}{1} 2(2n-1)! + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} 2^2(2n-2)! - \dots \right].$$

354.

Hay r objetos distintos, los que se distribuyen entre $n+p$ personas, de forma que por lo menos n de ellas obtengan no menos de un objeto. Demostrar que el número de formas de distribución es igual a

$$(n+p)^r - n(n+p-1)^r + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} (n+p-2)^r - \dots$$

355.

Designemos mediante Π_k^n el número de maneras de dividir n objetos diferentes en k grupos. Demostrar que, para $n > 1$, será

$$1 - \Pi_2^n + 2! \Pi_3^n - 3! \Pi_4^n + \dots = 0.$$

356.

Hay m casillas, en la primera de las cuales se encuentran n objetos, en la segunda, $2n, \dots$, en la m -ésima, mn . ¿De cuántas maneras se pueden escoger n objetos de cada casilla?

357.

En una canasta hay $2n + r$ manzanas y $2n - r$ peras. Demostrar que, para un n dado, el número de elecciones de n manzanas y n peras será máximo para $r = 0$.

358.

1000 puntos son vértices de un polígono convexo de mil lados, dentro del cual hay otros 500 puntos, de forma que no haya tres de estos 1500 sobre una misma recta. El polígono dado se corta en triángulos, de manera que todos los 1500 puntos indicados sean vértices de triángulos, y que éstos no tengan otros vértices. ¿Cuántos triángulos se obtendrán en este corte?

359.

Cinco personas juegan varios partidos al dominó (dos contra dos), y cada jugador tiene a cada uno una vez como compañero, y dos veces como contrario. Hallar el número de partidos jugados y todas las formas de distribución de los jugadores.

360.

Desde el punto O del plano se trazan todas las quebradas cerradas de longitud $2n$, cuyos lados se hallan sobre las líneas de un papel cuadrículado con retículo de lado igual a 1. Hallar el número de estas quebradas, si cada una puede recorrer un mismo segmento varias veces.

361.

Sobre una hoja de papel se ha trazado una red de n rectas horizontales y n verticales. ¿Cuántas quebradas cerradas de $2n$ eslabones distintas se pueden trazar sobre las líneas de la red, de modo que cada una tenga segmentos en todas las rectas horizontales y en todas las verticales?

362.

Una fábrica produce sonajeros en forma de anillo con 3 bolitas rojas y 7 azules enhebradas en éste. ¿Cuántos sonajeros distintos se pueden producir (dos sonajeros se consideran iguales, si uno puede ser obtenido a partir del otro sólo desplazando las bolitas por el anillo o girándolo)?

363.

Se han reunido n personas. Algunas de ellas se conocen, y cada dos desconocidos tienen exacta

mente dos conocidos comunes, y cada dos conocidos no tienen conocidos comunes. Demostrar que cada presente conoce a un mismo número de personas.

364.

Sobre la circunferencia se han tomado varios puntos; algunos de ellos se han designado con la letra A , y otros, con la B . Sobre cada uno de los arcos en que la circunferencia se divide por los puntos tomados, efectuamos lo siguiente: si ambos puntos extremos están denotados por letras A , escribimos el número 2; si ambos extremos están denotados por B , escribimos $1/2$; si éstos están denotados por letras distintas, escribimos el número 1. Demostrar que el producto de todos los números escritos es igual a 2^{a-b} , donde a es el número de puntos denotados por la letra A , y b , el de los denotados por la B .

365.

Las filas horizontales de un tablero de ajedrez se designan, como es usual, por las cifras del 1 al 8, y las verticales, por las letras de la a a la h . Sean ahora a, b, c, d, e, f, g, h números arbitrarios. Escribamos en cada casilla del tablero el producto de los números que designan la horizontal y la vertical respectivas, y dispongamos 8 torres de modo que no puedan comerse una a la otra. ¿A qué es igual el producto de los números ocultos?

366.

El Comité de Organización de una olimpiada está formado por 11 personas. Los materiales de la olimpiada se conservan en una caja fuerte. ¿Cuántas cerraduras debe tener ésta, y cuántas llaves hay que entregar a cada miembro del Comité, para que sea posible abrir la caja cuando se reúnan 6 miembros cualesquiera del Comité, y sea imposible si se reúnen menos de 6?

367.

Hay un trozo de cadena de 60 eslabones. Cada eslabón pesa 1 g. ¿Cuál es el mínimo número de eslabones que hay que abrir para que sea posible obtener, mediante los eslabones abiertos y los trozos restantes, un peso cualquiera, que se exprese con un número entero del 1 al 60? Resuélvase el mismo problema, si para el pesado se puede utilizar una balanza de dos platillos.

368.

¿Cuántos pares existen de números enteros x e y , comprendidos entre 1 y 1000, tales que $x^2 + y^2$ se divida por 49?

369.

¿Cuántos números de dos cifras dan un cuadrado perfecto sumados al número escrito con las mismas cifras, pero en orden inverso?

370.

Hallar la suma de todos los números de cuatro cifras, formados por las cifras del 1 al 6 y que se dividan por 3.

371.

Hallar la suma de todos los números pares de cuatro cifras, que se pueden formar con las cifras del 0 al 5.

372.

¿Cuántas soluciones enteras diferentes tiene la desigualdad $|x| + |y| \leq 1000$?

373.

Sobre una circunferencia se han fijado los puntos A_1, A_2, \dots, A_{10} . Formemos todos los polígonos convexos posibles, cuyos vértices se hallen entre los puntos A_1, A_2, \dots, A_{10} . Dividamos estos polígonos en dos grupos. Al primero referimos todos los polígonos que tengan el punto A_1 como uno de sus vértices, y al segundo, todos los demás. ¿En qué grupo habrá más polígonos?

374.

Sobre un tablero de ajedrez infinito se halla un caballo. Hallar el número de casillas en las que puede hallarse al cabo de $2n$ jugadas.

375.

Hay 1955 puntos. ¿Cuál es el máximo número de ternas de puntos que se pueden escoger entre ellos, de modo que cada par de ternas tenga un punto común?

376.

Los números del 1 al 100 000 000 han sido escritos en fila, de modo que se obtuvo la sucesión de cifras 123 456 . . . 100 000 000. Demostrar que el número de todas las cifras de esta sucesión es igual al de ceros en la sucesión 1, 2, 3, . . . , 10^9 .

377.

¿Cuántos números de cuatro cifras existen, del 0001 al 9999, para los cuales la suma de las dos primeras cifras sea igual a la de las dos últimas?

378.

En la escuela se estudian $2n$ disciplinas. Todos los alumnos obtienen calificaciones de 4 y 5. No hay dos que estudien igual, ni tampoco hay dos sobre los que se pueda decir que uno estudia mejor que el otro. Demostrar que el número de alumnos en la escuela no es mayor que C_{2n}^{2n} (consideramos que un alumno estudia mejor que otro, si en todas las disciplinas sus notas no son peores que las del segundo, y en algunas son mejores).

379.

Sea M_r el número de arreglos sin repetición de m elementos tomados de a, r , y N_r , el de arreglos sin repetición de n elementos tomados de a, r . Demostrar que el número de arreglos de $m+n$ elementos tomados de a, r se expresa mediante la fórmula $(M+N)^r$, donde, después de elevar a la potencia indicada, hay que sustituir todos los exponentes por subíndices.

380.

Hallar el coeficiente de x^8 en el desarrollo de $(1+x^2-x^3)^9$.

381.

Hallar el coeficiente de x^m en el desarrollo de

$$(1+x)^k + (1+x)^{k+1} + \dots + (1+x)^n$$

en potencias de x . Analizar por separado los casos $m < k$, $m \geq k$.

382.

Hallar los coeficientes de x^{17} y x^{18} después de abrir paréntesis y agrupar los términos semejantes en la expresión $(1+x^2+x^2)^{20}$.

383.

¿En cuál de las expresiones, $(1+x^2-x^2)^{1000}$ ó $(1-x^2+x^2)^{1000}$, después de abrir paréntesis y agrupar los términos semejantes, x^{17} tendrá un coeficiente mayor?

384.

Sean a_0, a_1, a_2, \dots los coeficientes del desarrollo de $(1+x+x^2)^n$ en potencias crecientes de x . Demostrar que

$$a) a_0 a_1 - a_1 a_2 + a_2 a_3 - \dots - a_{2n-1} a_{2n} = 0,$$

$$b) a_0^2 - a_1^2 + a_2^2 - \dots + (-1)^{n-1} a_{n-1}^2 = \frac{1}{2} a_n + \frac{1}{2} (-1)^{n-1} a_n^2,$$

$$c) a_r - n a_{r-1} + C_2^n a_{r-2} - \dots + (-1)^r C_r^n a_0 = 0, \text{ si } r \text{ no}$$

es múltiplo de 3.

$$d) a_0 + a_2 + a_4 + \dots = \frac{1}{2} (3^n + 1),$$

$$a_1 + a_3 + a_5 + \dots = \frac{1}{2} (3^n - 1).$$

385.

Hallar el número de términos diferentes (no semejantes entre sí) del desarrollo de

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^3,$$

que se obtiene después de elevar a la potencia indicada.

386. Hallar el coeficiente de x^h en el desarrollo de $(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})^2$.

387.

Demostrar que

$$\frac{[C_{r+1}^{n+1} - C_r^n] C_{r-1}^{n-1}}{(C_r^n)^2 - C_{r+1}^{n+1} C_{r-1}^{n-1}} = r.$$

388.

Demostrar que

$$C_1^n + 6C_2^n + 6C_3^n = n^2,$$

$$1 + 7C_1^n + 12C_2^n + 6C_3^n = (n+1)^2.$$

389.

Demostrar que

$$1 + 14C_1^n + 36C_2^n + 24C_3^n = (n+1)^4 - n^4,$$

$$C_1^n + 14C_2^n + 36C_3^n + 24C_4^n = n^4.$$

390.

Demostrar que

$$1 - 3C_2^n + 9C_4^n - 27C_6^n + \dots = (-1)^n 2^n \cos \frac{2n\pi}{3},$$

$$C_1^n - 3C_3^n + 9C_5^n - \dots = \frac{(-1)^{n+1} 2^{n+1}}{\sqrt{3}} \operatorname{sen} \frac{2n\pi}{3}.$$

391.

Demostrar que

$$a) C_0^n + C_3^n + C_6^n + \dots = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3} \right),$$

$$b) C_1^n + C_4^n + C_7^n + \dots = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{(n-2)\pi}{3} \right),$$

$$c) C_2^n + C_5^n + C_8^n + \dots = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{(n+2)\pi}{3} \right),$$

$$d) C_0^n + C_4^n + C_8^n + \dots = \frac{1}{2} \left(2^{n-1} + 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4} \right).$$

392.

Demostrar que, para $n \geq 2$ y $|x| < 1$, se tendrá $(1+x)^n + (1-x)^n \leq 2^n$.

393.

Demostrar que, para $m > n$,

$$\sum_{x=0}^n \frac{n(n-1)\dots(n-x+1)}{m(m-1)\dots(m-x+1)} = \frac{m+1}{m-n+1}$$

y

$$\sum_{x=0}^n \frac{C_x^n C_r^n}{C_{x+r}^{2n}} = \frac{2n+1}{n+1}.$$

394.

Demostrar que

$$\frac{m}{1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} + \dots$$

$$+ \dots + \frac{m(m+1)\dots(m+n-1)}{1 \cdot 2 \dots n}$$

$$= \frac{n}{1} + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{n(n+1)\dots(n+m+1)}{1 \cdot 2 \dots m}.$$

395.

Demostrar que

$$\sum_{x=1}^n \frac{C_{x-1}^{n-1}}{C_x^{2n-1}} = \frac{2}{n+1}.$$

396.

Demostrar que

$$\sum_{x=1}^n \frac{C_{x-1}^{n-1}}{C_x^{n+q}} = \frac{n+q+1}{(q+1)(q+2)}.$$

397.

Demostrar que

$$\sum_{x=1}^n \frac{C_{x-2}^{n-2}}{C_x^{n+q}} = \frac{2(n+q+1)}{(q+1)(q+2)(q-3)}.$$

398.

Demostrar que

$$(C_1^n)^2 + 2(C_2^n)^2 + 3(C_3^n)^2 + \dots \\ \dots + n(C_n^n)^2 = \frac{(2n-1)!}{[(n-1)!]^2}.$$

399.

Demostrar la identidad

$$\frac{1}{[(n-1)!]^2} + \frac{1}{1!2! [(n-2)!]^2} + \dots \\ + \frac{1}{2!3! [(n-3)!]^2} + \dots = \frac{(2n-1)!}{[n!(n-1)!]^2}.$$

400.

Demostrar que

$$\frac{(n+r-1)!}{r!} \frac{1}{1} \frac{(n+r-3)!}{(r-2)!} \\ \dots = \frac{n!(n-1)!}{1 \cdot 2 \dots (r-4)!} \dots = \frac{n!(n-1)!}{r!(n-r)!}.$$

401.

Calcular las siguientes sumas:

a) $C_1^n + 2C_2^n + 3C_3^n + \dots + nC_n^n$

b) $C_0^n + 2C_1^n + 3C_2^n + \dots + (n+1)C_n^n$

c) $C_2^n + 2C_3^n + 3C_4^n + \dots + (n-1)C_n^n$

d) $C_0^n + 3C_1^n + 5C_2^n + \dots + (2n-1)C_n^n$

e) $C_0^n - 2C_1^n + 3C_2^n - \dots + (-1)^n(n+1)C_n^n$

f) $3C_1^n + 7C_2^n + 11C_3^n + \dots + (4n-1)C_n^n$

g) $C_1^n - 2C_2^n + 3C_3^n - \dots + (-1)^{n-1}nC_n^n$

h) $\frac{C_0^n}{1} + \frac{C_1^n}{2} + \frac{C_2^n}{3} + \dots + \frac{C_n^n}{n+1}$

i) $\frac{C_0^n}{2} + \frac{C_1^n}{3} + \frac{C_2^n}{4} + \dots + \frac{C_n^n}{n+2}$

j) $\frac{C_0^n}{1} - \frac{C_1^n}{2} + \frac{C_2^n}{3} - \dots + (-1)^n \frac{C_n^n}{n+1}$

k) $(C_0^n)^2 - (C_1^n)^2 + (C_2^n)^2 - \dots + (-1)^n (C_n^n)^2$

402.

Hallar el mayor coeficiente de los desarrollos de $(a+b+c)^{10}$, $(a+b+c+d)^{14}$.

403.

Sean Y_n los coeficientes del desarrollo de la función $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ en serie de potencias:

$$(1-4x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + Y_1x + Y_2x^2 + \dots$$

Expreséense Y_n mediante los coeficientes binómicos. Hallar el desarrollo de $(1-4x)^{\frac{1}{2}}$.

404.

demostrar que los números Y_n satisfacen a las relaciones:

$$a) Y_n + \frac{1}{2} Y_1 Y_{n-1} + \frac{1}{3} Y_2 Y_{n-2} + \dots \\ \dots + \frac{1}{n+1} Y_n = \frac{1}{2} Y_{n+1}$$

415.

HAY $pq + r$ objetos diferentes, siendo $0 \leq r < p$. Estos se distribuyen entre p personas de la forma más equitativa posible (todos obtienen o bien q , o bien $q + 1$ objetos). Demostrar que el número de maneras de esta distribución es igual a

$$C_r^p \frac{(pq+r)!}{(q+1)^r (q!)^p}.$$

416.

Calcular la suma

$$\sum_{i_1=1}^m \sum_{i_2=1}^{i_1} \dots \sum_{i_{n-1}=1}^{i_{n-2}} \sum_{i_n=1}^{i_{n-1}} 1.$$

417.

Demostrar la identidad

$$C_m^{n+m} = \sum P(k_1, \dots, k_m, n-k_1 - \dots - k_m + 1),$$

donde la suma se extiende a todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación $k_1 + 2k_2 + \dots + mk_m = m$.

418.

Hallar la solución general de las siguientes relaciones de recurrencia:

- $a_{n+2} - 7a_{n+1} + 12a_n = 0$,
- $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 10a_n = 0$,
- $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 13a_n = 0$,
- $a_{n+2} + 9a_n = 0$,
- $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 0$,
- $a_{n+3} - 9a_{n+2} + 26a_{n+1} - 24a_n = 0$,
- $a_{n+3} + 3a_{n+2} + 3a_{n+1} + a_n = 0$,
- $a_{n+4} + 4a_n = 0$.

419.

Hallar a_n , conociendo la relación de recurrencia y los términos iniciales:

- $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = -7$,
- $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$, $a_1 = 2$, $a_2 = 4$,
- $a_{n+2} + a_{n+1} + a_n = 0$, $a_1 = -\frac{1}{4}$, $a_2 = -\frac{1}{2}$,
- $a_{n+3} - 9a_{n+2} + 26a_{n+1} - 24a_n = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = -3$, $a_3 = -29$.

11-1194

420.

Hallar una sucesión tal que $a_1 = \cos \alpha$, $a_2 = \cos 2\alpha$ y

$$a_{n+2} - 2 \cos \alpha a_{n+1} + a_n = 0.$$

421.

Demostrar que la sucesión de término común $a_n = n^h$ satisface a la relación

$$a_{n+h} - C_1^h a_{n+h-1} + C_2^h a_{n+h-2} - \dots \\ \dots + (-1)^h C_h^h a_n = 0.$$

422.

Hallar una sucesión tal que

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} - 8a_n = 2^n.$$

423.

A partir de la identidad $(1+x)^p (1+x)^{-h-1} = (1+x)^{p-h-1}$ dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^p (-1)^s C_s^h C_{p-s}^p = C_n^{p-h-1}.$$

424.

A partir de la identidad $(1-x)^{-m-1} (1-x)^{-q-1} = (1-x)^{-m-q-2}$, dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^m C_m^s C_q^{q-s} = C_{p-m}^{p+q+1}.$$

425.

A partir de la identidad $(1+x)^n = (1-x^2)^{-n} \times (1-x)^{-n}$ dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^n (-1)^s C_n^{n-h-2s} C_s^{n+1} = C_h^{n+1}.$$

426.

A partir de la identidad $(1+x)^n (1-x^2)^{-n} = (1-x)^{-n}$, dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^n C_{h-2s}^n C_s^{n+s-1} = C_h^{n+h-1}.$$

¹ Aquí y en lo sucesivo la suma se extiende por los valores enteros no negativos de s , para los cuales esté definido el primer miembro de la igualdad.

427.

A partir de la identidad $(1-x^2)^{-p-1} = (1+x)^{-p-1}(1-x)^{-p-1}$, dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_p^{p+2k-s} C_p^{p+s} = C_k^{p+k}.$$

428.

A partir de las identidades

$$(1-x)^{-2p} \left[1 - \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \right]^{-p} = (1-2x)^{-p}$$

y

$$(1-x)^{2p} \left[1 - \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \right]^p = (1-2x)^p$$

dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^{\infty} C_s^{p+s} C_{2p+2s+1}^{2p+m} = 2^{m-1} C_p^{m+p-1}$$

y que

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_s^{p+s} C_{2m-2s}^{2p-2s} = 2^p C_m^p.$$

429.

Mostrar que

$$\sum_{s=0}^{\infty} C_s^{p+s} C_{2p+2s}^{2p+m} = 2^{m-1} \frac{2p+m}{m} C_p^{m+p-1}.$$

430.

A partir de las identidades

$$(1-x)^{\pm 2p} \left[1 + \frac{2x}{(1-x)^2} \right]^{\pm p} = (1+x^2)^{\pm p}$$

dedúzcase las fórmulas

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_s^{p+s-1} C_{2m+1-2s}^{2m+2p+s-2s} = 0,$$

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_s^{p+s-1} C_{2m-2s}^{2m+2p+s-1-2s} =$$

$$= (-1)^m C_m^{p+m-1},$$

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_s^{p+s-2s} C_{2m+1-2s}^{2p-2s} = 0,$$

$$\sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s C_s^{p+s-2s} C_{2m-2s}^{2p-2s} = C_m^p.$$

A partir de éstas, demuéstrese que

$$\sum_{s=0}^{\infty} C_{2s}^{2p+2m} C_p^{p+m-s} = 2^{2m} (p+m) \frac{(p+2m-1)!}{p!(2m)!},$$

$$\sum_{s=0}^{\infty} C_{2s+1}^{2p+2m+1} C_p^{p+m-s} =$$

$$= 2^{2m} (2p+2m+1) \frac{(p+2m)!}{p!(2m+1)!},$$

$$\sum_{s=1}^{\infty} C_{2s-1}^{2p+2m} C_p^{p+m-s} = 2^{2m-1} C_p^{p+2m-1},$$

$$\sum_{s=0}^{\infty} C_{2s}^{2p+2m+1} C_p^{p+m-s} = 2^{2m} C_p^{p+2m}.$$

431.

Considerando las fórmulas

$$[(1+x)^p \pm (1-x)^p]^2 = (1+x)^{2p} + (1-x)^{2p} \pm 2(1-x^2)^p,$$

$$[(1+x)^p + (1-x)^p] [(1+x)^p - (1-x)^p] = (1+x)^{2p} - (1-x)^{2p}$$

para valores positivos y negativos de p , demostrar que

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_{2s}^p C_{2m-2s}^{2p} = C_{2m}^{2p} + (-1)^m C_m^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_{2s+1}^p C_{2m-2s+1}^{2p} = C_{2m+2}^{2p} + (-1)^m C_{m+1}^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_{2s}^p C_{2m-2s+1}^{2p} = C_{2m+1}^{2p},$$

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_p^{p+2s} C_p^{2p+2m-2s} = C_{2p+1}^{2p+2m+1} + C_p^{p+m},$$

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_{p-1}^{p+2s} C_{p-1}^{2p+2m-2s} = C_{2p-1}^{2p+2m+1} - C_p^{p+m},$$

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_p^{p+2s} C_p^{2p+2m-2s+1} = C_{2p+1}^{2p+2m+2}.$$

432.

Considerando la expresión

$[(1+x)^{p+1} \pm (1-x)^{p+1}] [(1+x)^p \pm (1-x)^p]$
para todas las combinaciones de los signos,
dedúzcase las fórmulas

$$2 \sum_{s=0}^{\infty} C_{2s}^{p+1} C_{2m-2s}^{2p} = C_{2m}^{2p+1} + (-1)^m C_m^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s+1}^{2p+1} C_{2m-2s+1}^p = C_{2m+1}^{2p+1} - (-1)^m C_m^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s+1}^{2p+1} C_{2m-2s}^p = C_{2m+1}^{2p+1} + (-1)^m C_m^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s+1}^{2p+1} C_{2m-2s+i}^p = C_{2m+2}^{2p+1} + (-1)^m C_{m+i}^p,$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s-1}^{2p+2s-1} C_p^{2m-2s} = C_{2p}^{2p+2m} + C_p^{p+m},$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s-1}^{2p+2s-1} C_p^{2m-2s+1} = C_{2p}^{2p+2m+1} + C_p^{p+m},$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s-1}^{2p+2s} C_p^{2m-2s} = C_{2p}^{2p+2m+1} - C_p^{p+m},$$

$$2 \sum_{s=0}^i C_{2s-1}^{2p+2s} C_p^{2m-2s+1} = C_{2p}^{2p+2m+2} - C_p^{p+m+1}.$$

433.

A partir de la relación

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^m (1-x)^{-n-1} = \frac{(-1)^m}{x^m} (1-x)^{m-n-1}$$

dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_{m-k+s}^m C_n^{n+s} = C_k^{m-n-1}.$$

434.

Demuéstrese que

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_s^m C_n^s = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n, \\ (-1)^n, & \text{si } m = n. \end{cases}$$

435.

A partir de la igualdad

$$(1-x)^{-n} (1-x^h)^n = (1+x+\dots+x^{h-1})^n,$$

dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_{n-1}^{m-sh} C_s^n = \begin{cases} 0, & \text{si } m > hn-1, \\ 1, & \text{si } m = hn-1. \end{cases}$$

436.

A partir de la identidad

$$(1-x)^{-n-1} (1-x^h)^n = \frac{(1+x+\dots+x^{h-1})^n}{1-x},$$

dedúzcase que, para $m > hn$,

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_{n-sh}^m C_s^n = h^n.$$

437.

A partir de la identidad

$$(1+x)^{\pm p} (1-x)^{\pm p} = (1-x^2)^{\pm p}$$

dedúzcase que

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_{p-s}^m C_s^p =$$

$$= \begin{cases} (-1)^{\frac{m}{2}} C_{\frac{m}{2}}^p, & \text{si } m \text{ es par,} \\ 0, & \text{si } m \text{ es impar,} \end{cases}$$

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_{p+m-s}^m C_p^{p+s} =$$

$$= \begin{cases} (-1)^{\frac{m}{2}} C_{\frac{m}{2}}^{p+\frac{m}{2}}, & \text{si } m \text{ es par} \\ 0, & \text{si } m \text{ es impar.} \end{cases}$$

438.

Demostrar que

$$\sum_{s=0}^i (-1)^s C_s^m C_s^m = \begin{cases} (-1)^{\frac{m}{2}} C_{\frac{m}{2}}^m, & \text{si } m \text{ es par.} \\ 0, & \text{si } m \text{ es impar.} \end{cases}$$

439.

Designemos la expresión

$$a(a+1)(a+2)\dots(a+n-1)$$

mediante $(a)_n$. Demostrar que

$$(a+b)_m = \sum_{m=0}^n C_m^n (a+m)_{n-m} (b-m+1)_m.$$

SOLUCIONES Y RESPUESTAS

1.

En virtud de la regla del producto, se obtienen $5 \cdot 3 = 15$ caminos.

2.

En virtud de la misma regla, tendremos $100^2 = 10\,000$ formas de elección.

3.

20.

4.

8.

5.

9.

6.

48.

7.

25; 20.

8.

480; 437.

9.

1024; 4032.

10.

El cuadrado blanco lo escogemos de 32 maneras y tachamos la horizontal y vertical correspondientes. En la parte restante del tablero hay 24 cuadrados negros. En total hay $32 \cdot 24 = 768$ formas de elección.

11.

En virtud de la regla del producto, hay $12 \cdot g \cdot 10 = 1080$ formas.

12.

$6 \cdot 5 = 30$ maneras.

13.

$3 \cdot 7 \cdot 7 = 147$.

14.

Se puede comprar o un ejemplar de cada novela, o un tomo que contenga dos novelas y un ejemplar

de la tercera. Según las reglas de la suma y del producto, se obtienen $6 \cdot 3 \cdot 4 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 6 = 134$ modos.

15.

Se puede comprar además un tomo que contenga las novelas «Rudina» y «Padres e Hijos» y un ejemplar del «Nido de Hidalgos». Se agregan $3 \cdot 3 = 9$ formas, obteniéndose en total 143.

16.

Habrá mayor cantidad de elecciones si fue escogida una manzana, pues $11 \cdot 10 > 12 \cdot 9$.

17.

$6 \cdot 8 \cdot 10 = 480$; si los dos primeros trompos cayeron sobre el lado «1», el tercero puede caer de 10 maneras; análogamente se consideran los casos en que sobre este lado caen los otros dos trompos; en total, se obtienen $6 + 8 + 10$ formas, pero aquí una de ellas (cuando sobre el lado «1» caen los tres trompos) se considera tres veces; por esto, quedan 22 maneras.

18.

Como el orden de las pinturas no tiene importancia, se da $C_3^3 = 10$ maneras.

19.

Aquí ya el orden de las pinturas tiene importancia; por esto, tendremos $A_3^3 = 60$ formas. Si una franja es roja, tendremos $3 \cdot A_2^2 = 36$ maneras.

20.

$A_2^2 = 20$ diccionarios.

21.

$A_2^{10} - A_2^2 = 70$.

22.

Se obtienen arreglos con repetición de 13 cartas tomadas de a 4. En total, habrá $13^4 = 28\,561$ maneras. Si entre las cartas no debe haber pares, tendremos arreglos sin repetición; el número de éstos es igual a $A_4^{13} = 17\,160$.

23.

Como es suficiente escoger una carta negra y una roja, obtendremos $13^2 = 169$ maneras de elección.

24.

Un niño puede obtener uno, dos o tres nombres, siendo todos ellos distintos. En total habrá $300 + 300 \cdot 299 + 300 \cdot 299 \cdot 298 = 26\ 820\ 600$ nombres distintos.

25.

La relación de vecindad se conserva en las permutaciones cíclicas y en caso de una simetría. En el caso de 4 personas, tendremos $2 \cdot 4 = 8$ transformaciones que conserven la relación de vecindad. Como el número total de permutaciones de 4 personas es igual a $4! = 24$, tendremos $24/8 = 3$ formas distintas de sentarse. Si hay 7 personas alrededor de la mesa, tendremos $7!/14 = = 360$ modos y, en general, en el caso de n personas, $(n-1)!/2$ formas. El número de maneras en las que 2 personas dadas se hallen juntas, es dos veces mayor que el de sentar a 6 personas (en virtud de la posibilidad de cambiar de lugar estas personas). Por lo tanto, éste es igual a $5! = = 120$. Análogamente, el número de formas en las que una persona dada tendrá dos vecinos determinados, es igual a $4! = 24$.

26.

En un equipo juega un muchacho, y en el otro, dos. Estos se pueden dividir en equipos de 3 maneras. Después de esto, hay que escoger, para el primer equipo, 3 muchachas de entre 5. Esto se puede efectuar de $C_3^5 = 10$ maneras. En total se obtienen, según la regla del producto, $3 \cdot 10 = = 30$ modos de dividir en equipos.

27.

El número de formas de dividir n objetos diferentes en k grupos es igual a k^n . En nuestro caso, tendremos $3^4 = 729$ maneras.

28.

En virtud de la regla del producto, esto es posible de $7 \cdot 9 = 63$ maneras.

29.

El primero puede escoger los libros para el intercambio de $C_3^4 = 24$ modos, y el segundo, de $C_3^3 = 36$. En total habrá $24 \cdot 36 = 756$ formas de intercambio.

30.

Dividamos todos los modos de ordenar a los oradores en pares, formados por los métodos

que se obtienen uno del otro permutando A y B. En cada par hay sólo una manera que satisface la condición planteada. Por esto, tendremos $5!/2 = 60$ maneras.

31.

Si A interviene inmediatamente antes que B, podemos considerarlos como si fuesen un solo orador. Por esto, tendremos $4! = 24$ formas.

32.

La elección de los lugares para las mujeres y para los hombres se puede efectuar de dos maneras. Después de esto, se puede sentar a los hombres en los lugares escogidos de 51 modos. Otros tantos hay de sentar a las mujeres. En total, obtenemos $2(51)^2 = 28\ 800$ maneras.

33.

Obtenemos 10 veces menos formas que en el problema precedente, es decir, 2880.

34.

El número total de maneras de extraer 10 cartas es igual a C_{10}^{52} . El de formas en las que no se escoge ningún as, es C_{48}^{52} . Por esto, por lo menos un as habrá en $C_{52}^{52} - C_{48}^{52}$ casos. Exactamente un as habrá en $C_1^1 C_{48}^{51}$ casos; no menos de dos ases, en $C_2^2 - C_0^2 - 4C_1^1$, y exactamente dos ases, en $C_2^2 C_{48}^{50}$ (se escogen dos ases de C_2^2 formas, y otras 8 cartas, de entre 48, de C_{48}^{50}).

35.

3^{ra} señales (véase el problema 27).

36.

Cifremos cada juego de dientes mediante una sucesión de ceros y unidades (se coloca un cero si en el lugar dado no hay diente, y una unidad si lo hay). El número de estas sucesiones es igual a 2^{32} . Como a cada habitante le corresponde su sucesión, el número de éstos no es mayor que 2^{32} .

37.

Primeramente escogemos cuál de los tres pasajeros, a los que les da lo mismo cómo sentarse, lo hará cara a la locomotora. Esta elección se puede efectuar de 3 maneras. En cada banco se puede sentar a los pasajeros de 51 formas. En total, obtenemos $3(51)^2 = 43\ 200$ formas.

38.

$$A_4^4 = 3024.$$

39.

$$C_8^2 = 2\,598\,960.$$

40.

Hay $32 \cdot 10^4$ números que contienen una letra; $32^2 \cdot 10^4$ que contienen dos, y $32^3 \cdot 10^4$ que contienen tres. En total, según la regla de la suma, habrá $33\,820 \cdot 10^4$ números.

41.

De cinco días hay que escoger dos en los que se den las manzanas. En total, hay $C_5^2 = 10$ formas.

42.

$$C_{m+n}^m,$$

43.

$$P(2, 3, 4) = 1260.$$

44.

Como las naranjas son distintas, tendremos $A_8^8 = 6720$ modos.

45.

Cada naranja puede quedar en manos de cualquiera de los 8 hijos. Por esto, tendremos $8^6 = 32\,768$ maneras.

46.

$$P(4, 3, 3, 2, 1, 1); P(3, 4, 1, 1, 1, 1); P(2, 2, 2, 1, 1, 1).$$

47.

$$C_7^3 = 27\,405; A_7^3 = 657\,720.$$

48.

$$P(2, 2, 2, 1, 1) = 5040.$$

49.

Primeramente se eligen 6 abonados de C_7^6 maneras. Dispongamós estos abonados en cualquier orden, y divídamoslos en pares (el primero y el segundo, después el tercero y el cuarto y, por fin, el quinto y el sexto). Esto se puede efectuar de 6! formas. Como los abonados se pueden permutar dentro de cada par, y como no tiene importancia el orden

de los pares, el número total de modos debe ser dividido por $2^3 \cdot 3! = 48$.

En total, obtenemos $\frac{n!}{48(n-6)!}$ maneras.

50.

$$\overline{C}_{12}^{12} = C_{12}^{21}; \overline{C}_3^3 = C_3^{12}; C_3^0.$$

51.

Se pueden escoger dos, tres o cuatro mujeres. Dos de ellas se pueden elegir de C_4^2 formas. Después de esto, hay que escoger 4 hombres, lo cual puede efectuarse de C_4^1 maneras. En virtud de la regla del producto, obtenemos $C_4^2 C_4^1$ formas. Si se eligen tres mujeres, se obtienen $C_4^3 C_4^1$ maneras, y si son cuatro, $C_4^4 C_4^1$. En total, hay $C_4^2 C_4^1 + C_4^3 C_4^1 + C_4^4 C_4^1 = 271$ modos.

52.

El número debe terminar en una de las cinco combinaciones siguientes: 12, 24, 32, 44, 52; las primeras dos cifras, en cambio, pueden ser arbitrarias. En total, se obtienen $5^2 \cdot 5 = 125$ números.

53.

Cada uno de los n pasajeros puede escoger cualquiera de las m paradas. Por esto, tendremos m^n modos de distribución. Si se tiene en cuenta sólo la cantidad de pasajeros que se bajaron en cada parada, se obtienen C_{m-1}^{m-1} formas.

54.

Si a y b se hallan juntos, podemos unirlos en un solo símbolo. Teniendo en cuenta que a y b se pueden cambiar de lugar, se obtienen $2(n-1)!$ permutaciones en las que a y b están juntos. Por esto, no lo estarán en $n! - 2(n-1)!$ permutaciones. Análogamente se obtiene, que a , b y c no estarán juntos en $n! - 6(n-2)!$ permutaciones. No habrá ningún par de elementos a , b , c juntos en $n! - 6(n-1)! + 6(n-2)!$ permutaciones (según la fórmula de inclusiones y exclusiones).

55.

Tres jueces pueden escoger al vencedor de 10^3 maneras. En $A_3^3 = 720$ casos nombrarán a tres candidatos distintos. Por esto, la coincidencia de dos jueces, por lo menos, tendrá lugar en 280 casos. La parte de estos casos es igual a 0,28.

56.

Como cada estudiante puede obtener tres tipos de calificación, tendremos $3^4 = 81$ maneras de rendir los exámenes.

57.

Como los collares no cambian para permutaciones cíclicas de las cuentas y al rebatirlos, se pueden

formar $\frac{7!}{14} = 360$ tipos de collares.

58.

Los tipos de collares se diferencian entre sí en el número de cuentas pequeñas, contenidas entre dos grandes. Por esto, tendremos tres tipos de collares.

59.

En el alfabeto ruso hay 33 letras, pero por lo monos por cuatro de ellas, Ъ, Ь, Ъ, Ъ, no comienza ningún nombre. Por esto, el número total de iniciales diferentes no es mayor que $29^4 = 841$, lo cual es menor que 2000.

60.

$A_1^{10} = 604\ 800$; $C_2^{10} = 120$. Si dos muchachas serán invitadas con seguridad a bailar, tendremos A_2^3 variantes de elección de sus compañeros; los 5 muchachos restantes escogen a su compañera de entre 8 chicas, lo cual puede ser efectuado de A_8^5 maneras: en total, tendremos $A_1^4 A_2^3 = 282\ 240$ formas. Por último, si dos chicas determinadas son invitadas a bailar, las otras cinco se pueden elegir de C_5^2 modos.

61.

El oficial puede elegirse de C_7^3 maneras, los sargentos, de C_2^2 , y los soldados rasos, de C_{20}^{20} . En total se obtienen, en virtud de la regla del producto, $C_7^3 C_2^2 C_{20}^{20}$ formas de elección. Si en el destacamento debe figurar el comandante de la compañía y el mayor de los sargentos, se obtienen $C_7^2 C_{20}^2$ modos de elección.

62.

Cuatro chicas pueden ser elegidas de C_4^3 maneras. Después de esto, elegimos de A_4^3 modos a los muchachos (aquí ya tiene importancia el orden). En total, se obtienen $C_4^3 A_4^3 = 17\ 417\ 400$ formas.

63.

Cada gallina puede figurar o no entre las elegidas. Por esto, hay 2^3 formas de elección de gallinas. Como, por hipótesis, debe ser escogida por lo menos una gallina, obtenemos 7 formas de elección de éstas. Análogamente, hay $2^4 - 1 = 15$ maneras de elección de los patos y $2^2 - 1 = 3$ de elección de los gansos. En total hay $7 \cdot 15 \cdot 3 = 315$ modos.

64.

Este número es igual a $P(m, n, p) = \frac{(m+n+p)!}{m! n! p!}$.

65.

Los libros encuadernados en negro se pueden permutar de $m!$ maneras, y los que lo están en rojo, de $n!$. En total, hay, según la regla del producto, $m! n!$ formas. Si los libros encuadernados en negro están juntos, hay que elegir además para éstos el lugar entre los encuadernados en rojo, cosa que puede efectuarse de $n+1$ modos. En total, obtenemos $m! n! (n+1)! = m! (n+1)!$ formas.

66.

Cada una de las 15 personas puede figurar o no en el grupo. Como éste no puede ser vacío, obtenemos $2^{15} - 1 = 32\ 767$ maneras. Para n personas habrá $2^n - 1$ formas.

67. El número p_k puede figurar en el divisor α dado con índices $0, 1, \dots, \alpha_k$; en total, de $\alpha_k + 1$ maneras. En virtud de la regla del producto, el número de divisores es igual a $(\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1)$. Para hallar la suma de los divisores, consideremos la expresión

$$(1 + p_1 + \dots + p_1^{\alpha_1}) \dots (1 + p_n + \dots + p_n^{\alpha_n}).$$

Si se abren paréntesis en ésta, obtendremos una suma, en la que cada divisor figurará exactamente una vez. Según la fórmula de la suma de una progresión geométrica, obtenemos que esta suma es igual a

$$\frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_n^{\alpha_n+1} - 1}{p_n - 1}.$$

68.

Coloquemos primero en cada paquete una moneda de 50 kopeks. Después, habrá que distribuir en los 5 paquetes 7 monedas restantes. Esto se puede efectuar de $C_4^7 = 330$ maneras (véase la pág. 132).

69.

Agreguemos a los 20 libros 4 objetos de separación iguales, y consideremos todas las permutaciones de los objetos obtenidos. El número de éstas es igual a $24!/4!$. A cada permutación le corresponde su forma de distribución de los libros.

70.

En forma análoga al problema anterior, se obtiene que el número de maneras es igual a $8!/3! = 6720$.

71.

Como se toma en consideración sólo el número de votos, que obtuvo cada moción, hay que distribuir 30 «objetos» iguales en 5 «cajones». Para esto, agreguemos 4 objetos de separación iguales, y tomemos todas las permutaciones de los objetos obtenidos. El número de éstas es igual a $P(30, 4) = 46\ 376$. A cada permutación le corresponde su distribución de votos.

72.

12 libros se pueden encuadernar en 3 colores de 3^{12} modos. De ellos, en $3 \cdot 2^{12}$ casos los libros estarán encuadernados en no más de dos colores, y en 3 casos en un solo color. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, en $3^{12} - 3 \cdot 2^{12} + 3 = 519\ 156$ casos los libros estarán encuadernados en tapas de los tres colores.

73.

Agreguemos a las 32 letras 5 «tabiques» iguales, y consideremos todas las permutaciones posibles de los objetos obtenidos, en las que no haya ningún tabique al principio o al final, ni haya dos tabiques juntos. Las letras se permutan de $32!$ maneras, y para los tabiques obtenemos 31 lugares, pudiéndolos colocar de C_{31}^5 modos. Teniendo en cuenta que el orden de las palabras no tiene importancia, se obtienen $32!C_{31}^5/5!$ maneras de formar las palabras.

74.

12 personas se pueden escoger de C_{12}^3 modos. En C_{12}^3 casos entre los elegidos figurarán dos personas dadas. Por esto, quedan $C_{12}^3 - C_{12}^2$ elecciones admisibles.

75.

Las piedras pueden ser permutadas de $P(5, 6, 7)$ maneras. En las permutaciones cíclicas y en las

simetrías, el brazaletе permanece invariable.

Obtenemos, por esto, $P(5, 6, 7)/36 = \frac{18!}{36 \cdot 5!6!7!}$ modos.

76.

Si todas las piedras escogidas son de un mismo tipo, tenemos 3 modos; si se han escogido dos tipos de piedras, $2C_7^2 = 6$ modos, y si las tres piedras son diferentes, 1 modo. En total hay 10 formas.

77.

Las tazas se pueden distribuir de A_4^3 formas; los platillos, de A_3^2 , y las cucharillas de té, de A_2^1 . En total se obtienen, en virtud de la regla del producto, $A_4^3 \cdot A_3^2 \cdot A_2^1 = 172\ 800$ maneras.

78.

Si el marido invita a k mujeres, el número de hombres que éste invita es igual a $6 - k$. Entonces la esposa invitará a $6 - k$ mujeres y k hombres. Según las reglas de la suma y del producto, esta

$$\text{elección se puede efectuar de } \sum_{k=0}^5 (C_k^6)^2 (C_{6-k}^7)^2 = \\ = 267\ 148 \text{ modos.}$$

79.

En el costado izquierdo pueden estar sentados 0, 1, 2, 3 ó 4 personas de aquellas a las que les es indiferente la elección del costado. Si entre ellas han sido elegidas k personas, hay que escoger además $4 - k$ entre los 10 que prefieren el costado izquierdo. Después de esto, quedarán $12 + (9 - k)$ candidatos, entre los cuales elegimos 4 remeros para el lado derecho. En total, tendremos $C_k^4 C_{4-k}^{10} C_{12+k}^{21-k}$ formas de elección. Sumándolas con respecto a k , obtenemos la respuesta:

$$\sum_{k=0}^4 C_k^4 C_{4-k}^{10} C_{12+k}^{21-k} = \\ = \frac{9! 10!}{4!} \sum_{k=0}^4 \frac{(21-k)!}{k!(9-k)!(4-k)!(6+k)!(17-k)!}.$$

80.

El número 9 se puede descomponer en tres sumandos distintos de tres maneras: $9 = 1 + 2 + 6 = 1 + 3 + 5 = 2 + 3 + 4$. La suma menor que 9 tendrá lugar en 4 casos: $1 + 2 + 3 =$

$6, 1 + 2 + 4 = 7, 1 + 2 + 5 = 1 + 3 + 4 = 8$. Como 3 fichas pueden ser extraídas de C_3^{10} formas, en $C_3^{10} - 4 = 116$ casos la suma no será menor que 9.

81.

Escojamos primeramente una carta de cada palo. Esto se puede efectuar de 13^4 modos. Después de esto, escojamos dos cartas más. Si son de distinto palo, esto se puede hacer de $C_2^4 \cdot 12^2 = 864$ maneras. Combinándolas con las diferentes formas de escoger las primeras 4 cartas y teniendo en cuenta la posibilidad de permutar el orden de elección de dos cartas de un mismo palo, se obtienen $216 \cdot 13^4$ modos. Si las dos nuevas cartas son de un mismo palo, obtenemos $4 \cdot C_2^4 = 264$ maneras de elección. Por las mismas consideraciones, éstas conducen a $88 \cdot 13^4$ modos de elección de todas las cartas. En total, obtenemos $304 \cdot 13^4$ formas.

82.

En el primer día los participantes se pueden escoger de $C_3^{10} = 210$ formas; en el segundo, de $C_3^{10} - 1 = 209$, y en el tercero, de $C_3^{10} - 2 = 208$. En total habrá $210 + 209 + 208 = 9\ 129\ 120$ maneras.

83.

Como $C_3^4 = 20$, cada forma de elección del grupo será utilizada exactamente una vez. El número de permutaciones de estas formas es igual a 20!

84.

Cada muchacho puede elegir entre 5 lugares de trabajo, y cada muchacha, de 4. En total, se obtienen $5^3 \cdot 4^2 = 2000$ formas de elección.

85.

En el primer lugar se puede escribir cualquiera de las 33 letras, y en cada uno de los siguientes, cualquiera de 32 (se excluye la precedente). En total, tendremos $33 \cdot 32^4 = 34\ 503\ 008$ palabras.

86.

Escojamos primeramente los premiados, y distribuyamos después entre ellos los libros. En virtud de la regla del producto, se obtienen $C_3^2 \cdot P(3, 2, 1)$ maneras. En el segundo caso elegimos primero quién obtuvo el primer libro, luego, quién obtuvo el segundo y, al fin, a quién le tocó el tercero. En total, obtenemos $C_3^2 \cdot C_2^2 \cdot C_1^1$ formas de distribución.

87.

Pongamos en correspondencia a cada ficha (p, q) la ficha $(n - p, n - q)$. Si $p + q = n - r$, entonces será $(n - p) + (n - q) = n + r$. Por consiguiente, el número de fichas con suma de puntos $n - r$ es igual al de fichas con suma de puntos $n + r$. El número total de todas las fichas del dominó será igual a C_2^{21} .

88.

Por la hipótesis del problema, los lugares ocupados por las mujeres y los hombres se alternan. Por esto, tendremos $2(7!)^2$ maneras.

89.

Escojamos un caballo de cada par AA', BB', CC' (hay 8 formas de elección), tres caballos de los restantes 10 (hay $C_3^{10} = 120$ formas) y elijamos el orden de enganchar éstos (6! maneras). En total habrá $8 \cdot 6! \cdot C_3^{10} = 691\ 200$ modos.

90.

Las consonantes se pueden elegir de C_7^8 formas, y las vocales, de C_3^4 . Las 7 letras elegidas pueden ser permutadas de 7! maneras. En total obtenemos $C_7^8 \cdot C_3^4 \cdot 7!$ modos. Si no puede haber dos vocales juntas, el orden de las letras es el siguiente: $CVCVCVC$. Aquí tenemos sólo 3!4! permutaciones y $C_4^2 \cdot C_3^3 \cdot 4!$ palabras.

91.

En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, el número de empleados es igual a $6 + 6 + 7 + 7 - 4 - 3 - 2 + 1 = 11$. Sólo inglés conocen $6 - 4 - 2 + 1 = 1$, sólo francés, $7 - 3 - 2 + 1 = 3$.

92.

Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, $92 - 47 - 38 - 42 + 28 + 31 + 26 - 25 = 25$ personas llevaron empanadas.

93.

Los hombres pueden ser divididos en pares de $\frac{10!}{(2!)^5}$ maneras (teniendo en cuenta las permutaciones dentro de los pares y las de los propios pares). Las mujeres se dividen de $10!/(2!)^5$ formas (aquí ya tiene importancia el orden de los pares). En total existen $(10!)^2/(2!)^{10}$ modos.

94.

Escojamos primeramente un hombre y una mujer, los que quedarán en el mismo bote que el par escogido antes (9^2 formas). Después, dividimos

los restantes en 4 grupos de $\frac{(8!)^2}{2^8 \cdot 4!}$ maneras. En

total, habrá $\frac{(9!)^2}{2^8 \cdot 4!}$ modos.

95.

Si dos hombres dados quedan en un mismo grupo (y en éste se encuentran también sus esposas), los restantes se pueden dividir en grupos de

$\frac{(8!)^2}{2^8 \cdot 4!}$ maneras. Si, en cambio, quedan en distintos

grupos, éstos pueden ser completados de $(A_3^3)^2$ formas y, después de esto, se puede dividir a los

demás en grupos de $\frac{6!}{2^6 \cdot 3!}$ modos. En total, obtenemos

17 $(8!)^2 / 2^8 4!$ maneras.

96.

Como los números no pueden comenzar por el cero, tendremos $7^4 - 7^3 = 2058$ números.

97.

Si el número representado por las tres primeras cifras es igual a x , el que representan las últimas tres puede adquirir los valores $0, 1, \dots, 999 - x$: en total, $1000 - x$ valores. Como x varía de 100 a 999, debemos hallar la suma de los números naturales del 1 al 900. Esta es igual a 405 450.

98.

Las fichas blancas se pueden disponer de C_{12}^{12} maneras. Después de la elección de 12 casillas para las fichas blancas, quedarán 20 para las negras, sobre las cuales se las puede ubicar de C_{20}^{12} formas. En total, hay $C_{22}^{12} C_{12}^{12}$ modos.

99.

Dividamos todas las permutaciones de las letras de la palabra «olivar» en clases, de forma que las pertenecientes a una misma clase se diferencien entre sí sólo en el orden de las vocales. El número de clases es igual a $P_6/P_3 = 120$. Solamente una permutación de cada clase satisface la condición planteada. Por esto, su número es también igual a 120.

100.

En las permutaciones en que las cuatro «a» van juntas, se las puede unir y considerar como una sola letra. Por esto, el número de estas permutaciones es igual a $5!$ Quedan $P(4, 1, 1, 1, 1) - 5! = 1580$ permutaciones.

101.

Si la «g» va inmediatamente después de una «o», estas letras se pueden unir. Por esto, el número de permutaciones buscadas es igual a $P(2, 1, 1, 1, 1) = 360$.

102.

Escribamos primeramente todas las letras de la palabra «cloroforno» distintas de la «o», lo que puede hacerse de $P(2, 1, 1, 1, 1)$ maneras. Después de esto, escogemos 4 de los 7 lugares, en los que se pueden colocar las letras «o». En total, obtenemos $P(2, 1, 1, 1, 1) \cdot C_7^4$ formas.

103.

Tanto las vocales como las consonantes se pueden permutar entre sí de $P(2, 1, 1, 1) = 12$ modos. Si ya han sido dispuestas las consonantes, para las vocales quedarán 5 lugares. Por esto, los lugares para ellas pueden ser elegidos de $C_5^3 = 5$ maneras. En total, tendremos $5 \cdot 12^2 = 720$ modos.

104.

Escribamos las vocales en el orden dado. Entonces, para la letra «e» tendremos 5 lugares. Después de escribirla, habrá 6 lugares para la «r» y, por último, 7 para la «l». En total, $5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$ modos.

105.

Al igual que en el problema anterior, obtenemos que el número de formas es igual a $A_3^3/P_3 = 277 200$ (hay que tener en cuenta que la letra «l» figura tres veces en nuestra palabra).

106.

Fijemos primeramente la sucesión de las vocales (hay 2 formas), y después ubiquemos entre ellas a 2 consonantes (hay $A_3^2 = 12$ maneras). La primera de las consonantes que quedan se puede colocar antes o después de ambas vocales (2 formas), y para la segunda ya tendremos tres lugares. En total, obtenemos $2 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 3 = 144$ modos.

107.

Escojamos 3 letras de las 5 consonantes, y coloquémoslas en los lugares indicados (existen A_3^3

formas). Las 5 letras restantes se disponen arbitrariamente en los 5 lugares que quedan (hay 5! modos). En total, habrá $5!A_5^5 = 7200$ maneras.

108.

En virtud de la regla del producto, hay $C_2^3 C_1^2 = 30$ maneras; $C_2^3 C_1^2 = 12$ formas.

109.

$P(3, 1, 1, 1) - 4! = 96$ modos (véase el problema 100).

110.

Dispongamos primeramente las consonantes (hay 3! formas). Para las 3 letras «o» quedarán 4 lugares, y se las puede disponer de 4 maneras. En total habrá 24 modos.

111.

La letra «o» puede figurar entre las escogidas 0, 1, 2, 3 ó 4 veces (de 5 formas), la «k», de tres formas, etc. En total, se obtiene $5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2025$ agrupaciones.

112.

El número de combinaciones en las que las tres letras son distintas es igual a $C_3^3 = 20$; el de combinaciones que contienen exactamente 2 letras distintas, a $6 \cdot 5 = 30$, y el de las que contienen sólo una letra, a 2. En total hay 52 formas de elección.

113.

Si se tiene en cuenta también el orden de las letras, se obtienen $A_3^3 + 3A_2^3 + 2 = 212$ maneras.

114.

Como el orden tanto de las vocales como de las consonantes está determinado, hay que escoger sólo 3 lugares entre 7 para las vocales. Esto puede hacerse de C_3^7 maneras.

115.

Para la palabra «espirales», la primera y última letras deben ser consonantes. Estas se pueden permutar de $P(2, 1, 1, 1)$ formas, y las vocales, de $P(2, 1, 1)$ maneras. En total, tendremos $P(2, 1, 1, 1) \cdot P(2, 1, 1) = 720$ modos. Para la palabra «samovar» existen $P_4 \cdot P(2, 1) = 72$ permutaciones.

116.

Hay que escoger 3 lugares entre 6 para la letra «a», cosa que puede efectuarse de $C_3^6 = 20$ maneras. Si se agrega la condición de que no haya dos «a» seguidas, para éstas habrá solamente 4 lugares, y tendremos $C_3^4 = 4$ formas.

117.

Las letras de la palabra «tic-tac» se pueden permutar de 180 modos. En 60 de estas permutaciones estarán juntas las dos «t» (no tenemos en cuenta el guión); en 60, las dos «c», y en 24, ambas letras. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, obtenemos $180 - 60 - 60 + 24 = 84$ permutaciones admisibles. Para la palabra «tam-tam» tendremos $90 - 30 - 30 - 30 + 12 + 12 + 12 - 6 = 30$ permutaciones admisibles.

118.

Hay 3 agrupaciones que contienen las 3 letras «t», «a», «m», y 3 que contienen 2 letras diferentes cada una. En total, hay 6 agrupaciones. Los números diferentes de cuatro cifras que se pueden formar a partir de las cifras del número 123123 constituyen $3P(2, 1, 1) + 3P(2, 2) = 54$.

119.

Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, obtenemos que todas las cifras 1, 2, 3, 4 están contenidas en $10^6 - 4 \cdot 9^6 + 6 \cdot 8^6 - 4 \cdot 7^6 + 6^6 = 23\ 160$ números. Sólo por las cifras 1, 2, 3, 4 estarán formados $4 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 = \frac{4^7 - 4}{3} = 5460$ números.

120.

Cada cifra aparece en cada columna 6 veces ($P_4/4$). Por esto, sumando las cifras de la primera columna, obtenemos 6(1 + 2 + 3 + 4) = 60, sumando las de la segunda, 600, etc. En total, se obtienen $60 + 600 + 6000 + 60\ 000 = 66\ 660$.

121.

Aquí el número total de permutaciones es igual a 12; las cifras 1 y 5 aparecen en cada columna 3 veces cada una, y la 2, 6 veces. Por esto, la suma de las cifras de la primera columna será igual a $3 \cdot 1 + 3 \cdot 5 + 6 \cdot 2 = 30$. La suma total es igual a $30 + 300 + 3000 + 30\ 000 = 33\ 330$.

122.

Análogamente se obtiene que la suma es igual a 11 110.

123.

La suma es igual a 16 665.

124.

Si se quita la limitación de que la cifra 0 no sea primera, se obtiene una suma de 2 666 640. La de los números que empiezan por 0 es igual a 66 660. Por esto, la suma de los números de cinco cifras que no comienzan por la cifra «0» es igual a 2 599 980.

125.

Como mediante las cifras «6» y «9» se pueden escribir 2^k números de k cifras, la cantidad total de números buscados es igual a $\sum_{k=1}^6 2^k = 126$.

126.

Análogamente se obtiene $\sum_{k=1}^6 3^k = 1092$.

127.

Como la primera cifra no puede ser 0, se obtienen

$$2 \sum_{k=1}^6 3^k = 728 \text{ números.}$$

128.

Cada cifra se repite en cada columna $4^2 = 16$ veces. Por esto, la suma de las cifras de la primera columna es igual a 16 (1 + 2 + 3 + 4) = 160, la de las cifras de la segunda, a 1600, y de la tercera, a 16 000. La suma es igual a 17 760.

129.

En el primer caso la suma es igual a 3 999 960. En el segundo, cada cifra se repite $4^{\frac{1}{2}}$ veces en cada columna, y obtenemos una suma de cifras de la primera columna de $4^{\frac{1}{2}}(1+2+\dots+9) = 75 600$; la suma total es igual a 839 991 600.

130.

En el último lugar puede estar la cifra 3 o la 9; las restantes se pueden permutar de 3! maneras. En total, obtenemos 12 números impares. Análogamente se obtiene que la cantidad de números pares es igual a 12.

131.

Los lugares para las cifras impares se pueden escoger de $C_3^3 = 20$ formas. En cada lugar puede estar una de las 5 cifras (o par, o impar). En total, obtenemos $20 \cdot 5^3$ números. Pero entre ellos $10 \cdot 5^3$ comienzan por cero. Quedan $20 \cdot 5^3 - 10 \cdot 5^3 = 281 250$ números.

132.

$$C_3^3 \cdot 5^3 = 312 500 \text{ números.}$$

133.

En el primer lugar puede estar una de las 9 cifras; en el 2º, 3º, 4º y 5º, una de las 10, y en el último, una entre 5 (su paridad está determinada). En total, obtenemos $9 \cdot 10^4 \cdot 5 = 450 000$ números. Si se toman todos los números del 1 al 999 999, se obtendrán 499 999 números.

134.

Si se excluyen los ceros, las cifras restantes darán una de las sucesiones siguientes: 3; 2, 1; 1, 2; 1, 1, 1. Queda por distribuir los ceros, de forma que la primera cifra sea distinta de cero. Para el 3 esto se puede hacer de una manera, para 2, 1 y 1, 2, de nueve (según la cantidad de ceros que se hallen entre estas cifras), y para 1, 1, 1, de C_3^3 modos. En total habrá $1 + 9 + 45 = 55$ números. Si se toman todos los números del 1 al 9 999 999 999, hay que escoger los lugares para las cifras distintas de cero. Para el 3, esto se puede hacer de C_9^3 maneras, para el 2, 1 y 1, 2, de C_9^3 , y para 1, 1, 1, de C_9^3 . En total, obtenemos $C_9^3 + 2C_9^3 + C_9^3 = 340$ números.

135.

En el primer lugar puede estar cualquiera de las 9 cifras 1, 2, ..., 9. El segundo lo puede ocupar cualquiera de las 9 restantes, el tercero, cualquiera de las 8, etc. En total, se obtienen $9 \cdot 9!$ números.

136.

La cantidad de números del 0 al 999 que se dividen por 5 es igual a $E\left(\frac{1000}{5}\right)$, siendo $E(x)$ la parte entera de x . Análogamente, por 7 se dividen $E\left(\frac{1000}{7}\right)$ números, y por 35, $E\left(\frac{1000}{35}\right)$. En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones,

se obtiene que

$$1000 - E\left(\frac{1000}{5}\right) - E\left(\frac{1000}{7}\right) + E\left(\frac{1000}{35}\right) = 686$$

números no se dividen ni por 5, ni por 7.

137.

Análogamente, se halla que la cantidad de números buscados es igual a 228.

138.

La cantidad de números que se escriben sin la cifra 9 es igual a 729. Por esto, la cifra 9 está contenida en $1000 - 729 = 271$ números. Exactamente 2 veces la cifra 9 figura en 27 números (099, 990, 909, 199, etc.). El cero figura en 4 número de una cifra, 9 de dos cifras y 171 de tres; en total, figura en 181 números. Dos veces el cero figura en 9 números. Las dos cifras 0 y 9 figuran en 36 números (si la tercera cifra es distinta de 0 y 9, habrá 2·2·8 variantes, y si es igual a 0 ó 9, 9·4 variantes más). Las cifras 8 y 9 figuran en 54 números. La cantidad de números de n cifras que no contienen dos cifras iguales seguidas es igual a 9^n si $n > 1$, y a 10 si $n = 1$. Por esto, la cantidad de estos números, del 0 al 999 999, es igual a $10 + 9^2 + 9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 = 597\ 871$.

139.

El número de cuatro cifras puede estar formado por cuatro cifras distintas (1, 2, 3, 5), o por dos iguales y dos diferentes (1, 1, 2, 3; 1, 1, 4, 2, 5; 1, 1, 3, 5; 1, 2, 3, 3; 1, 3, 3, 5; 2, 3, 3, 5) o, por último, por dos pares de cifras iguales (1, 1, 3, 3). Por esto, la cantidad total de estos números es igual a

$$P_4 + 6P(2, 1, 1) + P(2, 2) = 24 + 6 \cdot 12 + 6 = 102.$$

140.

En forma análoga al problema anterior, obtenemos la respuesta:

$$2P(2, 1, 1, 1) + 3P(3, 1, 1) + 2P(2, 2, 1) + 3P(4, 1) = 255.$$

141.

En el número de seis cifras pueden figurar uno, dos o tres pares de cifras iguales. Un par se puede escoger de C_4^1 maneras. El número de permutaciones de 4 cifras distintas y 2 iguales es igual a $P(2, 1, 1, 1, 1, 1) = 6!/2! = 360$. Entre ellas,

en $5! = 120$ permutaciones dos cifras iguales estarán juntas. Por consiguiente, en este caso obtenemos 5 ($360 - 120 = 1200$ números de seis cifras. Dos pares de cifras iguales pueden ser escogidos de $C_4^2 = 10$ maneras, luego de lo cual de $C_2^2 = 3$ formas se pueden escoger dos cifras más. La cantidad total de permutaciones de estas cifras es igual a $P(2, 2, 1, 1) = 180$, con

la particularidad de que en $2 \cdot \frac{5!}{2!} = 120$ de ellas

hay por lo menos un par de cifras iguales seguidas, y en $4! = 24$ permutaciones dos de estos pares. En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene que esto caso nos da $10 \cdot 3 \times \times (180 - 120 + 24) = 2520$ números necesarios. Análogamente se halla que tres pares de cifras iguales los tienen

$$C_4^3 \left(\frac{6!}{(2!)^3} - 3 \cdot \frac{5!}{(2!)^2} + 3 \cdot \frac{4!}{2!} - 3! \right) = 300$$

números necesarios. En total, obtenemos 4020 números.

142.

La cantidad total de números de cinco cifras que pueden formarse a partir de las cifras dadas, es igual a

$$3 \cdot \frac{5!}{2!} + C_3^2 C_1^1 \frac{5!}{(2!)^2} + C_2^1 \cdot \frac{5!}{3!} + C_1^1 \cdot \frac{5!}{3!2!} = 440.$$

Entre ellos en $3P_3 + 2 \cdot \frac{P_3}{2!} = 24$ la cifra 3 se repite 3 veces seguidas. Obtenemos así 416 números buscados.

143.

El número total de permutaciones de las cifras dadas es igual a $P(2, 2, 2, 2)$. Entre ellas, en $P(2, 2, 2, 1)$ permutaciones una cifra dada se halla dos veces seguidas; en $P(2, 2, 1, 1)$ se repetirán seguidas 2 cifras dadas; en $P(2, 1, 1, 1)$, 3 cifras dadas, y en $P(1, 1, 1, 1)$, 4 cifras dadas. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, obtenemos que no habrá 2 cifras que se repitan en

$$P(2, 2, 2, 2) - 4P(2, 2, 2, 1) + 6P(2, 2, 1, 1) - 4P(2, 1, 1, 1) + P(1, 1, 1, 1) = 864$$

permutaciones.

144.

Análogamente se obtiene que el número de permutaciones es igual a

$$\frac{8!}{(2!)^3} - 3 \cdot \frac{7!}{(2!)^2} + 3 \cdot \frac{6!}{2!} - 5! = 2220.$$

145.

De igual forma, tendremos

$$\frac{10!}{(3!)^2} - 2 \cdot \frac{8!}{3!} + 6! = 88080.$$

146.

Análogamente se obtiene la respuesta 20 040.

147.

Si se ha escogido un número, el segundo se puede elegir de 10 maneras (ya que su paridad ya es conocida). Teniendo en cuenta la posibilidad de permutar estos dos números, se obtienen $\frac{20 \cdot 10}{2} = 100$ modos de elección.

148.

O los tres números escogidos son pares, o bien uno es par y dos son impares. Por esto, obtendremos $C_3^6 + C_2^1 C_2^4 = 2030$ maneras de elección.

149.

En 11 puntos del camino se puede elegir entre dos posibilidades. Por esto, la cantidad de caminos es igual a $2^{11} = 2048$.

150.

Como la elección en el punto inicial ya fue efectuada, quedarán $2^{10} = 1024$ posibilidades.

151.

Análogamente hallamos que el número de formas es igual a $3^5 = 243$.

152.

Si se han escogido p monedas por valor de 10 kopeks, se pueden tomar 0, 1, ..., $20 - p$ de 15 k.: en total hay $21 - p$ formas. Como p varía de 0 a 20, tendremos en total $1 + 2 + 3 + \dots + 21 = 312$ maneras de elección.

153.

El número de combinaciones distintas de monedas es igual a $C_3^{12} = 1287$. Por esto, puede haber 1286 respuestas incorrectas.

154.

La cantidad de números de cinco cifras es igual a 90 000. Entre ellos, cada cifra es un número par en $4 \cdot 5^4 = 2500$ casos, e impar, en $5^5 = 3125$. Las cifras menores que 6 no figuran en $4^6 = 1024$ casos, y las mayores que 3, en $3 \cdot 4^4 = 768$. Todos las cifras 1, 2, 3, 4, 5 están contenidas en $5! = 120$ números, y todas las 0, 2, 4, 6, 8, en $4 \cdot 4! = 96$.

155.

De la hipótesis del problema se aprecia que distintos resultados de echar los dados darán igual suma sólo si se obtienen uno del otro permutando los dados. Por esto, la cantidad de sumas distintas es igual a $C_2^6 + 6 = 21$.

156.

Análogamente obtenemos la respuesta $C_3^6 + 2C_2^6 + 6 = 56$.

157.

Un solo tipo de puntos habrá en 6 casos. Dos tipos pueden caer de las tres maneras siguientes: un dado del primer tipo y 5 del segundo, o dos del primero y cuatro del segundo, o tres de cada uno. En el primer caso, el tipo de los dados se puede escoger de A_2^3 maneras, y cualquiera de los 6 puede dar puntos del primer tipo. Esto nos da $6A_2^3 = 180$ casos. Análogamente, la variante $2 + 4$ nos dará $A_2^4 P(2, 4) = 450$ casos, y la $3 + 3 = C_2^3 P(3, 3) = 300$ casos. Así, pues, dos tipos de puntos se obtienen en $180 + 450 + 300 = 930$ casos. Para tres tipos de puntos, hallamos primero todas las particiones del número 6 en 3 sumandos: $6 = 1 + 1 + 4 = 1 + 2 + 3 = 2 + 2 + 2$. En correspondencia con esto, resulta

$$\frac{1}{2!} A_3^6 P(1, 1, 4) = 1800,$$

$$A_3^6 P(1, 2, 3) = 7200,$$

$$\frac{1}{3!} A_3^6 P(2, 2, 2) = 1800,$$

obteniéndose en total 10 800 casos en que caen exactamente 3 tipos de puntos.

En 4 sumandos, el número 6 se descompone como sigue: $6 = 1 + 1 + 1 + 3 = 1 + 1 + 2 + 2$.

Estas variantes nos dan $\frac{1}{3!} A_4^6 P(1, 1, 1, 3) =$

$= 7200$ y $\frac{1}{(2!)^2} A_4^4 P(1, 1, 2, 2) = 16\ 200$, habiendo en total 23 400 casos en que caerán 4 tipos de puntos.

Para 5 tipos tendremos $\frac{1}{4!} A_5^5 P(1, 1, 1, 1, 2) = 10\ 800$ casos, y para $6! = 720$. Obsérvese que $6 + 930 + 10\ 800 + 23\ 400 + 10\ 800 + 720 = 6^4$.

158.

Al echar los dados, éstos se dividen en grupos, según la cantidad de puntos que cayeron en cada uno. Por esto, hay que hallar la cantidad de maneras de dividir n dados en 6 grupos. Este número es igual a C_n^{n+5} (véase la pag. 132).

159.

Como 1 000 000 = $2^6 \cdot 5^8$, cualquier desarrollo de un millón en tres factores tendrá la forma

$$1\ 000\ 000 = (2^{\alpha_1} \cdot 5^{\beta_1}) (2^{\alpha_2} \cdot 5^{\beta_2}) (2^{\alpha_3} \cdot 5^{\beta_3}),$$

siendo $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ números enteros no negativos, tales que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 6$. Como 6 se descompone en 3 sumandos enteros no negativos de $C_6^2 = 28$ modos, el número de desarrollos será igual a $28^2 = 784$, si se tiene en cuenta el orden de los factores.

160.

Los desarrollos obtenidos en el problema anterior se dividen en tres clases: o los tres factores coinciden, o coinciden dos, y el tercero es distinto de ellos, o son los tres diferentes. La primera clase está formada por el único desarrollo $1\ 000\ 000 = 100 \cdot 100 \cdot 100$. Haltemos el número de desarrollos de la segunda. Si los factores que coinciden son de la forma $2^{\alpha} \cdot 5^{\beta}$, obtendremos $2\alpha + \alpha_3 = 2\beta + \beta_3 = 6$. Pero la ecuación $2x + y = 6$ tiene 4 soluciones entre los números enteros positivos: $x = 0, y = 6; x = 1, y = 4; x = 2, y = 2; x = 3, y = 0$. Como cualquier α se puede combinar con cualquier β , obtenemos 16 variantes para $2^{\alpha} \cdot 5^{\beta}$. Una de ellas, precisamente la $2^2 \cdot 5^2$, debe desecharse, pues conduce al desarrollo de la primera clase. Quedan 15 variantes. Cada una de ellas conduce a tres desarrollos, según el lugar que ocupe el tercer factor. Por lo tanto, la segunda clase está formada por 45 desarrollos. Si no se tiene en cuenta el orden de los factores, se obtienen 15 desarrollos. Por último, el número de desarrollos de la tercera clase

es igual a $784 - 1 - 45 = 738$. Estos se dividen en grupos que se diferencian sólo por el orden de los factores, y están formados por 6 desarrollos cada uno. Por esto, si no se tiene en cuenta el orden de los factores, se obtienen $1 + 15 + 1 + 123 = 139$ desarrollos.

161.

Cada moneda puede quedar en uno de los dos bolsillos. Por esto, tendremos 2^n maneras.

162.

Dispongamos los objetos en algún orden, y démoslos a la primera persona los primeros n , a la segunda, los n siguientes, y la última, los objetos restantes. Como el orden de los elementos en los grupos no tiene importancia, obtendremos $C_n^{3n} C_n^{2n} = \frac{(3n)!}{(n!)^3}$ formas de distribución.

163.

En forma totalmente análoga al problema anterior, obtenemos que el número de descomposiciones es igual a $\frac{(2n)!}{2^n n!}$.

164.

Análogamente se obtiene la respuesta $\frac{(nk)!}{(k!)^n n!}$.

165.

$$\frac{30!}{(10!)^3 3!} \cdot \frac{30!}{(3!)^{10} 10!}.$$

166.

4 ases se pueden dividir en dos mitades de $\frac{4!}{(2!)^2} = 3$ maneras, y las 32 cartas restantes, de $\frac{32!}{(16!)^{2!}}$. Como estas particiones se pueden combinar entre sí de dos maneras, obtenemos $\frac{3 \cdot 32!}{(16!)^2}$ formas de partición.

167.

El número de maneras es igual a $\frac{10!}{2^5 \cdot 5!} = 945$.

168.

945.

169.

$$9!/(3!)^4 = 280.$$

170.

Tres personas pueden repartirse 6 manzanas de C_3^6 maneras; cada una de las frutas restantes puede tocarlo a cualquiera de los tres, y podemos repartirlas de 3^3 formas. En total, se obtienen $3^3 C_3^6 = 20\,412$ modos de reparto.

171.

Distribuyamos primero las manzanas. Como cada uno obtiene no más de 4, esta distribución puede efectuarse, salvo posibles permutaciones, de una de las formas siguientes: $6 = 4 + 2 + 0 = 4 + 1 + 1 = 3 + 3 + 0 = 3 + 2 + 1 = 2 + 2 + 2$. Si las manzanas están distribuidas según el esquema $4 + 2 + 0$, habrá que escoger 2 frutas más de entre 6 para el segundo, y entregar las restantes al tercero. Esto se puede efectuar de C_2^6 maneras. Teniendo en cuenta la posibilidad de permutar las personas, se obtienen $3! C_2^6$ formas de reparto. Según el esquema $4 + 1 + 1$, habrá que elegir 3 frutas para el segundo, de entre las 6 restantes (C_3^6 modos). Como dos personas tienen igual cantidad de manzanas, el número de permutaciones de las personas es igual a $P(2, 1) = 3$. Por el esquema $3 + 3 + 0$, habrá que elegir una fruta de entre 6 para el primero y una de las 5 restantes para el segundo. Aquí también habrá 3 permutaciones de personas. Análogamente se estudian los esquemas restantes. En total, obtenemos

$$6C_2^6 + 3C_3^6 + 3C_1^6 C_2^5 + 6C_1^6 C_2^5 + C_3^6 C_2^4 = 690$$

formas de distribución.

172.

Como $9 = 6 + 3 + 0 = 6 + 2 + 1 = 5 + 4 + 0 = 5 + 2 + 2 = 4 + 3 + 2 = 3 + 3 + 3$, obtenemos, al igual que en el problema anterior,

$$6[C_3^9 + C_2^9 + C_1^9 C_2^8 + C_1^9 C_3^7 + C_3^9 C_3^6] + \\ + 3[C_1^9 C_2^8 + C_3^9 C_3^6] + C_3^9 C_3^6 = 19\,068$$

maneras de distribución.

173.

Una baraja se puede repartir entre 13 jugadores de $\frac{52!}{(4!)^{13}}$ maneras (véase el problema 162). Si cada uno debe tener una carta de cada palo, para cada palo obtenemos una permutación

de 13 cartas; como las permutaciones de los palos no dependen unas de las otras, obtendremos, en virtud de la regla de la suma, $(13!)^4$ formas. En el tercer caso, un jugador puede escoger una carta de cada palo de 13^4 modos. Después de esto, las 12 cartas restantes de cada palo se pueden

dividir en 3 grupos de $\frac{12!}{(4!)^3 3!}$ maneras, y todas las restantes, de $\frac{(12!)^4}{(4!)^{12} (3!)^4}$ modos. Estos grupos

se pueden repartir entre 12 jugadores de 12! maneras. Teniendo en cuenta que el jugador que tenga todos los palos puede ser escogido de 13 formas, obtenemos para el tercer caso la

$$\text{respuesta } \frac{(13!)^5}{(4!)^{12} (3!)^4}.$$

174.

4 cartas pueden ser extraídas, de una baraja completa, de C_4^{52} maneras. Exactamente 3 palos habrá en $A_4^4 (C_1^4)^3 C_1^3 = 518\,184$ casos; escogemos el palo que falta y el que se repite de A_2^4 maneras, después de lo cual escogemos dos cartas del palo que se repite de C_2^4 modos, y de una carta de otros dos palos de $(C_1^4)^2$ modos. Exactamente dos palos habrá en $C_4^4 (C_2^4)^2 + A_2^4 C_2^4 C_1^4 = 81\,120$ casos. En efecto, esto es posible si tenemos dos cartas de cada dos palos, o una de un palo y tres de otro. En el primer caso hay que escoger dos palos y dos cartas en cada uno de ellos, y en el segundo, elegir el primero y el segundo palos (aquí ya tiene importancia el orden de éstos) y después tomar tres cartas del primero y una del segundo.

175.

Dividamos las 13 cartas de cada palo según el esquema $3 + 3 + 3 + 4$. Esto se puede efectuar de $\frac{13!}{4!(3!)^4}$ maneras. Los grupos de 4 cartas se pueden repartir entre los jugadores de 4! formas, y los de 3 de cada palo, de 3!. En total obtenemos $(3!)^4 4!$ modos de distribución de los grupos. Las cartas, a su vez, pueden ser repartidas de

$$\left(\frac{13!}{4!(3!)^4} \right)^4 4! (3!)^4 = \frac{(13!)^4}{(4!)^8 (3!)^{12}}$$

formas.

176.

Distribuyamos a los participantes del reparto en cierto orden. Después de esto, dispongamos,

de todas las formas posibles, 18 objetos en orden y dividámoslos en 4 grupos de 4 objetos cada uno y 1 de 2 objetos. El grupo de dos objetos lo otorgamos a uno de los 5 participantes del reparto, dando los grupos restantes a los demás (el primer grupo al primero; el segundo, al segundo, etc.). Como el orden de los elementos en los grupos no tiene importancia, se obtienen

$\frac{5 \cdot 18!}{(4!)^2 2!}$ formas de reparto. En el segundo caso,

análogamente, obtendremos $\frac{18! C_2^4}{(4!)^2 (3!)^2}$ modos.

177.

Para cada par de elementos hay tres posibilidades: en la elección pueden figurar dos, uno o ninguno del par. Por esto, la cantidad de elecciones es igual a $3^{14} = 4\ 782\ 969$.

178.

Las 4 esferas negras se pueden distribuir en 6 paquetes de C_4^3 maneras. Para las blancas y las azules tendremos la misma cantidad de formas. En virtud de la regla del producto, obtenemos $(C_4^3)^3 = 2\ 000\ 376$ maneras.

179.

Análogamente obtenemos la respuesta $C_3^4 C_3^3 = 5720$.

180.

Representemos cada partición del número n en sumandos en forma de un diagrama puntual. Si agregamos a éste una columna de n puntos, obtendremos un diagrama para la partición del número $2n$ en n sumandos.

181.

Escojamos tres números naturales cualesquiera, del 1 al $n - 2$; agreguemos 2 al mayor de ellos y 1 al segundo en magnitud. Obtendremos tres números, de los cuales no habrá dos juntos. Estos dan, precisamente, los números de los objetos elegidos. De este modo, la elección se puede efectuar de C_{n-2}^3 formas.

182.

De $P(2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1) = \frac{16!}{2^8}$ maneras.

183.

Podemos ocupar las casillas libres por fichas iguales y obtener una permutación de 48 fichas y de las figuras indicadas en el problema. El número de estas permutaciones es igual a $P(48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1) = \frac{64!}{2^8 48!}$.

184.

Por el mismo procedimiento se obtiene la respuesta $P(32, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1)$.

185.

Supongamos que se han ocupado p casillas por fichas blancas y q por negras. Las 15 fichas blancas se pueden colocar en p casillas, de modo que todas las casillas queden ocupadas, de C_{p-1}^{15} maneras, y las 15 negras en q casillas, de C_{q-1}^{15} . Se pueden escoger p casillas para las fichas blancas y q para las negras de $P(p, q, 24 - p - q)$ maneras. Por eso, el número total de formas es igual a

$$\sum_{p, q} P(p, q, 24 - p - q) C_{p-1}^{14} C_{q-1}^{14}$$

donde la suma se toma por todos los p y q tales que

$$1 \leq p \leq 15, 1 \leq q \leq 15, p + q \leq 24.$$

186.

Unamos en un mismo grupo las casillas que se transforman una en la otra cuando el tablero se gira en 90° . Por hipótesis, las fichas ocupan 5 de estos grupos, siendo el número total de ellos igual a 16. Por esto, tendremos $C_4^5 = 4368$ formas de distribución.

187.

Se resuelve análogamente al problema anterior. Hay C_3^8 maneras.

188.

Ahora hay dos veces menos casillas, por lo que tendremos C_{10}^4 modos.

189.

En una mitad del tablero hay que colocar 6 fichas blancas y 6 negras, sobre 16 casillas negras.

Esto puede efectuarse de $P(6, 6, 4) = \frac{16!}{6! 6! 4!}$ modos.

190.

Hay que escoger 12 casillas en una mitad del tablero, entre 16, y colocar en ellas fichas cualesquiera, ocupando en la segunda mitad casillas simétricas con fichas de color opuesto. La elección de las casillas puede efectuarse de C_{16}^{12} formas, y la del color de las fichas que ocupan estas 12 casillas, de 2^{12} . En total, se obtienen $2^{12}C_{16}^{12} = 17\ 454\ 720$ maneras.

191.

La posición de las fichas se determina por cuáles 5 casillas de 7 de la primera fila horizontal están ocupadas por fichas blancas. Por esto, tendremos $C_7^5 = 21$ formas.

192.

Las posiciones se dividen en dos clases, según esté ocupada o no la casilla angular. Si éstas se hallan ocupadas, sobre la primera vertical y la primera horizontal habrá 8 fichas más en 12 casillas no angulares. Estas se pueden disponer de $C_{12}^8 = 495$ maneras. Si las casillas angulares están libres, en las 12 no angulares de la primera vertical y horizontal habrá 10 fichas. Se las puede disponer de $C_{12}^{10} = 66$ maneras. En total, tendremos 561 modos de distribución.

193.

Las 7 esferas blancas se pueden colocar en 9 hoyos de C_9^7 formas, y las dos negras, de C_9^2 . En total, tendremos $C_9^7 \cdot C_9^2 = 289\ 575$ modos.

194.

Análogamente, se obtienen $C_8^3 (C_8^3)^2 = 521\ 235$ maneras.

195.

Escojamos primero 9 libros para la persona C. Esto se puede efectuar de C_7^9 maneras. Los 18 libros restantes se pueden distribuir entre A y B do 2^{18} modos. En total, tendremos $2^{18}C_7^9$ formas de reparto.

196.

Los 8 pasajeros se pueden distribuir entre los pisos de 4^8 modos. Entre ellos, en 3^8 casos no saldrá ningún pasajero en un piso dado, en 2^8 , en dos pisos dados, y en 1, en tres pisos profijados. En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, obtenemos la respuesta $4^8 - 4 \cdot 3^8 + 6 \cdot 2^8 - 4 = 40\ 824$.

197.

Son posibles los siguientes casos: por 3 se dividen los tres sumandos, uno y ninguno de ellos. En el primer caso, los sumandos se pueden escoger de C_3^3 maneras. En el segundo, un sumando da como resto 1 y el otro, 2. Como hay 34 números del 1 al 100 que dan 1 como resto, 33 que se dividen por 3 y otras tantas que dan como resto 2, en el segundo caso tendremos $C_3^4 (C_3^3)^2$ formas. Si ninguno de los tres sumandos se divide por 3, éstos darán como resto 1, 1 y 1, o bien 2, 2 y 2. Correspondientemente, obtenemos C_3^4 o C_3^3 casos. En total, habrá $2C_3^3 + C_3^4 + C_3^4 (C_3^3)^2 = 53\ 922$ modos de elección.

198.

El problema se resuelve en forma análoga al precedente. La respuesta será

$$3C_3^n + (C_3^n)^2 = \frac{n}{2} (3n^2 - 3n + 2).$$

199.

Si se han colocado p esferas blancas, los hoyos ocupados se pueden escoger de C_p^{p+1} formas. Luego, quedarán $n - p + 1$ hoyos para la esfera negra y, además, se puede no colocarla en absoluto. Obtenemos así $n - p + 2$ posibilidades. Por esto, la respuesta tendrá la forma

$$\sum_{p=0}^n (n - p + 2) C_p^{p+1} = \sum_{s=1}^q sC_s^q + \sum_{p=0}^{q-1} C_p^q. \text{ Co-}$$

$$\text{mo } \sum_{s=1}^q sC_s^q = q2^{q-1} + \sum_{p=0}^{q-1} C_p^q = 2^q - 1 \text{ (véase el}$$

problema 401a), obtenemos la respuesta $(q + 2)2^{q-1} - 1$.

200.

Designemos un conjunto no vacío de esferas blancas por la letra B, y el de negras, por N. De la hipótesis del problema se deduce que las esferas se distribuyen según uno de los esquemas NBNB . . . NB, o bien ENBN . . . BN, figurando r pares en cada conjunto. Pero m esferas blancas se pueden distribuir entre r conjuntos no vacíos de C_{m-1}^{r-1} maneras. Para las esferas negras, tendremos C_{n-1}^{r-1} modos, habiendo en total $2C_{m-1}^{r-1}C_{n-1}^{r-1}$. Análogamente se deduce que $2r$ contactos habrá en $C_{m-1}^{r-1}C_{n-1}^{r-1} + C_{m-1}^{r-1}C_{n-1}^{r-1}$ casos.

201.

Sea $A(m, n)$ el número de formas de obtener m puntos en n exámenes (sin obtener, además, ningún «2»). Entonces queda claro, que $A(30, 8) = A(25, 7) + A(26, 7) + A(27, 7)$, etc. Continuando la disminución de m , al cabo de varios pasos se obtiene la respuesta 784.

202.

Esojamos primeramente los n objetos que quedarán en sus lugares. Esto se puede hacer de C_n^{m+n} modos. Los m objetos restantes se permutan de forma que ninguno quede en su lugar. Esto se puede efectuar de D_m maneras (véase la pág. 47).

En total, tendremos $\frac{(m+n)!}{m!n!} D_m$ formas.

203.

r objetos se pueden distribuir entre $n+p$ personas de $(n+p)^r$ maneras; aquí en $(n+p-1)^r$ casos una persona dada no obtendrá ningún objeto; en $(n+p-2)^r$, dos personas dadas no obtendrán nada, etc. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene el resultado que queríamos demostrar.

204.

La primera columna de la partición de $2r+x$ en $r+x$ sumandos diferentes de cero contiene $r+x$ elementos. Eliminéandola, obtenemos un diagrama de la partición de r en sumandos no negativos.

205.

Como cada uno puede votar por cualquiera de las n personas, tendremos n^n formas de votación. En el segundo caso, hay que dividir n votos entre n candidatos, cosa que puede efectuarse de C_{n-1}^{2n-1} maneras.

206.

Supongamos que el número $2n$ está dividido en tres partes del modo requerido: $2n = a + b + c$, siendo $a \leq b \leq c$. Entonces $a \neq 1$, pues en caso contrario tendríamos que $b + c = 2n - 1$, por lo cual sería $b < c$, cosa que no puede ser, ya que $b + 1 > c$. Además, $a + b > c$, y los números $a + b$ y c tienen igual paridad. En consecuencia, $a + b \geq c + 2$. Pero entonces los números $a - 1$, $b - 1$, $c - 1$ forman una par-

tición de $2n - 3$, siendo $(a - 1) + (b - 1) > c - 1$. Con esto se establece una correspondencia biunívoca entre las particiones de los números $2n$ y $2n - 3$.

207.

Se desprende de la igualdad

$$C_1^n + C_3^n + C_5^n + \dots = 2^{n-1}.$$

208.

Supongamos que el primero obtuvo x objetos del primer tipo, y del segundo y z del tercero. Entonces será $x + y + z = 3n$, con la particularidad de que $0 < x, y, z \leq 2n$. De esta forma, hay que hallar el número de soluciones de la ecuación $x + y + z = 3n$ en enteros positivos que no superen $2n$. Si se eliminan las condiciones $x \leq 2n, y \leq 2n, z \leq 2n$, el número de soluciones es igual al de maneras de dividir $3n$ objetos iguales entre tres personas, es decir, a C_{3n-1}^{2n} . Hallemos ahora la cantidad de soluciones en las que $x > 2n$. Esta es igual al número total de soluciones, en enteros no negativos, de las ecuaciones $y + z = k, 0 \leq k < n$, es decir, a $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. En el mismo número de soluciones será $y > 2n$ y $z > 2n$. Eliminéndolas, obtenemos $3n^2 + 3n + 1$ soluciones.

209.

El problema se resuelve análogamente. Se obtiene

$$C_3^{4n+3} - 4 \sum_{k=0}^{2n-1} C_2^{k+2} = C_3^{4n+3} - 4C_3^{2n+2} = \\ = \frac{1}{3} (2n+1) (8n^2 + 8n + 3).$$

210.

Como las partes son indistinguibles, las soluciones x, y, z y $2n - x, 2n - y, 2n - z$ de la ecuación $x + y + z = 3n$ se identifican. Una solución, precisamente, la $x = n, y = n, z = n$ se identifica en este caso consigo misma, y las demás, con soluciones diferentes de ellas. Por esto, la respuesta tiene la forma

$$\frac{3n^2 + 3n}{2} + 1.$$

Análogamente se considera el caso en que haya objetos de 4 tipos.

211.

Aquí hay que hallar el número de soluciones enteras de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_m = mn$, que satisfagan a las condiciones $0 \leq x_k \leq 2n$, $1 \leq k \leq m$. Si se eliminan las limitaciones $0 \leq x_k \leq 2n$, $1 \leq k \leq m$ obtenemos C_{m-1}^{mn+m-1} soluciones. Hallemos el número de éstas, para las cuales $x_1 > 2n$. Este es igual al número total de soluciones de todas las ecuaciones

$$x_2 + x_3 + \dots + x_m = k,$$

donde $0 \leq k \leq mn - 2n - 1$, es decir, a

$$\sum_{k=0}^{mn-2n-1} C_{m-2}^{k+m-2} = C_{m-1}^{mn-2n+m-2}.$$

Otras tantas soluciones existen, para las que $x_2 > 2n$, etc. En consecuencia, hay que eliminar $C_{m-1}^{mn+m-2n-2}$ soluciones. Aquí algunas soluciones (precisamente, aquellas para las cuales, digamos, $x_1 > 2n$ y $x_2 > 2n$) se eliminan dos veces. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene el resultado que se quería demostrar.

212.

De 231 formas. En lo que respecta a la resolución, véase el problema siguiente.

213.

Sea x_1, x_2, x_3 la cantidad de objetos del primer tipo, o y_1, y_2, y_3 , la de los del segundo, que obtienen las personas A, B y C respectivamente. Entonces tendremos las ecuaciones $x_1 + x_2 + x_3 = n$ o $y_1 + y_2 + y_3 = n$, debiendo cumplirse las condiciones $x_k + y_k \leq n$, $1 \leq k \leq m$. Si se eliminan las limitaciones $x_k + y_k \leq n$, $1 \leq k \leq m$, obtendremos C_2^{n+2} soluciones de la primera ecuación y C_2^{n+2} de la segunda, habiendo en total $(C_2^{n+2})^2$ soluciones. Aquí el número de soluciones para las cuales se viola la condición $x_1 + y_1 \leq n$ es igual a la cantidad total de soluciones enteras no negativas de los sistemas de ecuaciones $x_2 + x_3 = r$, $y_2 + y_3 = s$, donde $0 \leq r < n$, $0 \leq s < n$ y $r + s < n$. El sistema $x_2 + x_3 = r$, $y_2 + y_3 = s$ tiene $(r+1)(s+1)$ soluciones enteras no negativas. Por esto, el número total de soluciones de nuestros sistemas

es igual a

$$\begin{aligned} & \sum_{s=0}^{n-1} \sum_{r=0}^{n-s-1} (r+1)(s+1) = \\ & = \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{n-1} (s+1)(n-s)(n-s+1) = \\ & = \sum_{s=0}^{n-1} C_1^{s+1} C_2^{n-s+1} = C_4^{n+3} \end{aligned}$$

(véase la pág. 38). Otras tantas soluciones no satisfacen las condiciones $x_2 + y_2 \leq n$ y $x_3 + y_3 \leq n$. Eliminándolas, obtenemos

$$(C_2^{n+2})^2 - 3C_4^{n+3}$$

soluciones. Para $n = 5$, tendremos 231 soluciones

214.

9 personas se pueden intercambiar de lugar de 9! formas. Hallemos en cuántas permutaciones 3 ingleses estarán sentados juntos. Todas estas permutaciones se obtienen de una de ellas intercambiando entre sí a los ingleses (hay 3! modos), y a los 6 franceses y turcos o el grupo de ingleses (son 7! formas). En total, se obtienen 3! 7! permutaciones. En el mismo número de éstas estarán sentados juntos los tres franceses, y en otras tantas, los 3 turcos. Ahora bien, en (3!)² 5! permutaciones estarán juntos los ingleses y los franceses, y en (3!)², los ingleses, los franceses y los turcos. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene la respuesta

$$9! - 3 \cdot 3! 7! + 3 (3!)^2 5! - (3!)^3 = 283 824.$$

215.

El número total de permutaciones es igual a 9! Hallemos la cantidad de éstas, en las cuales dos ingleses dados estén juntos. Si los unimos, obtendremos permutaciones de 8 objetos. Pero, además, podemos intercambiar el asiento de uno con el del otro. Por esto, en total tendremos 2! 8! permutaciones. Además, dos ingleses dados se pueden elegir de C_2^3 modos, y en total tenemos tres nacionalidades distintas. Por esto, el término correspondiente de la fórmula de inclusiones y exclusiones es igual a $3C_2^3 2! 8!$. Hallemos ahora en cuántas permutaciones estarán sentados juntos dos ingleses dados y, además, dos franceses prefijados. Si unimos en un par a los compatriotas

que están sentados juntos, se obtienen 7 objetos a permutar. Además, se pueden cambiar de lugar los compatriotas vecinos. En total, tendremos $(2!)^7!$ permutaciones. Pero también dos pares de compatriotas pueden ser escogidos de $(C_3)^3$ maneras. Por esto, el sumando correspondiente de la fórmula de inclusiones y exclusiones es igual a $(C_3)^3 (2!)^2 7!$. Luego se estudian los siguientes casos: juntos están sentados

- tres compatriotas,
- dos representantes de cada nacionalidad,
- tres representantes de una nacionalidad y dos de otra,
- tres representantes de una nacionalidad y tres de otra,
- tres representantes de una nacionalidad, dos de otra y dos de la tercera,
- tres representantes de una nacionalidad, tres de otra y dos de la tercera,
- tres de cada nacionalidad.

Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, obtenemos la respuesta

$$\begin{aligned} & 9! - 9 \cdot 2! 8! + 27 (2!)^2 7! - 3 \cdot 3! 7! - (2!)^3 6! - \\ & - 18 \cdot 3! 2! 6! + 3 (3!)^2 5! + 27 \cdot 3! (2!)^2 5! - \\ & - 9 (3!)^2 2! 4! + (3!)^4. \end{aligned}$$

216.

Este problema se resuelve en forma análoga al anterior, pero se calcula de otra manera el número de permutaciones en las que los compatriotas dados estén sentados juntos. Dos ingleses se pueden sentar juntos de 219 maneras, después de lo cual se puede sentar a los restantes de 7! modos. Si se toman dos ingleses y dos franceses, el número de formas de sentado, en las que estos compatriotas estarán juntos, es igual a $(2!)^2 9 \cdot 6!$. Precisamente, podemos escoger de 9 maneras los lugares para los ingleses, después de lo cual se unen en un par los dos franceses y se toman todas las permutaciones posibles de este par y las 5 personas restantes. Teniendo en cuenta la posibilidad de cambiar de lugar tanto a los ingleses que están sentados juntos como a los franceses vecinos, obtenemos el número indicado de permutaciones. Las posibilidades restantes se estudian análogamente. En total, obtenemos

$$\begin{aligned} & 9! - 9 \cdot 2! 9 \cdot 7! + 27 (2!)^2 9 \cdot 6! + 3 \cdot 3! 9 \cdot 6! - \\ & - (2!)^3 9 \cdot 5! - 18 \cdot 3! 2! 9 \cdot 5! + 3 (3!)^2 9 \cdot 4! + \\ & + 27 \cdot 3! (2!)^2 9 \cdot 4! - 9 (3!)^2 2! 9 \cdot 3! + (3!)^3 9 \cdot 2! \end{aligned}$$

formas.

$1/2 \cdot 12 - 1194$

217.

Designemos el número de formas de pegar las estampillas por una suma de N kopeks mediante $F(N)$. Dividámoslas estas formas en clases, en correspondencia con el valor de la última estampilla. Obtendremos así la relación de recurrencia

$$\begin{aligned} F(N) = F(N-5) + F(N-10) + \\ + F(N-15) + F(N-20). \end{aligned}$$

Utilizando esta relación y la igualdad $F(5) = 1$, se obtiene que $F(40) = 108$.

218.

Sea $F(n_1, \dots, n_m; N)$ el número de formas de pagar una suma de N kopeks en monedas de n_1, \dots, n_m k. Entonces, tiene lugar la relación de recurrencia

$$\begin{aligned} F(n_1, \dots, n_m; N) = F(n_1, \dots, n_{m-1}; N) + \\ + F(n_1, \dots, n_m; N - n_m) \end{aligned}$$

(véase la pág. 68). Utilizando esta relación y otras análogas, se halla que $F(10, 15, 20, 50; 100) = 20$.

219.

Mediante una relación de recurrencia se obtiene que el problema posee 4 soluciones.

220.

La fila puede contener 3, 2 ó 4 esferas negras. Si contiene 3, la cuarta esfera se puede elegir de tres formas, intercambiando luego las 3 esferas negras y una de otro color de $P(3, 1) = 4$ maneras. En total habrá 12 modos. Análogamente, si se toman 2 esferas negras se obtienen $C_3^2 P(2, 1, 1) = 36$ posibilidades, y si se toma 1.41 posibilidades. En total, se pueden formar $12 + 36 + 24 = 72$ filas.

221.

El número de estas representaciones es igual al de particiones de n esferas iguales en 3 grupos no vacíos, es decir, a C_3^{n-1} .

222.

Hallemos primeramente cuántos ceros serán necesarios para escribir todos los números del 1 al 999 999. En el último lugar habrá un cero en 99 999 números (10, 20, ..., 999 900); en el segundo, en 99 900; en el tercero, en 99 900, etc. En total, endremos $99 999 + 99 990 +$

+ 99 900 + 99 000 + 90 000 = 488 889. El número total de cifras es igual a $9 + 2 \cdot 90 + 3 \cdot 900 + 4 \cdot 9000 + 5 \cdot 90 000 + 6 \cdot 900 000 = 5 888 889$. Como todas las cifras, a excepción del cero, figuran igual cantidad de veces, cada una de ellas figurará

$$\frac{5 888 889 - 4 888 889}{9} = 600 000 \text{ veces.}$$

223.

Elijamos primero los lugares en los que esté la cifra 3 (cosa que puede efectuarse de C_2^9 maneras). Después, coloquemos en los 8 lugares restantes las cifras 1 ó 2, lo que puede hacerse de 2^8 formas. En total, se obtienen $2^8 C_2^9 = 11 520$ modos.

La suma de las cifras de cualquiera de los números escritos está comprendida entre $8 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 14$ y $8 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 22$. Por esto, si el número se divide por 9, la suma de sus cifras debe ser igual a 18. Por lo tanto, las unidades y los «2» tienen por suma 12. Esta se obtiene si se toman 4 unidades y 4 «2». Así, pues, nuestro número contiene 4 unidades, 4 «2» y 2 «3». Con estas cifras se pueden formar

$$P(4, 4, 2) = \frac{10!}{4! 4! 2!} = 3150$$

números distintos.

224.

Supongamos que los números a y b forman una inversión en una permutación dada. Si los cambiamos de lugar, obtendremos una permutación nueva, en la que éstos ya no formarían inversión. Tenemos $n!$ permutaciones, en cada una de las cuales se pueden elegir C_n^2 modos los números a y b . En la mitad de los casos estos números formarían una inversión. Por consiguiente, el número de inversiones es igual a $\frac{n!}{2} C_n^2$.

225.

El número n se puede representar de $C_2^{n-1} = \frac{n^2 - 3n + 2}{2}$ maneras como suma de tres sumandos enteros positivos (considerando distintas las representaciones que se diferencian en el orden de los sumandos). Entre éstas, en $\frac{n-2}{2}$, para n par, y en $\frac{n-1}{2}$, para n impar, representaciones dos sumandos son iguales. Además, si n se divide

por 3, existe una representación en la que los tres sumandos serán iguales. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene sin dificultad que el número de representaciones con sumandos distintos dos a dos se expresa mediante las siguientes fórmulas:

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-2) + 2 = \frac{n^2 - 6n + 12}{2},$$

si $n = 6k$,

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-1) = \frac{n^2 - 6n + 5}{2},$$

si $n = 6k + 1$,

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-2) = \frac{n^2 - 6n + 8}{2},$$

si $n = 6k + 2$,

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-1) + 2 = \frac{n^2 - 6n + 9}{2},$$

si $n = 6k + 3$,

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-2) = \frac{n^2 - 6n + 8}{2},$$

si $n = 6k + 4$,

$$\frac{n^2 - 3n + 2}{2} - \frac{3}{2}(n-1) = \frac{n^2 - 6n + 5}{2},$$

si $n = 6k + 5$.

Si no se tiene en cuenta el orden de los sumandos, se obtienen 6 veces menos representaciones. No es difícil comprobar que las expresiones que se obtienen en este caso no son otra cosa que la parte entera de $\frac{n^2 - 6n + 12}{12}$ para los valores correspondientes de n .

226.

El número $12n + 5$ se puede representar de C_3^{12n+4} maneras en forma de cuatro sumandos (considerando diferentes las representaciones que se diferencian en el orden de los sumandos). El número de representaciones en las que $x = y$ es igual al de soluciones de las ecuaciones $2x + z + t = 12n + 5$ en números enteros positivos. Como la ecuación $z + t = 12n - 2k + 5$ tiene $12n - 2k + 4$ soluciones enteras positivas, el número total de estas soluciones es igual a

$$\sum_{k=1}^{6n+1} (12n - 2k + 4) = (6n+1)(6n+2) = 2C_2^{6n+2}.$$

El número de soluciones en las que $x = y = z$ es igual al de soluciones de las ecuaciones $3x + t = 12n + 5$, es decir, a $4n + 1$.

Hallemos en cuántas soluciones hay sumandos mayores que $6n + 2$. Sea $x = k \geq 6n + 3$. Entonces, será $y + z + t = 12n + 5 - k$. Pero el número $12n + 5 - k$ se puede representar de $C_2^{12n+4-k}$ formas como suma de tres términos enteros positivos. Por esto, habrá

$$\sum_{h=6n+3}^{12n+2} C_2^{12n+4-h} = C_3^{6n+2}$$

soluciones, para las cuales sea $x \geq 6n + 3$. Como en lugar de x se puede tomar cualquier sumando, tendremos $C_3^{12n+4} - 4C_3^{6n+2}$ soluciones, en las que todos los sumandos no superen $6n + 2$.

Ahora bien, el número de soluciones de la ecuación $2x + z + t = 12n + 5$, para las cuales sea $z \geq 6n + 3$, es igual a $3n(3n + 1)2C_2^{3n+1}$. Por esto, el número de soluciones en las cuales $x = y$ y todos los sumandos no superan $6n + 2$, es igual a $2[C_2^{6n+2} - 2C_2^{3n+1}]$. Como en lugar de x e y se puede tomar cualquier otro par de letras, la cantidad total de soluciones en las que dos sumandos son iguales y todos éstos no superan $6n + 2$, es igual a

$$2C_2^4 [C_2^{6n+2} - 2C_2^{3n+1}].$$

Por último, el número de soluciones de la ecuación $3x + t = 12n + 5$, para las cuales $t \geq 6n + 3$, es igual a $2n$. Por esto, el número total de soluciones en las cuales tres sumandos son iguales y todos ellos no superan $6n + 2$, es igual a $4(2n + 1)$.

Si se desechan de todas las representaciones aquellas en las que coinciden dos sumandos, las representaciones en las que coinciden tres serán eliminadas tres veces. Por esto, en la fórmula de inclusiones y exclusiones hay que multiplicar el número de éstas por dos. En total, se obtienen

$$[C_3^{12n+4} - 4C_3^{6n+2}] - 2C_2^4 [C_2^{6n+2} - 2C_2^{3n+1}] + \\ + 8(2n + 1) = 12n(12n^2 + 3n - 1)$$

representaciones, en las que todos los sumandos son distintos,

$$2C_2^4 [C_2^{6n+2} - 2C_2^{3n+1}] - 12(2n + 1) = \\ = 12n(9n + 4)$$

representaciones que contienen exactamente tres sumandos diferentes, y $4(2n + 1)$ en las que hay dos sumandos diferentes.

Dividamos todas las representaciones en clases, tales que dos de una misma clase se diferencien entre sí sólo en el orden de los sumandos. Entonces las representaciones del primer tipo se dividirán en clases formadas por 24 elementos; las del segundo, por 12 elementos, y las del tercero, por 4. Por esto, la cantidad de particiones del tipo exigido es igual

$$\frac{n}{2} (12n^2 + 3n - 1) + n(9n + 4) + 2n + 1 = \\ = \frac{n+1}{2} (12n^2 + 9n + 2).$$

227.

En el proceso de resolución del problema anterior, hallamos que el número de representaciones

en las que todos los sumandos son diferentes es igual a $12n(12n^2 + 3n - 1)$. Como ahora no tenemos en cuenta el orden de los sumandos, se obtienen $\frac{n}{2}(12n^2 + 3n - 1)$ particiones.

228.

Cada progresión geométrica se determina por el primer término y la razón q . Si la progresión crece, se debe cumplir la desigualdad $aq^2 \leq 100$,

de donde se deduce que $a \leq \frac{100}{q^2}$. Por consiguiente,

el número de progresiones crecientes de tres términos con razón q es igual a $E\left(\frac{100}{q^2}\right)$. El número total de progresiones será igual a

$$2 \left[E\left(\frac{100}{4}\right) + E\left(\frac{100}{9}\right) + E\left(\frac{100}{16}\right) + \dots \right. \\ \left. \dots + E\left(\frac{100}{100}\right) \right] = 102$$

(el factor 2 está ligado a que una misma terna de números se puede considerar tanto como progresión creciente que como decreciente).

229.

Designemos mediante F el conjunto de varios franceses juntos, y mediante T, el de varios turcos juntos. La letra e denotará a un inglés. De la hipótesis del problema se deduce que es posible uno de los siguientes tipos de disposición: FTFITIFITIF, o bien TITIFITIFITIF. En el

primer tipo, habrá que dividir 7 franceses en 4 grupos no vacíos (cosa que puede hacerse de C_7^2 modos), 10 turcos en 3 grupos no vacíos (hay C_7^3 maneras), después colocar estos grupos en orden en los lugares respectivos y permutar de todas las formas posibles a los compatriotas entre sí. Se obtienen $6! 7! 10! C_7^2 C_7^3$ formas de disposición. El segundo tipo de disposición da, por el mismo método, $6! 7! 10! C_7^2 C_7^3$ maneras de disposición. En total, se obtienen

$$6! 7! 10! [C_7^2 C_7^3 + C_7^3 C_7^2] = 6! 7! 10! 1980$$

soluciones.

230.

Análogamente al problema anterior, se obtienen $5! 7! 10! 1080$ soluciones.

231.

Los dos números buscados se diferencian entre sí por los factores $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma, d^\delta$, cada uno de los cuales figura en uno de los números y en el otro no. Como 4 factores pueden distribuirse entre dos números de $2^4 = 16$ maneras, el problema tiene 16 soluciones. Si no se tiene en cuenta el orden de los números, tendremos 8 soluciones.

232.

Los números buscados tienen la forma GA y GB , siendo A y B divisores del número $a^\alpha b^\beta c^\gamma d^\delta$. Este número tiene $N = (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \times (\delta + 1)$ divisores (véase el problema 67). Por esto, A y B se pueden escoger de C_N^{N+1} formas, si no se distinguen los pares (GA, GB) y (GB, GA) , y N^2 si estos pares se diferencian.

233.

Existen C_9^2 agrupaciones en las que todas las letras son distintas, $C_9^2 C_7^3$ en las que coinciden dos letras, etc. En total, obtenemos

$$C_9^2 + C_9^2 C_7^3 + C_7^2 C_5^3 + C_3^2 = 146 400$$

agrupaciones.

234.

Las permutaciones buscadas comienzan por varias letras α , después de las cuales va una letra β , y después las letras pueden estar en cualquier orden. Si al principio hay k letras α y una β , las letras restantes se pueden permutar de $P(p - k, q - 1, r)$ formas. Sumando con respecto a k de 1 a p , se obtiene que el número de per-

mutaciones buscadas es igual a

$$\sum_{k=1}^p \frac{(p+q+r-k-1)!}{(p-k)!(q-1)!r!} = \\ = C_r^{q+r-1} \sum_{k=1}^p C_{p-k}^{p-k+q+r-1}.$$

Pero

$$\sum_{k=1}^p C_{p-k}^{p-k+q+r-1} = C_{p-1}^{p+q+r-1}.$$

Por esto, tendremos $C_r^{q+r-1} C_{p-1}^{p+q+r-1}$ permutaciones.

235.

Los números que expresan las longitudes de las franjas de cada color forman una representación del número 10 en forma de suma de términos que toman valores naturales del 2 al 10, teniendo importancia el orden de los sumandos. La cantidad de tales particiones en k sumandos es igual al coeficiente de x^{10} en el desarrollo de la expresión

$$(x^2 + x^3 + \dots + x^{10})^k = \left(\frac{x^2 - x^{11}}{1 - x} \right)^k = \\ = x^{2k} (1 - x^9)^k (1 - x)^{-k} = \\ = x^{2k} \left(1 - kx^9 - \frac{k(k-1)}{1 \cdot 2} x^{18} - \dots \right) \times \\ \times \left(1 + kx + \frac{k(k+1)}{1 \cdot 2} x^2 + \frac{k(k+1)(k+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 + \dots + \frac{k(k+1) \dots (k+9)}{10!} x^{10} + \dots \right).$$

De aquí se halla de inmediato que para $k = 1$ el coeficiente buscado es igual a 1, para $k = 2$, a 7, para $k = 3$, a 15, para $k = 4$, a 10, y para $k = 5$, a 1. Como la cantidad de franjas de cada color, para una forma dada de pintado, es la misma, y la longitud de las franjas de distinto color puede combinarse arbitrariamente, se obtienen $1^5 + 7^5 + 15^5 + 10^5 + 1^5 = 4720$ maneras de pintado.

Quitemos ahora la condición de que el último color sea azul. Si el pintado termina por el rojo, éste se encontrará una vez más que el blanco y el azul. En este caso, el número de formas es igual a $1 + 7 \cdot 1^2 + 15 \cdot 7^2 + 10 \cdot 15^2 + 1 \cdot 10^2 = 3093$. Análogamente, si el último color es

blanco, el número de maneras de pintado es igual a $1^2 + 7^2 \cdot 1 + 15^2 \cdot 7 + 10^2 \cdot 15 + 1^2 \cdot 10 = 3135$. En total, tendremos 10 948 modos.

Si ninguna franja es menor de los 3 cm, el problema se reduce al cálculo del número de representaciones de 10 como suma de k números naturales, que adquieren los valores del 3 al 10. Para $k=1$, tendremos una representación, para $k=2$, cinco; para $k=3$, tres. Por esto, el pintado terminará en el azul $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ veces, por el rojo $1 + 5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 5^2 = 81$ veces, y por el blanco $1^3 + 5^2 \cdot 1 + 3^2 \cdot 5 = 71$ veces.

236.

Como yo he almorzado una vez con todos los seis amigos, y con cada cinco dos veces, he almorzado una vez con cada quinteto de amigos en ausencia del sexto. Pero entonces almorcé 3 veces con cada cuatro (dos almuerzos de a cinco y uno de a seis), con cada tres, 4 veces, y con cada dos, 5 veces. Con cada amigo me encontré en estos almuerzos 7 veces. En consecuencia, he almorzado una vez con cada amigo, estando los dos solos. Cada amigo no estubo en 6 almuerzos (en 5 de a dos y en 1 de a cinco). Como sin cada amigo he almorzado 8 veces, habré almorzado solo 2 veces.

237.

12 alumnos pueden establecer una cola a cada examinador de 12! maneras, y a dos de ellos, de $(12!)^2$. Aquí en C_2^{12} 111 casos por lo menos un alumno deberá responder a la vez a ambos examinadores; en C_2^{12} 101 casos esta suerte la correrán dos alumnos, etc. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene que el número de formas razonables de distribución es igual a

$$(12!)^2 \left[1 - 4 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + \frac{1}{12!} \right] = \\ = 12! \cdot 176\,214\,841.$$

238.

Análogamente se obtienen las respuestas

$$(6!)^2 \left[1 - 4 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{6!} \right] = 190\,800$$

y

$$(4!)^2 - C_2^4 A_1^2 (A_2!)^2 + C_2^4 A_2^2 (A_1!)^2 - C_3^4 A_3^2 (A_1!)^2 + \\ + C_2^4 A_1^2 (A_2!)^2 - C_2^4 A_2^2 (A_1!)^2 + C_2^4 A_3^2.$$

239.

De la hipótesis se deduce que las letras iguales de la expresión $\alpha^2 \beta^2 \gamma^2$ figuran en las permutaciones de a pares. Por esto, obtenemos permutaciones de los 3 elementos $a = \alpha^2$, $b = \beta^2$, $c = \gamma^2$, siendo el número de éstas igual a 6. Lo mismo tendrá lugar para las permutaciones de las letras de la expresión $\alpha^3 \beta^3 \gamma^3$. En las permutaciones de las letras de la expresión $\alpha^4 \beta^4 \gamma^4$, las letras iguales también se encontrarán de a pares. Hagamos por ahora $\alpha^2 = a_1$, $\alpha^2 = a_2$; $\beta^2 = b_1$, $\beta^2 = b_2$ y $\gamma^2 = c_1$, $\gamma^2 = c_2$. Entonces, tendremos permutaciones de los 6 elementos $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$, cuya cantidad es igual a 720. Pero estas permutaciones se dividen en grupos que se diferencian entre sí por las permutaciones de los elementos a_1 y a_2 , b_1 y b_2 , c_1 y c_2 . En cada grupo figuran 8 permutaciones, y todas ellas corresponden a una misma permutación de letras de la expresión $\alpha^4 \beta^4 \gamma^4$. Por lo tanto, el número de permutaciones de letras de esta expresión es igual a $\frac{720}{8} = 90$.

Consideremos, por último, las permutaciones de las letras de la expresión $\alpha^5 \beta^5 \gamma^5$. Si hacemos por un momento $\alpha^2 = a_1$, $\alpha^3 = a_2$, $\beta^2 = b_1$, $\beta^3 = b_2$, $\gamma^2 = c_1$, $\gamma^3 = c_2$, cada permutación admisible de letras de la expresión $\alpha^5 \beta^5 \gamma^5$ será una permutación de las letras $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$. Pero algunas permutaciones de estas letras dan una misma permutación de las letras α, β, γ . Por ejemplo, $a_1 a_2 b_1 c_2 b_2 c_1$ y $a_2 a_1 b_2 c_1 b_1 c_2$ dan $\alpha^5 \beta^5 \gamma^5 \alpha^5 \beta^5 \gamma^5$. Esto tiene lugar si algún par de letras (a_1, a_2) , (b_1, b_2) ó (c_1, c_2) está junto. Las letras a_1 y a_2 estarán juntas en 2.5! permutaciones, al igual que las (b_1, b_2) y (c_1, c_2) . Las letras de los dos pares (a_1, a_2) y (b_1, b_2) estarán juntas en $(2!)^2 4!$ permutaciones (al igual que las de los pares (a_1, a_2) , (c_1, c_2) ó (b_1, b_2) , (c_1, c_2)). Por último, los tres pares estarán juntos en $(2!)^3 3! = 48$ permutaciones. Según la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene que en $6! - 6 \times 5! + 3(2!)^2 4! - (2!)^3 3! = 240$ permutaciones ningún par de letras estará junto, en

$$3[2 \cdot 5! - 2(2!)^2 4! + (2!)^3 3!] = 238$$

permutaciones, exactamente uno de los pares de letras (a_1, a_2) , (b_1, b_2) , (c_1, c_2) estará junto, y en

$$3[(2!)^2 4! - (2!)^3 3!] = 144$$

¹ Por un momento no se toma en cuenta que, en realidad, $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ y $c_1 = c_2$.

estarán juntas las letras de dos de estos pares exactamente. De aquí se deduce que el número buscado de permutaciones de las letras α , β , γ es igual a

$$240 + \frac{288}{|2|} + \frac{144}{(2!)^2} + \frac{48}{(2!)^3} = 426$$

(si las letras α_1 y α_2 están juntas, su permutación no cambia el orden de las letras α , β , γ).

240.

Dividamos primeramente a los jugadores de cada país en pares ordenados. Para cada país, esto se puede efectuar de $\frac{4!}{2} = 12$ formas (el orden de los propios pares no tiene importancia). En total, se obtienen 12^2 modos de partición. Los pares se pueden permutar entre sí de $(2n)!$ maneras. Por esto, la cantidad total de permutaciones admisibles es igual a $42^n (2n)!$.

241.

La primera fila horizontal se puede pintar de 8! modos. Cada horizontal siguiente debe pintarse de forma que el color de cada casilla se diferencie de la que se halle debajo de ésta. Esto se puede efectuar de

$$8! \left[1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{8!} \right] = 14\ 833$$

maneras. En virtud de la regla del producto, se obtiene que el número total de formas de pintar es igual a $8!(14\ 833)^7$.

242.

De n objetos distintos se puede efectuar una elección de 2^n formas (en ésta pueden figurar 0, 1, ..., n objetos). Después de efectuada esta elección, agreguemos los objetos que faltaban, de los n iguales. Tendremos, por esto, 2^n formas de elección. El número de permutaciones de todos los 2^n objetos es igual a $\frac{(2n)!}{n!}$.

243.

En cada permutación admisible, tanto los ingleses como los franceses estarán dispuestos en grupos, formados por no menos de dos personas. Además, el número de grupos de franceses se diferenciará del de los ingleses no en más que 1. Calculemos de cuántas maneras se pueden dividir n ingleses en p grupos ordenados, de forma

que cada uno contenga no menos de dos personas. Para esto, hay que disponerlos en algún orden (de $n!$ maneras), tomar luego el segundo, el tercero, ..., etc. hasta el intervalo $n - 2$ y colocar en ellos $p - 1$ «tabiques», de forma que no haya dos separadas por un solo elemento. Según los resultados de la pág. 60, esto se puede hacer de C_{n-1}^{p-1} maneras. En total, tendremos $n! C_{n-1}^{p-1}$ formas. Análogamente, m franceses se pueden dividir en s grupos del tipo indicado de $m! C_{m-1}^{s-1}$ modos. Estos se pueden combinar entre sí por los siguientes métodos:

- p grupos de ingleses y $p - 1$ de franceses,
 - p grupos de ingleses y p de franceses, estando primero los ingleses,
 - p grupos de ingleses y p de franceses, estando los franceses primero,
 - p grupos de ingleses y $p + 1$ de franceses.
- Por consiguiente, el número total de formas se expresa por la fórmula

$$m!n! \left[2 \left(C_0^{m-2} C_0^{n-2} + C_1^{m-3} C_1^{n-3} + \dots + C_2^{m-4} C_2^{n-4} + \dots \right) + \left(C_0^{m-2} C_1^{n-3} + \dots + C_1^{m-3} C_2^{n-4} + \dots \right) + \left(C_1^{m-3} C_0^{n-2} + \dots + C_2^{m-4} C_1^{n-3} + \dots \right) \right].$$

Abriendo paréntesis en la fórmula de la pág. 147, se obtiene el mismo resultado.

244.

Hallemos primero la cantidad de números en las que no figura la cifra cero. Las tres cifras de este número se pueden escoger de $C_3^3 = 84$ formas. De tres cifras se pueden formar 3^3 números de seis cifras; de dos, 2^3 , y de una, 1^3 . En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, existirán $3^6 - C_3^2 2^6 + C_3^1 1^6 = 540$

números de seis cifras, en las que figurarán las tres que escogimos. Por esto, la cantidad total de números de seis cifras en los que figuren exactamente tres distintas de cero, es igual a $84 \cdot 540 = 45\ 360$.

Si en el número figura el cero, hay que escoger otras dos cifras de éste. Esto se puede hacer de $C_2^3 = 36$ maneras. Supongamos que, por ejemplo, fueron elegidos el 0, el 1 y el 2. Entonces la primera cifra del número debe ser 1 ó 2. Si, por ejemplo, la primer cifra es 1, las cinco restantes pueden ser cualesquiera de las 0, 1 ó 2, con la condición de que entre ellas se encuentren el

0 y el 2. En virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene que estas cinco cifras pueden ser elegidas de

$$3^5 - C_1^5 2^5 + 1^5 = 180$$

modos. Pero entonces, el número total de números de seis cifras, formadas por las 0, 1, 2 y que contengan a todas las tres, es igual a $2 \cdot 180 = 360$; en total habrá $36 \cdot 360 = 12\,960$ números de seis cifras, formadas por tres, entre las cuales hay un cero. En total, se obtiene $45\,360 + 12\,960 = 58\,320$ números.

245.

Igual que en el problema 244, obtenemos la respuesta

$$\begin{aligned} C_0^9 [k^m - C_1^k (k-1)^m] + C_2^k (k-2)^m - \dots \\ \dots + (-1)^{h-1} C_{h-1}^k 1^m + (k-1) C_{k-1}^9 [k^{m-1} - \\ - C_1^{k-1} (k-1)^{m-1} + C_2^{k-1} (k-2)^{m-1} - \dots \\ \dots + (-1)^{h-2} C_{h-2}^{k-1} 1^{m-1}]. \end{aligned}$$

246.

Designemos el número total de arreglos de este tipo mediante $\Gamma_n^{(k)}$. Estos arreglos se dividen en dos clases. A la primera pertenecerán los que comiencen por 1, y a la segunda, todos los demás. Si el arreglo empieza por 1, restemos de todas las cifras que figuran en éste 1, y eliminemos el cero que se halla delante (por ejemplo, el 14 589 se transformará aquí primero en el 03 478, y después, en el 3478). Se obtiene entonces un $(k-1)$ -arreglo del mismo tipo, pero formado por los números 1, 2, ..., $n-1$. Por esto, el número de arreglos de la primera clase es igual a $\Gamma_{n-1}^{(k-1)}$. Cada arreglo de la segunda clase comienza por un número mayor que 1. Restemos 2 de todas las cifras de este arreglo. Se obtiene entonces un k -arreglo del mismo tipo, en el cual figuran los números 1, 2, ..., $(n-2)$. Por esto, el número de arreglos de la segunda clase es igual a $\Gamma_{n-2}^{(k)}$. De este modo, tiene lugar la fórmula de recurrencia

$$\Gamma_n^{(k)} = \Gamma_{n-1}^{(k-1)} + \Gamma_{n-2}^{(k)}.$$

Hagamos $F_n^{(k)} = C_k^N$, donde $N = E \left(\frac{n+k}{2} \right)$. Tendremos entonces:

$$F_{n-1}^{(k-1)} + F_{n-2}^{(k)} = C_{k-1}^{N-1} + C_k^{N-1} = C_k^N = F_n^{(k)}.$$

De esta forma, los números $F_n^{(k)}$ satisfacen la misma relación de recurrencia que los $\Gamma_n^{(k)}$.

Demostremos ahora que $F_n^{(n)} = \Gamma_n^{(n)}$ y que $F_{n+1}^{(n)} = \Gamma_{n+1}^{(n)}$. Para esto, obsérvese que los números 1, 2, ..., n se pueden disponer de una manera única en orden creciente, por lo cual $\Gamma_n^{(n)} = 1 = C_n^n = F_n^{(n)}$. A partir de los números 1, 2, ..., $n+1$, $n+1$ también se pueden escoger de una manera única n en correspondencia con las condiciones planteadas. Por esto, también será $\Gamma_{n+1}^{(n)} = 1 = C_n^{n+1} = F_{n+1}^{(n)}$. De lo demostrado se deduce que para todo n y k tendrá lugar la igualdad

$$\Gamma_n^{(k)} = F_n^{(k)} = C_n^N,$$

siendo, recordemos una vez más, $N = E \times \left(\frac{n+k}{2} \right)$.

247.

Los elementos dados se pueden permutar de]

$$P(2, 2, \dots, 2) = \frac{(2n)!}{2^n}$$

maneras. Hallemos en cuántas permutaciones los elementos de k pares dados se hallarán juntos. En éstas se puede unir a los elementos juntos de un mismo par. Obtenemos entonces una permutación de k elementos diferentes y de los que pertenecen a $n-k$ pares. El número de tales permutaciones es igual a $\frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}$. Como k pares pueden ser escogidos de C_k^n maneras, según la fórmula de inclusiones y exclusiones se obtiene que en

$$\begin{aligned} \frac{(2n)!}{2^n} - C_1^n \frac{(2n-1)!}{2^{n-1}} + C_2^n \frac{(2n-2)!}{2^{n-2}} - \dots \\ \dots + (-1)^n C_n^n 1 \end{aligned}$$

permutaciones no habrá dos elementos iguales juntos.

248.

En forma totalmente análoga al problema anterior, se obtiene la respuesta

$$\frac{(qn)!}{(q!)^n} - C_1^n \frac{(qn-q+1)!}{(q!)^{n-1}} + C_2^n \frac{(qn-2q+2)!}{(q!)^{n-2}} - \dots$$

249.

Los elementos dados se pueden permutar de $\frac{(qn)!}{(q!)^n}$ maneras. Calculemos en cuántas permutaciones los elementos de k conjuntos dados de q elementos estarán juntos. Tomemos uno de estos conjuntos. Sus elementos se pueden colocar juntos en la circunferencia de qn maneras. Después de ubicados éstos, unamos los elementos de cada uno de los $k-1$ conjuntos restantes y consideremos todas las permutaciones posibles de los $k-1$ nuevos elementos obtenidos y de los $(n-k)q$ restantes.

El número de éstas es igual a $\frac{(qn - qk + k - 1)!}{(q!)^{n-k}}$,

siendo fácil apreciar que a cada una de estas permutaciones le corresponde su disposición de elementos sobre la circunferencia. Por esto, el número de permutaciones en las que los elementos de k conjuntos dados estén juntos, es igual a $qn \frac{(qn - qk + k - 1)!}{(q!)^{n-k}}$. Como los propios conjuntos

se pueden escoger de C_k^n formas, se obtiene, en virtud de la fórmula de inclusiones y exclusiones, que la cantidad de permutaciones buscadas es igual a

$$qn \left[\frac{(qn-1)!}{(q!)^n} - C_1^n \frac{(qn-q)!}{(q!)^{n-1}} + C_2^n \frac{(qn-2q+1)!}{(q!)^{n-2}} - \dots + (-1)^n C_n^n (n-1)! \right].$$

250.

Agreguemos a cada libro escogido los s que le siguen. Entonces habrá que elegir p objetos de entre $n - ps$. Esto puede hacerse de C_{n-ps}^p formas.

251.

Si la diferencia de la progresión es igual a d , y el número de participantes de la olimpiada de la 5ª clase, a a , los premios pueden ser distribuidos de $A_d^a A_d^{a+d} A_d^{a+2d} \dots A_d^{a+(s-1)d}$ modos. Si, en cambio, se otorgan todos los premios a los alumnos de la 10ª clase, se los podrá distribuir de $A_d^{2a} A_d^{2a+d} A_d^{2a+2d} \dots A_d^{2a+(s-1)d}$ formas. La igualdad

$$A_d^a A_d^{a+d} A_d^{a+2d} \dots A_d^{a+(s-1)d} = A_d^{2a+5d}$$

se desprende de la identidad evidente $A_m^n A_k^{n+k} = A_{m+k}^{n+k}$.

252.

Para resolver el problema hay que considerar los segmentos y los cruces de distintas posiciones y calcular el número de caminos que pasan por éstos. Por ejemplo, por el segmento EF (fig. 36) pasan 18 caminos ($C_3^7 = 3$ conducen del punto A al E y $C_4^6 = 6$ conducen del F al C). Por el




Fig. 36.

punto E pasarán 30 caminos: de A a E conducen 3 caminos, y de E a C , $C_2^4 = 10$. Análogamente se analizan los demás segmentos y puntos.

253.

$$C_3^4 = 20.$$

254.

Tenemos combinaciones con repetición de elementos de 4 tipos, tomados de a tres. Su número es igual a

$$\overline{C}_3^4 = C_3^4 = 20.$$

255.

$$\overline{C}_3^9 = C_3^{12} = 220.$$

256.

4 triángulos.

257.

Si no hubiese 3 de los n puntos sobre una misma recta, habría C_3^n triángulos con vértices en estos

puntos. Pero p puntos se hallan en una misma recta, por lo cual C_p^2 triángulos deben ser desechados. Quedan $C_p^2 - C_p^1$ triángulos.

258.

Se pueden tomar dos vértices sobre una misma recta y el tercero sobre otra. Por esto, se obtienen

$$C_p^2 C_q^1 + C_p^1 C_q^2 = \frac{pq}{2} (p + q - 2) \text{ triángulos.}$$

259.

Se agregarán

$$C_2^r (C_1^p + C_1^q) + C_1^r (C_2^p + C_2^q) + C_1^r C_1^p C_1^q = \\ = \frac{r}{2} (p+q)(p+q+r-2)$$

triángulos.

260.

Los triángulos pueden ser de dos tipos: o los tres vértices se hallan en distintos lados del cuadrado, o dos se hallan en un lado y el tercero, en algún otro. En el primer caso, hay que escoger tres lados del cuadrado de entre cuatro (hay $C_3^4 = 4$ formas de elección), y luego tomar, en cada uno de los tres, un punto de entre $n-1$. En total, tendremos $4(C_{n-1}^2)^3$ maneras de elección. En el segundo caso, hay que escoger el lado en que se hallarán los dos vértices (son 4 modos de elección) y dos puntos de entre $n-1$ (C_{n-1}^2 formas), eligiendo después uno de los tres lados restantes (tres maneras) y un punto en éste (C_{n-1}^1 modos). En total tendremos, en el segundo caso, $12C_{n-1}^2 C_{n-1}^1$ maneras de elección. La cantidad total de formas será

$$4(C_{n-1}^2)^3 + 12C_{n-1}^2 C_{n-1}^1 = 2(n-1)^2(5n-8).$$

261.

C_p^2 puntos de intersección.

262.

n rectas en posición general tendrán C_n^2 puntos de intersección. Pero las p rectas que pasan por el punto A darán un punto de intersección, en lugar de C_p^2 , y las q que pasan por B , uno en lugar de C_q^2 . Por esto, quedarán $C_n^2 - C_p^2 - C_q^2 + 2$ puntos de intersección.

263.

Supongamos que en el plano se han trazado $k-1$ rectas. Tracemos una más. Esta se divide por los puntos de intersección con las trazadas anteriormente en k partes, cada una de las cuales corresponde a una nueva región del plano. Por esto, n rectas dividen el plano en $1 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$ partes.

264.

Supongamos que ya se han trazado $k-1$ planos. Tracemos uno más. Este se interseca con los planos trazados antes por $k-1$ rectas, las cuales lo dividen en $\frac{1}{2}(k^2 - k + 2)$ partes. Cada una de éstas corresponde a una nueva región del espacio. Por esto, n planos dividirán el espacio en

$$1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k^2 - k + 2) = \\ = \frac{1}{6}(n+1)(n^2 - n + 6)$$

partes.

265.

Se han trazado $C_3^2 = 40$ rectas. Por cada punto, por ejemplo, por el C , pasan 4 rectas. Por lo tanto, de este punto parten 6 perpendiculares. Tomemos dos puntos arbitrarios, por ejemplo, el B y el C . Las perpendiculares trazadas desde B a las rectas que pasan por C , intersecan todas las trazadas desde C . De C parten 3 rectas que no pasan por B . Por consiguiente, de B se pueden trazar 3 perpendiculares a éstas. Ellas se intersecan con las trazadas desde C en $3 \cdot 6 = 18$ puntos. Cada una de las perpendiculares trazadas desde el punto B a las otras 3 rectas que pasan por C corta sólo a 5 perpendiculares trazadas desde C , puesto que ésta es paralela a una de estas perpendiculares, por ser ambas normales a una misma recta. Se obtienen 15 puntos más. En consecuencia, las perpendiculares trazadas desde dos puntos se intersecan en $18 + 15 = 33$ puntos. Pero de 5 puntos se pueden formar 10 pares. Esto nos daría $33 \cdot 10 = 330$ puntos de intersección, pero algunos de éstos coinciden. Precisamente, 3 puntos cualesquiera de los 5 dados forman un triángulo. Las alturas de éste (que son algunas de nuestras perpendiculares) se

intersecan en un mismo punto, el cual hemos considerado 3 veces. Como hay $C_3^4 = 10$ de estos triángulos, deben eliminarse 20 puntos, quedando 340 puntos posibles de intersección.

266.

Tres números enteros cualesquiera x, y, z , que satisfagan las desigualdades $n+1 \leq x, y, z \leq 2n$, pueden ser lados de un triángulo. Por esto, el número de triángulos con tales lados es igual a $C_3^n = C_3^{2n-2}$. Para hallar la cantidad de triángulos isósceles, obsérvese que, para una base dada, tendremos n triángulos isósceles. Por consiguiente, el número total de éstos es igual a n^2 . El número de triángulos equiláteros es igual a n .

267.

Hay que hallar la cantidad de ternas de números naturales x, y, z , tales que $x \leq y \leq z \leq 2n$ y $x+y > z$. Sea dado $x = p$. Entonces y toma los valores de p a $2n$. Cuando y toma los valores de p a $2n-p+1$, a cada valor de y corresponden p de z , que satisfagan las desigualdades $y \leq z < y+p, z \leq 2n$. Si, en cambio, y toma los valores de $2n-p+2$ a $2n$, el número de valores correspondientes de z será igual a $2n-y+1$. En total, para un $x = p$ dado, se obtienen

$$2p(n-p+1) + \sum_{y=2n-p+2}^{2n} (2n-y+1) = \\ = 2pn - \frac{3}{2}p^2 + \frac{3}{2}p$$

para (y, z) tales que x, y, z satisfacen a las condiciones planteadas. De aquí se deduce que el número total de triángulos, para los cuales $1 \leq x \leq n$ y $1 \leq y, z \leq 2n$, es igual a

$$\sum_{p=1}^n \left(2pn - \frac{3}{2}p^2 + \frac{3}{2}p \right) = \frac{n}{2}(n+1)^2.$$

En virtud del problema 266, existen C_3^{n+2} triángulos, para los cuales $x \geq n+1$. Por esto, en total tendremos

$$\frac{n}{2}(n-1)^2 + \frac{n(n+1)(n+2)}{6} = \frac{n(n+1)(4n+5)}{6}$$

triángulos.

El número de triángulos isósceles de base $x=2k$, es igual a $2n-k$, y los de base $2k+1$, también a $2n-k$. Por esto, la cantidad total de triángulos isósceles es igual a

$$\sum_{k=1}^n (2n-k) + \sum_{k=0}^{n-1} (2n-k) = 3n^2.$$

Eliminándolos, obtenemos

$$\frac{n(n+1)(4n+5)}{6} - 3n^2 = \frac{n(n-1)(4n-5)}{6}$$

triángulos.

268.

Este problema se resuelve en forma semejante al 267. El número de triángulos con un valor dado de $x = p \leq n-1$, es igual a $2np - \frac{3}{2}p^2 + \frac{p}{2}$, y el de todos los triángulos para los que $x \leq n-1$, es

$$\sum_{p=1}^{n-1} \left(2np - \frac{3}{2}p^2 + \frac{p}{2} \right) = \frac{n(n+1)(n-1)}{2}.$$

En cambio, el número de triángulos para los que $x \geq n$, es igual a C_3^{n+2} , por lo cual tendremos, en total,

$$\frac{n(n+1)(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)(n+2)}{6} = \\ = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}$$

triángulos. El número de triángulos isósceles es igual a

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2n-k-1) + \sum_{k=0}^{n-1} (2n-k-1) = 3n^2 - 3n + 1,$$

y el de escalenos, a

$$\frac{n(n+1)(4n-1)}{6} - 3n^2 + 3n - 1 = \\ = \frac{1}{6}(n-1)(n-2)(4n-3).$$

269.

Como se toman n puntos de intersección y no hay tres de ellos sobre una misma recta, en cada recta habrá dos, y sólo dos, puntos del grupo escogido.

Por esto, para fijar este grupo se numeran las rectas dadas y se escoge en la primera de ellas el punto de intersección con la segunda, en la segunda, el de intersección con la tercera, ..., en la n -ésima, el de intersección con la primera. Se obtiene así el grupo buscado de puntos, y todos estos grupos se pueden obtener mediante el método descrito. Teniendo en cuenta que la permutación cíclica de los puntos y el cambio del orden del recorrido de éstos no cambian el grupo de puntos, se obtiene que el número de

éstos es igual a $\frac{P_n}{2n} = \frac{1}{2}(n-1)!$.

270.

Podemos elegir r vértices, que vayan en un orden dado, de A_r^n formas. Como una permutación cíclica de éstos y la inversión del orden de su recorrido no cambian el polígono, se obtienen $\frac{1}{2r} A_r^n$ polígonos.

271.

Tomemos dos puntos en una recta y dos en la otra. A éstos los corresponden dos puntos de intersección de las rectas que pasan por ellos (el punto de intersección de las diagonales del trapecio y del de intersección de sus costados). Como sobre la primera recta se pueden tomar C_2^n pares de puntos, y sobre la segunda, C_2^n , el número de puntos de intersección es igual a $2C_2^n C_2^n$.

272.

Los n puntos determinan C_2^n circunferencias. Entre ellas, C_2^{n-1} pasan por un punto dado, y C_2^{n-2} , por dos puntos dados. Por esto, la recta que pasa por dos puntos dados tiene no más de $2C_2^{n-2} + (2C_2^{n-1} - C_2^{n-2}) + 2$ puntos de intersección con las circunferencias. Como por n puntos pasan C_2^n rectas, tendremos no más de

$$C_2^n [2C_2^{n-2} + 2C_2^{n-1} - C_2^{n-2} + 2]$$

puntos de intersección.

273.

Cada recta de la intersección se determina por dos planos, y cada plano, por tres puntos dados. Las rectas se dividen en clases, según cuántos puntos de los que determinan el primer plano figuren entre los que determinan el segundo. Todos los puntos serán distintos en $\frac{1}{2} C_2^n C_2^{n-3}$ casos (se esco-

gen tres puntos entre n y otros tres entre los $n-3$ restantes, sin tener importancia su orden de elección). Si un punto figura en ambas ternas, se obtienen $\frac{3}{2} C_2^n C_2^{n-3}$ formas de elección, y si son dos los puntos que figuran en ambas ternas, $\frac{3}{2} C_2^n C_2^{n-3}$. En total, tendremos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} C_2^n (C_2^{n-3} + 3C_2^{n-3} + 3C_2^{n-3}) &= \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n^2+2)}{72} \end{aligned}$$

rectas. Entre ellas,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} C_2^n C_2^{n-3} &= \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{72} \end{aligned}$$

no pasarán por ninguno de los puntos dados.

274.

Designemos los lados del cuadrilátero mediante a, b, c, d . Sin perder generalidad, se puede considerar que a es el menor de los lados, c es el lado opuesto a éste, y que $b < d$. Entonces, será $a < b < d$ y $a < c$. Además, como los cuadriláteros están circunscritos a una circunferencia, será $a + c = b + d$. De aquí se deduce que $a + c > 2b$. Por esto, para valores dados de a y b , la longitud de c puede adquirir valores de $2b - a + 1$ a n , y debe cumplirse la desigualdad $2b - a \leq n - 1$.

De esta forma, hemos demostrado que $b \leq \frac{a+n-1}{2}$ y que $2b - a + 1 \leq c \leq n$. Designemos mediante s a $E\left(\frac{a+n-1}{2}\right)$. Entonces, para un valor dado de a , tendremos

$$\sum_{b=a+1}^s (n+a-2b) = (s-a)(n-s-1)$$

cuadriláteros.

Sea n un número par, $n = 2m$. Entonces, para valores impares de a , $a = 2k - 1$, tendremos $s = E\left(\frac{n+a-1}{2}\right) = m + k - 1$ y, por consiguiente, $(m-k)^2$ cuadriláteros, y para a pares, $a = 2k$, será $s = E\left(\frac{n+a-1}{2}\right) = m + k - 1$

habiendo, por ende, $(m - k - 1)(m - k)$ cuadriláteros. Sumando con respecto a a , se obtiene que el número total de cuadriláteros es igual a

$$\sum_{k=1}^m (m-k)^2 + \sum_{k=1}^m (m-k)(m-k+1) = \frac{m(m-1)(4m-5)}{6} = \frac{n(n-2)(2n-5)}{24}.$$

El caso en que n es impar se estudia análogamente.

Si se admite que los cuadriláteros tengan lados iguales, a, b, c, d habrán de satisfacer las relaciones $a \leq b \leq d \leq n$, $a \leq c$ y $a + c = b + d$, de donde se deduce que $b \leq \frac{a+n}{2}$ y $2b - a \leq$

$\leq c \leq n$. Si hacemos $E\left(\frac{a+n}{2}\right) = s$, el número de cuadriláteros con el valor dado de a será igual a $(n - s + 1)(s - a + 1)$.

Para un valor par de n , se obtienen $\frac{n(n+2)(2n+5)}{24}$ cuadriláteros, y para n impar, $\frac{(n+1)(2n^2+7n+3)}{24}$.

275.

El número de circunferencias trazadas es igual a C_2^n , pasando C_2^{n-1} por un punto dado, y C_1^{n-2} por dos puntos dados. Tomemos una de estas circunferencias, trazada por los puntos A, B, C . Tendremos $C_2^n - 3C_2^{n-1} + 3C_1^{n-2} - 1$ circunferencias que no pasen por ninguno de estos puntos. La circunferencia escogida se interseca con cada una de ellas en dos puntos. Ahora bien, existen $3(C_2^{n-1} - 2C_1^{n-2} + 1)$ circunferencias que pasan por uno de los puntos A, B, C y no pasan por dos de ellos. Estas nos dan un punto de intersección cada una, distinto de A, B, C . Las demás circunferencias se intersecan con la elegida en dos de los puntos A, B, C . De este modo, la circunferencia tomada nos da

$$2(C_2^n - 3C_2^{n-1} + 3C_1^{n-2} - 1) + 3(C_2^{n-1} - 2C_1^{n-2} + 1) = \frac{(n-3)(n-4)(2n-1)}{6}$$

puntos de intersección, distintos de A, B, C . En total, obtenemos

$$\frac{1}{2} C_3^n \frac{(n-3)(n-4)(2n-1)}{6} = \frac{5(2n-1)}{3} C_3^n$$

puntos de intersección distintos de los dados. Agregando estos n puntos, se obtiene que la mayor cantidad de puntos de intersección es igual a

$$\frac{5(2n-1)}{3} C_3^n + n.$$

276.

Al agregar el plano $k + 1$ a los k trazados antes ($k = 1, 2, \dots$), se obtienen $2k$ regiones nuevas, habiendo en total $2 + 2 + 4 + 6 + \dots + 2(n-1) = n^2 - n + 2$.

277.

La cantidad total de formas de pintar 6 caras de 6 colores distintos es igual a $6! = 720$. Dividamos estas formas en clases, formadas por los pintados que pueden hacerse coincidir mediante movimientos. El cubo se puede hacer coincidir consigo mismo de 24 maneras (de 6 modos se escoge la cara en la que se transformará una cara dada del cubo, después de lo cual quedan 4 giros de éste, en los que la cara dada se transforma en sí misma). Por esto, cada clase está formada por 24 formas de pintado, siendo el número de formas geoméricamente distintas de pintado igual a $720/24 = 30$.

278.

Se resuelve en forma análoga al problema 277. El número de formas de pintado es igual a $4!/12 = = 2$.

279.

Existen $8!/24 = 1680$ modos de pintado.

280.

Para el dodecaedro hay $12!/60$ formas de pintado, y para el icosaedro, $20!/60$.

282. Hay que hallar la cantidad de ternas de números naturales x, y, z , tales que $x \leq y \leq z$, $x + y + z = 40$ y $x + y > z$. De estas desigualdades se desprende que z puede tomar valores que satisfagan a las desigualdades $14 \leq z \leq 19$. Si $z = 19$, será $x + y = 21$, siendo $x \leq y \leq 19$. Por esto, será $11 \leq y \leq 19$, y tendremos 9 triángulos con $z = 19$. Análogamente se establece que el número de triángulos, para los cuales $z = 18, 17, 16, 15, 14$, es igual a 8, 6, 5, 3, 2 respectivamente, habiendo en total 33 triángulos. De la misma forma se obtiene que el número de triángulos de perímetro 43 es igual a 44.

283.

Tomemos un triángulo de perímetro $4n$. Supongamos que sus lados son iguales a x, y, z . Agregando 1 a las longitudes de estos lados, se obtienen los números $x+1, y+1, z+1$, que son longitudes de los lados de un triángulo de perímetro 43 . Pero, además, tendremos triángulos de lados $(1, 2n+1, 2n+1), (2, 2n, 2n+1), \dots, (n+1, n+1, 2n+1)$, que no pueden ser obtenidos por el método descrito.

284.

Sea $N = 12n$. Debemos hallar la cantidad de ternas de números naturales x, y, z , tales que $x < y < z, x + y + z = 12n$ y $x + y > z$. De estas desigualdades se deduce que $4n < z < 6n - 1$. Además, si $z = 2k$, será $x + y = 12n - 2k$, y el número de soluciones enteras de esta ecuación, tales que $x < y < z = 2k$, será igual a $3k - 6n + 1$. Si, en cambio, es $z = 2k + 1$, tendremos $3k - 6n + 2$ soluciones. Por esto, el número de triángulos es igual a

$$\sum_{k=2n}^{3n-1} (3k - 6n + 1) + \sum_{k=2n}^{3n-1} (3k - 6n + 2) = 3n^2.$$

Los casos restantes se analizan de igual forma. Al pasar de N a $N + 3$ se pueden utilizar razonamientos análogos a los efectuados en la resolución del problema 282.

285.

Demostremos que cada parada la tienen exactamente n recorridos. Sea l uno de los recorridos, y B , una parada situada fuera de este recorrido




Fig. 37.

(fig. 37). En virtud de la condición 1, de la parada B se puede llegar por uno de los recorridos a cada una de las n paradas A_1, \dots, A_n del

recorrido l . Además, según la condición 2, cada uno de los recorridos que pasa por B pasa por una de las paradas A_1, \dots, A_n (de otro modo, no se podría pasar de este recorrido al B) y sólo por una de ellas (de otra manera se podría pasar de este recorrido al l en dos paradas). Tampoco hay dos recorridos que pasen por B y por una misma parada del recorrido l (de otra forma, se podría pasar de uno de estos recorridos a otro en dos paradas: en la B y en la parada del recorrido




Fig. 38.

l por la que pasan ambos). De aquí se deduce que por la parada B pasan tantos recorridos, cuantas paradas existan en el recorrido l , es decir, exactamente n .

Nos queda por demostrar que por cada una de las paradas A_1, \dots, A_n , situadas en el recorrido l , pasan también exactamente n recorridos. Para esto, es suficiente demostrar que para cualquiera de estas paradas existe un recorrido l' que no pase por ella (éste tiene, por hipótesis, n paradas, y entonces, como sabemos, por esta parada pasarán n recorridos). Como el número total de recorridos no es menor que dos, además de l existirá por lo menos otro recorrido l' (fig. 38), que se intersectará con l en un punto único, digamos, el A_1 . Entonces, las paradas A_2, \dots, A_n estarán situadas fuera del recorrido l' , por lo que pasarán n recorridos por ellas. Sea B otra parada en el recorrido l' . El recorrido que pasa por B y A_2 no pasa por A_1 , por lo cual también pasarán exactamente n paradas por A_1 . Así pues, por cualquier parada pasan exactamente n recorridos.

Como para cada parada se puede hallar un recorrido que no pase por ella, y en cada recorrido

hay n paradas, por cada parada pasarán n recorridos. Tomemos uno de estos recorridos l . Por cada parada de éste pasan $n - 1$ recorridos, distintos del l , sin que haya dos de ellos que coincidan, en virtud de la condición 2 (de otro modo, tendrían dos paradas comunes), y cualquier recorrido figura entre los que se obtienen por este método. De esta forma, el número de recorridos distintos del l es igual a $n(n - 1)$, teniendo en total $n(n - 1) + 1$ recorridos.

286.

Supongamos que en uno de los recorridos l hay n paradas. De la resolución del problema 285 queda claro que por cualquier parada B , que se halle fuera de l , pasan exactamente n recorridos. Demostremos que en un recorrido arbitrario l' , distinto del l , hay exactamente n paradas. En virtud de la condición 3, en l' hay no menos de tres paradas y, según la 2, sólo una de éstas es al mismo tiempo parada del recorrido l . Fuera del l' , están situadas $n - 1$ paradas del recorrido l . Demostremos que, además de esto, fuera de l' hay por lo menos otra parada más, que no se encuentra en l . En efecto, sea A_1 una de las $n - 1$ paradas del recorrido l , situadas fuera del l' , y C_1 , una de las paradas del recorrido l' , situadas fuera del l (hay no menos de 2 de estas paradas). En virtud de la condición 4, existe un recorrido l'' que pasa por las paradas A_1 y C_1 . Además, por la condición 3, en este recorrido habrá, además de A_1 y C_1 , por lo menos otra parada B_1 , la cual estará situada fuera de l' y de l . Por esta parada B_1 , como sabemos por la resolución del problema 285, pasan n recorridos. Cada uno de ellos se intersecta con el l' en un punto único. Además, por cada parada del recorrido l' pasa por lo menos uno que la une con la B . Por esto, el número de paradas del recorrido l' es igual al de recorridos que pasan por la parada B , es decir, a n .

Como hemos visto en la resolución del problema 285, en este caso el número de recorridos se expresa mediante la fórmula $n(n - 1) + 1$. Como por hipótesis, este número es igual a 57, hay que resolver la ecuación $n^2 - n + 1 = 57$. Haciéndolo, hallamos que $n = 8$.

287.

Es posible. Tomemos, por ejemplo, 10 rectas del plano, tales que no haya dos paralelas ni tres que se intersecten en un mismo punto, y consideraremos que las rectas son recorridos de autobús, y los puntos de intersección de éstas son las para-

das. Aquí se puede viajar de cualquier parada a cualquier otra sin hacer transbordos, si se hallan en una misma recta, y con un solo transbordo, si lo están en rectas diferentes. Si inclusive se elimina una recta de este esquema, de todos modos existirá la posibilidad de viajar de cada parada a cualquier otra, efectuando en el camino no más de una transbordo. Pero si se eliminan dos rectas, una parada — el punto de intersección de éstas — no será atendida en absoluto por los recorridos restantes, y desde ésta será imposible viajar a cualquier otra.

288.

La esfera puede ser tangente a cualquier plano por uno de sus dos lados, y a una esfera dada, desde adentro o desde afuera. Por esto, se pueden trazar 16 esferas distintas.

289.

Cada una de las m rectas trazadas por el punto A se intersecta con $2m$ rectas. Por esto, las que pasan por A dan $2m^2$ puntos de intersección. La cantidad total de tales puntos, diferentes de los tres dados, es igual a $3m^2$.

290.

Designemos los puntos que se hallan sobre un mismo plano mediante A_1, \dots, A_m , y los restantes, por B_1, \dots, B_{n-m} . Cada plano se determina por la elección de tres puntos. Entre éstos puede haber tres, dos, uno, o ningún punto de los A_1, \dots, A_m . En correspondencia con esto, se obtiene que la cantidad de planos es igual a

$$1 + C_2^n C_1^{n-m} + C_1^n C_2^{n-m} + C_3^{n-m}.$$

291.

El número de puntos de intersección que se hallan en cada una de las rectas que pasa por A , es igual a $n + p$, por B , a $m + p$, y por C , a $m + n$. Como por A pasan m rectas, por B , n y por C , p , el número total de puntos de intersección es igual a

$$\frac{1}{2} [m(n+p) + n(m+p) + p(m+n)] = mn + mp + np.$$

De éstos se puede elegir de $C_m^{mn+mp+np}$ maneras una terna de puntos, pero en $mC_2^{n+p} + nC_2^{m+p} + pC_2^{m+n}$ casos obtendremos puntos que se hallen

sobre una misma recta. Por esto, el número de triángulos es igual a

$$C_3^{m+n+mp+np} - mC_3^{n+p} - nC_3^{m+p} - pC_3^{m+n}.$$

292.

Tomemos arbitrariamente el primer vértice del triángulo. Esto puede hacerse de n maneras. Después, debemos elegir otros dos vértices entre $n-3$ puntos, que no estén junto al dado, de forma que tampoco lo estén entre sí. Esto puede hacerse de C_2^{n-4} maneras (véase la pág. 60). Como cualquiera de los tres vértices se puede considerar primero, tendremos $\frac{n}{3} C_2^{n-4} = \frac{n(n-4)(n-5)}{6}$ modos de elección.

293.

Dividamos todos los triángulos en dos clases: aquellos cuyos vértices se hallen en distintas rectas, y aquellos en los que dos vértices estén sobre una misma recta. El número de triángulos de la primera clase es igual a $p^3 C_3^n$ (escogemos de C_3^n modos las tres rectas en que se hallarán los vértices, después de lo cual se elige, en cada una de ellas, un punto de entre p). El número de triángulos de la segunda clase es igual a $\frac{1}{2} p^2 (p-1) n (n-1)$ (escogemos la recta en que se hallarán los dos vértices, luego dos puntos en ella, después de lo cual se toma una recta, donde estará un solo vértice, y un punto en esta recta). El número total de triángulos es igual a

$$p^3 C_3^n + \frac{1}{2} p^2 (p-1) n (n-1) = \frac{n(n-1)p^2(pn+p-3)}{6}.$$

294.

Cada punto interior de intersección de las diagonales se determina unívocamente fijando 4 vértices del polígono de n lados que son los extremos de las diagonales que se cortan. Por esto, su número es igual a C_4^n . Hallemos ahora la cantidad total de puntos de intersección de las diagonales. De cada vértice del polígono de n lados parten $n-3$ diagonales, teniendo en total $\frac{n(n-3)}{2}$ diagonales. Cada diagonal AB se corta con todas las que unen los vértices distintos de A y B . Por

esto, habrá

$$\frac{n(n-3)}{2} - 2(n-3) + 1 = \frac{(n-3)(n-4)}{2} + 1$$

puntos de intersección de la diagonal AB con las restantes. Como el número total de diagonales es igual a $\frac{n(n-3)}{2}$, y cada punto de intersección se toma en consideración dos veces, tendremos, en total,

$$\frac{n(n-3)[n-3](n-4)+2}{8}$$

puntos de intersección de las diagonales. Restando de esto número la cantidad de puntos interiores de intersección, se obtiene que el número de puntos exteriores de intersección es igual a

$$\frac{n(n-3)(n-4)(n-5)}{12}.$$

295.

Cada polígono de r lados se determina por la elección de r puntos de entre n , tomados en un orden determinado; además, una permutación cíclica de los puntos no provoca un cambio de este polígono, así como tampoco lo hace el cambio de la orientación. Por esto, el número de polígonos de r lados es igual a $\frac{1}{2r} A_r^n$ y, en general, el número

de polígonos es $\sum_{r=3}^n \frac{1}{2r} A_r^n$. El número de polígonos

convexos es igual a $\sum_{r=3}^n C_r^n$.

296.

m rectas paralelas dividen el plano en $m+1$ franjas. Cada nueva recta agrega tantas regiones, en cuantas partes se divide por las rectas ya trazadas. Como trazamos n rectas más, se obtienen

$$m+1 + (m+2) + \dots + (m+n) = \frac{n(2m+n+1)}{2}$$

regiones.

297.

Dividamos las circunferencias en clases, según la cantidad de puntos dados que se hallen en la circunferencia dada. Una circunferencia (preci-

samente, la dada) los contiene todos, $C_2^3 C_1^4$ circunferencias contienen a dos puntos, $C_1^4 C_2^3$, a uno, y C_3^2 , a ninguno. En total, obtenemos $1 + C_2^3 C_1^4 + C_1^4 C_2^3 + C_3^2 = 156$ circunferencias.

298.

A cada tres rectas les corresponden 4 circunferencias tangentes a ellas. Por esto, en total tendremos $4C_3^3 = 480$ circunferencias.

299.

Escojamos s vértices seguidos del polígono de n lados A_1, \dots, A_s y dividamos todos los polígonos de k lados, que satisfagan la condición planteada en el problema, en dos clases. A la primera haremos pertenecer todos los polígonos de k lados, uno de cuyos vértices coincida con uno de los elegidos, y a la segunda, los restantes. Los polígonos de la primera clase se dividen en s subclases, según cuál de los vértices A_m , $1 \leq m \leq s$, pertenezca a éste (es evidente que estas subclases no tienen elementos comunes).

Hallemos el número de polígonos de k lados, en los cuales uno de los vértices es A_m . Para esto, eliminemos el vértice A_m y los s vértices que le siguen, en el sentido de las agujas del reloj (ninguno de ellos es vértice del polígono de k lados). Debemos elegir, de entre los $n - s - 1$ vértices restantes, $k - 1$, de forma que después de cada uno de ellos haya no menos de s vértices elegidos. Esto se puede hacer de C_{n-k-1}^{n-k-1} maneras (véase el problema 250). Por esto, el número de polígonos de k lados con vértice A_m es igual a C_{n-k-1}^{n-k-1} , y el número total de polígonos de la primera clase, a sC_{n-k-1}^{n-k-1} .

Hallemos ahora el número de polígonos de k lados de la segunda clase. Para esto, escotemos la circunferencia entre los vértices A_s y A_{s+1} . Hay que escoger k vértices, de forma que después de cada uno elegido haya por lo menos s que quedaron (sin que sea elegido ninguno de los vértices A_1, \dots, A_s). Esto se puede efectuar de C_{n-k}^{n-k} maneras. De este modo, el número total de polígonos de k lados que satisfacen la condición planteada es igual a $sC_{n-k-1}^{n-k-1} + C_{n-k}^{n-k}$.

300.

Cada paralelogramo se determina por dos pares de rectas paralelas. Por esto, tendremos $(C_2^{2+2})^2$ paralelogramos.

301.

Trazaremos sucesivamente las diagonales desde los vértices A_1, A_2, \dots, A_n . Cada nueva diagonal nos da tantas regiones nuevas, en cuantas partes se divide por las trazadas anteriormente, es decir, en una región más que el número de puntos de intersección de ésta con las diagonales que se han trazado antes. Como cada punto de intersección se obtiene aquí una sola vez, el número total de nuevas regiones es igual a la suma del número de puntos de intersección y del de diagonales. Como al principio teníamos una región, en total habrá

$$1 + \frac{n(n-3)}{2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} = \frac{n(n-3)(n^2-3n+14)}{24} + 1$$

partes (véase el problema 294).

302.

Sea n par, $n = 2k$. Entonces n se puede representar de las siguientes maneras como suma de dos términos:

$$n = 1 + (2k-1) = 2 + (2k-2) = \dots = k + k.$$

Pero la carta con número 1 puede ser extraída de una sola forma, con 2, de dos, etc. Y dos cartas con número $k > 1$ se pueden escoger de C_k^2 modos. Por esto, tendremos en total

$$1(2k-1) + 2(2k-2) + \dots + (k-1)(k+1) + \frac{k(k-1)}{2} = \sum_{s=1}^{k-1} s(2k-s) + \frac{k(k-1)}{2} = \frac{2k(k^2-1)}{3} = \frac{n(n^2-4)}{12}$$

maneras de obtener una suma de $n = 2k$. Si, en cambio, n es impar, $n = 2k-1$, entonces

$$n = 1 + (2k-2) = 2 + (2k-3) = \dots = (k-1) + k,$$

siendo el número de formas igual a

$$\sum_{s=1}^{k-1} s(2k-s-1) = \frac{k(k-1)(2k-1)}{3} = \frac{n}{12}(n^2-1).$$

303.

Dividamos las elecciones en clases, según el número de objetos iguales que figuran en ellas. La cantidad de elecciones que contengan k objetos iguales es igual a C_{n-k}^{2n+1} . Por esto, el número total de elecciones será igual a

$$C_n^{2n+1} + C_{n-1}^{2n+1} + \dots + C_0^{2n+1} = \\ = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2n+1} C_k^{2n+1} = 2^n.$$

304.

Si el primer término de la progresión es igual a a y su diferencia a d , el tercero será igual a $a + 2d$. Por hipótesis es $a + 2d \leq 2n$. Esta desigualdad tiene, para un d fijo, $2n - 2d$ soluciones. En total, se obtienen

$$(2n-2) + (2n-4) + \dots + 2 = n(n-1)$$

soluciones. Como cada progresión obtenida se puede considerar tanto creciente como decreciente, se obtienen $2n(n-1)$ progresiones. Para la sucesión de número 1, 2, 3, ..., $2n+1$, tendremos $2n^2$ progresiones.

305.

Demostremos la afirmación mediante inducción con respecto al número s de curvas. Si $s = 1$, ésta es evidente, ya que no hay puntos de intersección y el número de regiones es igual a 1. Supongamos que la afirmación ya fue demostrada para s curvas. Tomemos un sistema de s curvas, con n_r puntos de intersección de multiplicidad r , $r = 2, 3, \dots$ (un punto será de multiplicidad r , si en éste se intersecan r curvas). Entonces, éstas delimitan $1 + n_2 + \dots + rn_{r+1} + \dots$ regiones cerradas. Tracemos la curva $s+1$, y supongamos que ésta tiene k_r puntos de intersección, de multiplicidad r , con las trazadas anteriormente, $r = 2, 3, \dots$, y, en total, $k_2 + k_3 + \dots + k_{r+1}$ puntos de intersección. Estos puntos la dividen en $k_2 + k_3 + \dots + k_{r+1}$ partes. Cada parte de la curva trazada corresponde a una nueva región, por lo cual el número de éstas será ahora igual a

$$(1 + n_2 + \dots + rn_{r+1} + \dots) + (k_2 + \\ + k_3 + \dots + k_{r+1} + \dots). (*)$$

Pero si la nueva curva pasa por un punto de intersección de multiplicidad r de las trazadas

anteriormente, ahora éste será un punto de intersección de multiplicidad $r+1$.

Sea n'_r el número de puntos de multiplicidad r en el nuevo sistema de curvas. Está claro que $n'_{r+1} = n_{r+1} - k_{r+1} + k_r$ (de los puntos de intersección de multiplicidad $r+1$ que había hay que restar k_{r+1} , de multiplicidad $r+1$, que aumentan a ésta, y agregar k_r , de multiplicidad r y que la aumentan). Pero entonces

$$1 + n'_2 + 2n'_3 + \dots + rn'_{r+1} = \\ = 1 + (n_2 - k_3 + k_2) + 2(n_3 - k_4 + k_3) + \dots \\ \dots + r(n_{r+1} - k_{r+1} + k_r) + \dots = \\ = (1 + n_2 + 2n_3 + \dots + rn_{r+1} + \dots) + \\ + (k_2 + k_3 + \dots + k_{r+1} + \dots)$$

Hemos demostrado, así, que $1 + n'_2 + 2n'_3 + \dots + rn'_{r+1} + \dots$ es igual al número de regiones para el nuevo sistema de curvas (véase la fórmula (*)). En virtud del principio de inducción completa, la afirmación es válida para cualquier número de curvas.

306.

Las rectas del primer haz dividen el plano en $2m$ partes. La primera recta del segundo haz se interseca con todas las m del primero, dando $m+1$ regiones nuevas. Todas las rectas restantes del segundo haz tendrán $m+1$ puntos de intersección con las trazadas antes. Por esto, tendremos en total

$$2m + m + 1 + (n-1)(m+2) = nm + 2n + 2m - 1$$

regiones.

307.

No, pues en caso contrario el número de uniones sería igual al número fraccionario $\frac{77 \cdot 15}{2}$.

308.

La suma de los coeficientes es igual al valor de la expresión para $x = y = z = 1$. Sustituyendo estos valores, se obtiene que la suma es igual a -1 .

309.

El número máximo de bolas, entre las que no haya 15 iguales, es igual a 74 (10 blancas, 10 negras, 12 amarillas y de a 14 de las rojas, verdes y azules). Si se toman 75 bolas, habrá entre ellas 15 de un mismo color.

340.

Clasifiquemos las formas de pintado según el número de caras blancas. Existe una forma única de pintado que no contenga ninguna cara blanca, y una que contenga una sola. En el caso de dos caras blancas, habrá dos formas de pintado: o bien estas caras tienen una arista común, o bien son opuestas. Para tres caras blancas nuevamente tendremos dos formas: o hay dos caras blancas opuestas, o las tres confluyen en un mismo ángulo. Los casos de 4, 5 y 6 caras blancas se reducen a los que acabamos de analizar, sustituyendo los colores por los opuestos. En total, se obtienen $1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10$ formas de pintado.

341.

Supongamos que ahora se pintan los vértices del cubo. Entonces hay una forma de pintar sin vértices blancos, 1 forma con un solo vértice blanco, 3 con dos (los vértices blancos se hallan en una misma arista, en una diagonal de una cara o en una del cubo), 3 con tres (los tres vértices se hallan en una misma cara, o bien hay dos




Fig. 39.

en una arista y el tercero en una diagonal de la cara con uno de estos dos vértices, o bien los tres vértices se hallan dos a dos en una diagonal de una cara, véase la fig. 39). Hay 5 formas de pintado con cuatro vértices blancos (todos los cuatro se hallan en una misma cara, o los tres

vértices A, B, C se hallan en una cara y el cuarto en una misma arista que al A , o que al B , o en el vértice diametralmente opuesto al B ; o bien dos vértices se hallan en una misma arista y otros dos en la diametralmente opuesta a ella). Los casos de 5, 6, 7 y 8 vértices blancos se reducen




Fig. 40.

a los analizados más arriba cambiando los colores por los opuestos. En total, habrá $1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 + 1 + 1 = 21$ formas de pintado.

342.

El cubo tiene 11 desarrollos (fig. 40). Las seis primeras soluciones las dan los desarrollos en los que cuatro caras del cubo están situadas en una banda del desarrollo. Los cuatro desarrollos siguientes son aquellos en los cuales hay tres caras en una banda, pero no cuatro. Por fin, en la última solución no hay tres caras en ninguna banda.

343.

Hay sólo 4 formas de este pintado. Con respecto a la demostración de esto, referimos al lector al libro de H. Steinhaus «Cien Problemas», ed. Fizmatgiz, 1959, problema № 40.

314.

Para un tetraedro existe una sola solución; para un octógono también una sola; para un octaedro, tres; para un dodecaedro, dos asimétricas y recíprocamente simétricas, y para el icosaedro, 33 soluciones. Véase la demostración detallada en el libro citado de H. Steinhaus, problema № 44.

315.

Demostremos primeramente que al cabo de 2^n unidades de tiempo quedarán sólo dos partículas, situadas en los puntos con coordenadas 2^n y -2^n respectivamente. Para $n=1$, esta afirmación es evidente. Supongamos que ya fue demostrada para $n=k$. En el transcurso de los 2^k-1 pasos siguientes, estas partículas no interactúan y, en virtud de la hipótesis de la inducción, al cabo de 2^k pasos cada una de ellas dará sólo dos partículas, alejadas de ellas a la izquierda y a la derecha en 2^k . En otras palabras, obtenemos una partícula en el punto 2^{k+1} , dos en el O y una en el -2^{k+1} . Las partículas del punto O se aniquilan mutuamente, quedando dos partículas. La afirmación queda demostrada.

Así, pues: al cabo de 128 pasos quedarán dos partículas en los puntos de coordenadas 128 y -128 . Y al cabo de 129 pasos, habrá cuatro partículas en los puntos 129, 127, -127 y -129 .

Si $n=2^{k_1}+2^{k_2}+\dots+2^{k_s}$, $k_1 > k_2 > \dots > k_s$,

obtenemos 2^s partículas, cuyas coordenadas tienen la forma $\pm 2^{k_1} \pm 2^{k_2} \pm \dots \pm 2^{k_s}$ (se admiten combinaciones cualesquiera de los signos). Esta afirmación se demuestra fácilmente mediante inducción con respecto a s : para $s=1$, ya la hemos demostrado. Supongamos que ya fue demostrada para $s < m$, y que $n=2^{k_1}+2^{k_2}+\dots+2^{k_m}$. Entonces, después del $(n-2^{k_m})$ -ésimo paso obtendremos 2^{m-1} partículas, dispuestas en los puntos de coordenadas $\pm 2^{k_1} \pm 2^{k_2} \pm \dots \pm 2^{k_{m-1}}$. La distancia entre las partículas más próximas no es menor que $2^{k_{m-1}+1}$. Por esto, en el transcurso de $2^{k_m}-1$ pasos, las partículas, generadas por distintos «centros», no interactuarán unas con las otras, pero al cabo de 2^{k_m} pasos cada centro dará dos partículas, que se hallen a una distancia de $\pm 2^{k_m}$ de éste. En otras palabras, obtenemos partículas en los puntos de la forma $\pm 2^{k_1} \pm \dots \pm 2^{k_m}$. Nuestra afirmación queda demostrada.

316.

Para descifrar una palabra, es suficiente indicar los intervalos entre los símbolos que son iniciales para las letras que se codifican con dos símbolos. Estos intervalos deben ser escogidos de entre 11, y no puede haber dos de ellos juntos (hay en total 13 intervalos, considerando el inicial y el final, pero de la hipótesis queda claro que no se puede tomar ni el final, ni el que se halla delante de éste). Si la palabra contiene p letras de dos símbolos, hay que escoger p intervalos. Esto se puede efectuar de C_{13}^{p-1} maneras. Por esto, habrá

$$C_3^3 + C_4^1 + C_5^1 + C_6^1 + C_7^1 + C_8^1 + C_9^1 = 233$$

formas de leer la palabra dada.

317.

La cantidad de números de p cifras, cuya escritura no contenga la unidad, es igual a $8 \cdot 9^{p-1}$. Por lo tanto, entre 1 y 10 000 000 habrá

$$8(1+9+9^2+9^3+9^4+9^5+9^6) = 97-1 = 4782968$$

números cuya escritura no contenga 1. Esto es menos que la mitad de 10^7 .

318.

Tomemos los tres primeros símbolos de cada palabra. Estos forman no más de $2^3=8$ disposiciones. Demostremos que a cada disposición de estos símbolos le corresponde no más de dos palabras. Diciendo de otro modo, demostremos que si tres palabras tienen los tres primeros símbolos comunes, por lo menos dos de ellas tendrán otros dos símbolos comunes. En efecto, escribamos una tabla, formada por los cuatro últimos símbolos de cada una de estas tres palabras. En cada columna coincidirán por lo menos dos signos. Como el número de pares que pueden formarse de tres palabras es igual a 3, y el de columnas, a cuatro, por lo menos para dos palabras la coincidencia tendrá lugar en dos columnas. Esto significa, precisamente, que las palabras tienen otros dos símbolos que coinciden, habiendo en total 5 signos coincidentes, lo que contradice la hipótesis.

De este modo, a cada agrupación de los tres primeros símbolos le corresponden no más de dos palabras. Por esto, el número total de ellas no es mayor que 16. En la fig. 41 se representan 16 palabras que satisfacen la condición planteada.




Fig. 41.

319.

Como p es un número primo, al girar la circunferencia se transforman en sí mismos sólo los pintados hechos con un mismo color. El número de los primeros es igual a n . Las demás formas de pintado (el número de ellas es igual a $n^p - n$) se dividen en clases, con p pintados cada una, transformándose los pintados de una misma clase unos en otros al girar la circunferencia. Por esto, ellos darán $\frac{n^p - n}{p}$ formas de pintado. En total,

habrá $\frac{n^p - n}{p} + n$ modos. En la resolución de este problema hemos demostrado el llamado pequeño teorema de Fermat: si p es un número primo, para cualquier n entero el número $n^p - n$ se divide por p .

320.

Como 1 es el menor de los números dados, éste debe estar en una esquina, y el 2 debe estar junto a él en una misma vertical u horizontal. Entonces, los números 1, 2, ..., n quedarán en una misma vertical u horizontal. El menor de los números restantes es el $n + 1$. Este debe

ocupar su lugar junto al 1. Continuando este razonamiento, nos convencemos de que los números se disponen de una forma única, y determinada. Pero podemos colocar primero al 1 en cualquiera de las esquinas del tablero y elegir la dirección vertical, o la horizontal, para la sucesión 1, 2, ..., n . Por esto, habrá 8 disposiciones.

321.

En caso contrario, la población de Moscú sería mayor que 9 300 000.

322.

Si se toma un número impar de objetos, el número de los que quedaron es par.

323.

El número de formas de cambiar 1 rublo en monedas de 2 y 5 kopeks es igual al de soluciones enteras no negativas de la ecuación $2x + 5y = 100$. Está claro que y puede tomar cualquier valor par de 0 a 20. Al cambiar en monedas de 5 y 3 kopeks, hay que resolver la ecuación $3x + 5y = 100$. Aquí y adquiere sólo los valores 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, el número de los cuales es menor que 21.

324.

Hay que hallar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x + 2y + 5z = 20$ o, lo que es lo mismo, de la desigualdad $2y + 5z \leq 20$. Está claro que z puede tomar sólo 0, 1, 2, 3 y 4 valores, a los que corresponden 11, 8, 6, 3 y 21 valores posibles de y , obteniéndose, en total, 49 soluciones.

325.

Como $3 = 2 + 1$, $4 = 2 + 2$, $6 = 5 + 1$, $7 = 5 + 2$, $8 = 5 + 2 + 1$, $9 = 5 + 2 + 2$, mediante las pesas indicadas se puede formar cualquier peso entero de 1 a 9 mg. Análogamente se forman los pesos que se expresan en decenas, centenas de miligramos, etc.

326.

El valor medio de la última cifra es igual a 2, el de la segunda y la tercera, a 2,5, y el de la primera, a 3. La cantidad total de números es igual a $5 \cdot 6 \cdot 3 = 540$. Por esto, su suma es igual a $540(3000 + 250 + 25 + 2) = 1\ 769\ 580$.

327.

La afirmación es evidente para $r = 1$: después del primer paso la carta que se hallaba en el p -ésimo lugar, para $p \leq n$, quedará en el lugar $2p$, y para $p > n$, en el $2p - 2n - 1$. En ambos casos el número del nuevo lugar es el resto de dividir $2p$ por $2n + 1$. Supongamos que la afirmación ya fue demostrada para r , es decir, supongamos que después de r pasos la carta con número p ocupó el lugar x , siendo $2^r p = k(2n + 1) + x$. En el paso siguiente, ésta ocupará el lugar y , donde $2x = l(2n + 1) + y$, $l = 0$ ó 1 . Pero entonces

$$2^{r+1}p = 2k(2n + 1) + 2x = (2k + l)(2n + 1) + y,$$

siendo $y < 2^{r+1}p$. Esto significa que y es el resto de dividir $2^{r+1}p$ por $2n + 1$. Según el principio de inducción completa, nuestra afirmación queda demostrada.

328.

Se desprende directamente del resultado del problema 327.

329.

Se deduce del resultado del problema 327.

330.

En efecto, en este caso el resto de la división de $2^x p$ por $2n + 1$ es igual a p .

331.

Efectivamente, después de la carta con número $2n$ habrá $2n - 1$ cartas con números pares, las cuales, precisamente, quedarán sobre la carta $2n$.

332.

La afirmación con respecto a la carta 8 se deduce del resultado del problema 331. Las demás se verifican directamente.

333.

Escribamos debajo del número de cada carta el que ésta obtendrá después de la mezcla indicada:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 8 10 7 11 6 12 5 13 4 14 3 15 2 16 1 (*)

De esta tabla se aprecia que, por ejemplo, al mezclar una vez la 1 pasa a la 9, en la segunda, la 9 pasa a la 13, después la 13 a la 15, luego

la 15 a la 16 y, por último, la 16 pasa a la 1. Esto se puede representar en forma del ciclo (1, 9, 13, 15, 16, 1). Toda la permutación se divide en ciclos de este tipo. Además del que acabamos de indicar, se tienen los ciclos (2, 8, 5, 11, 14, 2), (3, 10, 4, 7, 12, 3) y un ciclo formado sólo por el número 6. Cada ciclo está formado por una o por 5 cifras distintas, por lo cual, después de cinco veces, todas las cartas ocuparán la posición inicial. Los casos restantes se estudian de igual forma.

334.

En la primera fila podemos distribuir los colores en cualquier orden (24 modos), después de lo cual en la primera columna podemos disponer de cualquier manera los tres colores distintos del cuadrado angular (6 formas). Supongamos que se han elegido los colores indicados en la tabla.

b	n	r	a
n	b	a	r
r	a	b	n
a	r	n	b

Como en las filas verticales y horizontales debe haber representantes de todos los colores, en la segunda fila puede haber una de las siguientes combinaciones de colores: negro, blanco, azul, rojo; negro, rojo, azul, blanco; negro, azul, blanco, rojo. En la primera de estas variantes se determina unívocamente el color de las casillas de la segunda columna vertical, quedando dos posibilidades de pintar las 4 casillas restantes. Cada una de las dos variantes que quedan conduce también a dos pintados posibles. En total, se obtienen $4! \cdot 3! \cdot 2 \cdot 3 = 144$ formas de pintado.

335.

Dividamos a los escolares en ternas de algún modo. De cada terna se pueden escoger tres pares no ordenados (por ejemplo, de la terna abc se pueden elegir los pares ab , ac , bc). En total, a la forma dada de partición le corresponden 15 pares, ninguno de los cuales debe encontrarse

en las demás maneras de partición. Pero de 15 escolares se pueden formar $C_3^{15} = 105$ pares. Por esto, el número de modos diferentes de partición no puede superar $105 : 15 = 7$. La tabla siguiente muestra que el valor 7 se alcanza, es decir, que los escolares se pueden dividir en ternas, de forma que se cumpla la condición indicada durante 7 días:

<i>klo</i>	<i>ino</i>	<i>jmo</i>	<i>ilm</i>	<i>jln</i>	<i>ijk</i>	<i>kmn</i>
<i>iab</i>	<i>jac</i>	<i>lad</i>	<i>nae</i>	<i>kaf</i>	<i>mag</i>	<i>oah</i>
<i>ncd</i>	<i>máb</i>	<i>kbc</i>	<i>oeg</i>	<i>mch</i>	<i>lce</i>	<i>icf</i>
<i>mef</i>	<i>keg</i>	<i>ieh</i>	<i>jjb</i>	<i>obe</i>	<i>ofd</i>	<i>ide</i>
<i>igh</i>	<i>lhj</i>	<i>nfg</i>	<i>khá</i>	<i>idg</i>	<i>nhb</i>	<i>lbg</i>

336.

El número $\frac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$ es igual a la cantidad de formas de escoger, de n^2 objetos, n grupos no ordenados de n objetos cada uno y es, por lo tanto, un entero. También lo será el número $\frac{(mn)!}{(m!)^n m!}$, que

es la cantidad de formas de dividir mn objetos en n grupos no ordenados, de m objetos cada uno. Por la misma causa será entero $\frac{(mn)!}{(n!)^m m!}$.

Pero entonces $\left[\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}} (n!)^{\frac{m+1}{2}}} \right]^2$ también lo

es, como producto de dos enteros. Como m y n son impares, $\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}} (n!)^{\frac{m+1}{2}}}$ es racional, siendo

su cuadrado un entero. Por consiguiente, el propio número es también entero.

337.

Véase la pág. 52.

338.

Este número es igual al coeficiente de x^m en el polinomio

$$(x^1 + x^{1+1} + \dots + x^n)^p = x^{1p} (1 - x^{n-1+1})^p (1-x)^{-p}.$$

Aplicando la fórmula del binomio de Newton, se obtiene que este coeficiente es igual a

$$C_m^{p-1} - C_m^{(1-1)p-1} = C_1^{p-1} C_{m-1}^{m-(1-1)(p-1)-n-1} + \\ + C_2^{p-2} C_{m+2}^{m-(1-1)(p-2)-2n-1} - \dots$$

339.

Designemos mediante x, y, z el número de libros del primero, segundo y tercer tipo, obtenidos por el primer participante. Por la hipótesis del problema, se tiene que $x + y + z = 12$, siendo $0 \leq x \leq 7, 0 \leq y \leq 8, 0 \leq z \leq 9$. El número de soluciones enteras de la ecuación, que satisfagan las desigualdades dadas, es igual al coeficiente de t^{12} en el desarrollo del producto

$$(1+t+\dots+t^7)(1+t+\dots+t^8)(1+t+\dots+t^9).$$

Este producto se puede escribir como sigue:

$$\frac{(1-t^8)(1-t^9)(1-t^{10})}{(1-t)^3} = \\ = (1-t^8-t^9-t^{10}+t^{17}+\dots) \times \\ \times (1+3t+6t^2+10t^3+15t^4+\dots+91t^{12}+\dots).$$

Está claro que después de abrir paréntesis se obtiene el coeficiente 60 para t^{12} . Por esto, la distribución puede ser efectuada de 60 maneras.

340.

El número de todas las n -combinaciones con repetición de n letras es igual a C_n^{n-1} ; por lo tanto, en éstas figuran nC_n^{n-1} letras. Como todas figuran igual número de veces, cada una se encuentra C_n^{n-1} veces.

341.

La suma de los números escritos en el poste es igual a 999. Por esto, si ambos números son de tres cifras y uno de ellos tiene la forma abc , el otro tendrá la forma $9-a, 9-b, 9-c$. Si, en cambio, uno de los números es de una o dos cifras, el segundo comenzará a partir de la cifra 9, estando escrito en tales postes $a, 99(9-a)$ ó $a\bar{b}, 9(9-a)(9-b)$. Como en los postes debe haber sólo dos cifras distintas, será ó $a = b = c$, ó bien dos de los números a, b, c coinciden, siendo el tercero el complemento de éstos hasta 9. La cantidad de números del primer tipo es igual a 10 (111, 222, ..., 999 y, además, el 0). Cada número del segundo tipo se determina por la elección de un par de cifras distintas del número de tres cifras en el que ambas figuran. Un par de cifras diferentes se puede escoger de $C_3^2 = 45$ formas distintas. A cada par le corresponden 6 números de tres cifras (por ejemplo, 221, 212, 122, 112, 121, 211). Por esto, la cantidad total

de números de segundo tipo es igual a $6 \cdot 45 = 270$, habiendo, en total, 280 postes, en los cuales hay escritas sólo dos cifras diferentes.

342.

El número buscado es $\sum_{p=0}^m \sum_{q=0}^n P(p, q) - 1$. (Elimi-

namos el arreglo vacío.) Como $\sum_{q=0}^n P(p, q) = P(p+1, q)$, tendremos:

$$\begin{aligned} & \sum_{p=0}^m \sum_{q=0}^n P(p, q) - 1 = \\ & = \sum_{p=0}^m P(p+1, n) - 1 = P(m+1, n+1) - 2. \end{aligned}$$

343.

Según el problema anterior, el número de arreglos que contienen exactamente k esferas blancas es igual a $P(k+1, n+1) - P(k, n+1)$.

Por esto, las esferas blancas figuran $\sum_{k=1}^n k [P(k+1, n+1) - P(k, n+1)]$ veces. Esta expresión se transforma como sigue:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^m kP(k+1, n+1) - \sum_{k=0}^{m-1} (k+1) \times \\ & \times P(k+1, n+1) = mP(m+1, n+1) - \\ & - \sum_{k=0}^{m-1} P(k+1, n+1) = mP(m+1, n+1) - \\ & - P(m, n+2) + 1 = \\ & = 1 + \frac{m+1}{n+2} P(m+1, n+1). \end{aligned}$$

Análogamente se demuestra la afirmación sobre las esferas negras.

344.

El número buscado es igual a la suma

$$\sum_{p=0}^m \sum_{q=0}^n (p+q+1) P(p, q).$$

Pero

$$\begin{aligned} & \sum_{q=0}^n (p+q+1) P(p, q) = \\ & = (p+1) \sum_{q=0}^n P(p, q) + \sum_{q=1}^n qP(p, q) = \\ & = (p+1) [P(p+1, n) + \sum_{q=1}^n P(p+1, q-1)] = \\ & = (p+1) [P(p+1, n) + P(p+2, n-1)] = \\ & = (p+1) P(p+2, n). \end{aligned}$$

Por esto, la suma es igual a

$$\begin{aligned} & \sum_{p=0}^m (p+1) P(p+2, n) = \\ & = \sum_{p=0}^m (p+2) P(p+2, n) - \sum_{p=0}^m P(p+2, n) = \\ & = (n+1) P(m+1, n+2) - P(m+2, n+1) + 1 = \\ & = 1 + \frac{mn+m+n}{m+n+4} P(m+2, n+2). \end{aligned}$$

345.

Sumando los resultados obtenidos en los problemas 342 y 344, se obtiene el resultado requerido.

346.

El número total de pares que se pueden formar de 7 personas es igual a $C_2^7 = 21$. En cada terna (a, b, c) figuran 3 pares $((a, b), (a, c)$ y $(b, c))$. Por esto, durante 7 días todos los pares estarán representados una vez cada uno. Por cuanto en el transcurso de 7 días almorzarán 21 personas, cada amigo me visitará 3 veces, es decir, participará en tres ternas.

Escojamos primero las ternas en las que estará el primer amigo. Esto puede hacerse de $\frac{6!}{(2!)^3}$ maneras (el número de formas de dividir a 6 personas en 3 pares). Cuando estas ternas estén escogidas, quedarán dos posibilidades de elegir las ternas en las que figure el segundo huésped (por ejemplo, si el primero figura en las ternas 1, 2, 3; 4, 4, 5; 1, 6, 7, el segundo estará o en las ternas 2, 4, 6; 2, 5, 7, ó en las 2, 4, 7; 2, 5, 6). Después de esto, la distribución de los restantes

huéspedes se determina unívocamente. Teniendo en cuenta la posibilidad de permutar la terna de huéspedes, se obtienen

$$\frac{6!}{(2!)^3 3!} \cdot 2 \cdot 7! = 151\,200 \text{ modos.}$$

347.

De 7 personas se pueden formar $C_3^7 = 35$ ternas, de 6, $C_3^6 = 20$, de cinco, $C_3^5 = 10$, y de cuatro, $C_3^4 = 4$. Por esto, el número total de variantes de invitación es igual a A_7^{95} . En $7A_7^{29}$ casos un amigo quedará sin invitar, y en $21A_7^{19}$, dos. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene el resultado requerido.

348.

Si uno de los amigos viene cada día, con los restantes se pueden formar $C_2^5 = 15$ pares. Por esto, el número total de grupos, en los que toma parte una misma persona, es igual a $7A_7^{15}$. Quedan $A_7^{25} - 7A_7^{15}$ formas de invitación.

349.

Los arreglos pueden estar formados por 1, 2, ..., n objetos. Por esto, el número total de arreglos es igual a

$$\begin{aligned} A_n^n + A_{n-1}^n + \dots + A_1^n &= n! + \\ + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \dots + \frac{n!}{(n-1)!} &= \\ = n! \left[2 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right]. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} en! - 1 &= n! \left[2 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right] + \\ + \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \right. & \\ \left. + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots \right], & \quad (*) \end{aligned}$$

Pero para todo $n \geq 2$ natural, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \\ + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots < \\ < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^3} + \dots = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por esto, la expresión que se halla entre corchetes en la fórmula (*) es menor que $\frac{1}{2}$. Con esto queda demostrada nuestra afirmación.

350.

El número total de objetos de todos los arreglos es igual a

$$\begin{aligned} nA_n^n + (n-1)A_{n-1}^n + \dots \\ \dots + A_1^n = n! \left[n + \frac{n-1}{1!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right] = \\ = (n-1)n! \left[\left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2!} - \frac{2}{3!} - \dots - \frac{n-2}{(n-1)!} \right) \right]. \end{aligned}$$

Es fácil comprobar que

$$1 - \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} - \frac{3}{4!} - \dots - \frac{n-2}{(n-1)!} = \frac{1}{(n-1)!}.$$

Como todos los objetos figuran un mismo número de veces, cada uno de ellos figurará

$$\begin{aligned} N = (n-1)(n-1)! \times \\ \times \left[1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right] + 1 \end{aligned}$$

veces.

Por otro lado,

$$\begin{aligned} (n-1)(n-1)! e &= (n-1)(n-1)! \times \\ \times \left[1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} + \right. & \\ \left. + \frac{1}{(n+1)!} + \dots \right] &= (n-1)(n-1)! \times \\ \times \left[1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \right] + & \\ + (n-1) \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n(n+1)} + \dots \right], & \end{aligned}$$

por lo cual

$$\begin{aligned} N - (n-1)(n-1)! e &= 1 - (n-1) \times \\ \times \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n(n+1)} + \dots \right] &= \\ = \frac{1}{n} \left[1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \dots \right] &< \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, N es el entero más próximo a $(n-1)(n-1)!e$.

351.

Véase la pág. 53.

352.

Uno de los tres obtiene n libros. Estos n libros pueden ser elegidos de C_n^k maneras. Los $2n$ libros restantes los distribuiremos entre las dos personas que quedan. Cada uno de los libros puede tocarle a una o a otra, por lo cual el número de formas de distribución de éstos es igual a 2^{2n} . Como n libros pueden ser dados a cualquiera de los tres, se obtienen $3 \cdot 2^{2n} C_n^k$ modos de distribución.

353.

El número de ordenaciones distintas, en las que k pares dados de letras no se destruyan, es igual a $2^k (2n - k)!$. Estos k pares pueden ser elegidos de C_n^k maneras. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene el resultado requerido.

354.

El número de formas de distribución, en las que k personas dadas no obtengan ningún objeto, es igual a $(n + p - k)^r$. Aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, se obtiene el resultado requerido.

355.

$n! \Pi_r^n$ es igual al número de formas de distribuir n objetos distintos en r cajones. Este número es igual al coeficiente de x^n en el desarrollo de $(e^x - 1)^r$, multiplicado por $n!$. De aquí se desprende que

$$n! [1 - \Pi_2^n + 2! \Pi_3^n - 3! \Pi_4^n + \dots]$$

es el coeficiente de x^n en el desarrollo de la suma de la serie

$$(e^x - 1) - \frac{1}{2} (e^x - 1)^2 + \frac{1}{3} (e^x - 1)^3 -$$

$$- \frac{1}{4} (e^x - 1)^4 + \dots$$

Como

$$x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 + \dots = \ln(1 + x), \quad (*)$$

la suma de esta serie será igual a $\ln[1 + (e^x - 1)] = x$. Por esto, para $n > 1$ la expresión (*) es igual a cero.

356.

De la primera casilla, de una forma, de la segunda, de C_n^{2n} , ...; de la k -ésima, de C_n^{kn} . En total, tendremos

$$C_n^{2n} C_n^{3n} \dots C_n^{mn} = \frac{(mn)!}{(n!)^m}$$

modos.

357.

Hay que demostrar la desigualdad

$$C_n^{2n+r} C_n^{2n-r} \leq (C_n^{2n})^2.$$

La podemos escribir en la forma

$$\frac{(2n+r)(2n+r-1)\dots(2n+1)}{(n+r)(n+r-1)\dots(n+1)} \leq \frac{2n(2n-1)\dots(2n-r+1)}{n(n-1)\dots(n-r+1)}.$$

Esta desigualdad se deduce de que, para $0 \leq k < n$, será

$$\frac{2n+k}{n+k} < \frac{2n-k}{n-k}.$$

358.

Calculemos la suma de los ángulos de todos los triángulos obtenidos. La suma de los que tienen vértice en uno de los puntos interiores es igual a 360° . Como hay 500 de estos puntos, a éstos les corresponden ángulos cuya suma es igual a $360^\circ \cdot 500$. Ahora tomemos los ángulos cuyos vértices coinciden con los del polígono de 1000 lados. Su suma es igual a la de los ángulos interiores de dicho polígono, es decir, a $180^\circ \cdot 998$. En total, obtenemos $180^\circ \cdot 998$. Como la suma de los ángulos de cada triángulo es igual a 180° , hemos obtenido 1998 triángulos.

359.

Cada jugador jugará 4 partidos, habiéndose jugado 5 en total. Supongamos que en el primer partido el par (a, c) jugó contra el (b, d) . Entonces, en los tres juegos siguientes a debe tener por compañeros a b, d, e respectivamente, y no tomar parte en el quinto. El jugador e debe tomar parte en todos los partidos, a excepción del primero, siendo en el segundo y el tercero contrincante de a . En el lugar libre del segundo partido se puede tomar al jugador c o al d , y en el tercero, al

b o al *c*. Pero si se elige en el segundo partido al *d*, en el tercero habrá que escoger al *c* (de otro modo, *c* dejará pasar dos partidos), y entonces en el cuarto partido deberá faltar el jugador *d*, siendo *b* y *c* compañeros. Pero entonces en el quinto serán compañeros *b* y *e*, por un lado, y *c* y *d* por otro. Si elegimos en el segundo partido al jugador *e*, en el tercero habrá que escoger también al *c* (de otra forma *e* y *c* serán dos veces compañeros), en el cuarto, a *c* y *d*, y en el quinto los jugadores *b* y *c* jugarán contra *d* y *e*. Así, pues, cada elección de los jugadores del primer partido determina dos posibles divisiones de los jugadores en lo sucesivo. Como el orden de los 4 partidos siguientes puede ser cambiado de 24 maneras, obtenemos en total 48 posibilidades. Para el primer partido, se puede elegir a los jugadores de 15 formas (el número de maneras de dividir a 5 personas en 2 pares y dejar un jugador de reserva). Cada una de estas formas determina 48 posibilidades de la marcha del juego en lo sucesivo, habiendo, en total, 720 posibilidades. Si no se tiene en cuenta el orden de los partidos, quedarán 6 posibilidades.

360.

El número de quebradas cerradas es igual a $(C_n^{2n})^2$ (véase la pág. 92).

361.

Cada quebrada se determina por las coordenadas de sus vértices. Estas coordenadas forman una sucesión finita del tipo

$$(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2), (a_2, b_3), \dots, (a_n, b_1),$$

o bien

$$(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_2), \dots, (a_1, b_n).$$

Estas sucesiones se determinan fijando las permutaciones (a_1, \dots, a_n) y (b_1, \dots, b_n) e indicando a cuál de los dos tipos pertenece la sucesión. Como una permutación cíclica de las coordenadas no cambia a la quebrada, el número de éstas es igual a $\frac{(n!)^2}{2n}$.

362.

Dividamos los sonajeros en clases, haciendo pertenecer a la *m*-ésima a aquellos para los cuales el mínimo número de bolas azules entre las dos rojas es igual a *m*. Para *m* = 0, hay 4 sonajeros (la tercera bola roja está junto a las otras dos, o está separada de ellas por una, dos o tres bolas

azules). Para *m* = 1, hay dos bolas rojas, separadas por una azul. La tercera bola roja puede estar separada de la roja más próxima por una, dos o tres azules. Por esto, para *m* = 1 hay 3 tipos de sonajeros. Para *m* = 2, tendremos sólo un tipo de sonajero. En total, hay 8 tipos.

363.

Supongamos que uno de los presentes — llamémoslo *X* — tiene *m* conocidos a_1, \dots, a_m . Por hipótesis, no hay dos personas entre las a_1, \dots, a_m que se conozcan entre sí (ya que se conocen con *X*). Por esto, para dos personas cualesquiera a_i, a_j debe existir otro conocido común, amén de *X*. Esta persona no puede conocerse con *X*, y a distintos pares les corresponderán distintas personas (si alguien fuese conocido común para dos pares diferentes (a_i, a_j) y (a_k, a_l) , tendría con *X* por lo menos tres conocidos comunes). Así, pues, el número de todas las personas que no se conocen con *X* no es menor que el de todos los pares de personas de entre las a_1, \dots, a_m , es decir, no es menor que C_m^2 . Por otro lado, cada persona que no se conozca con *X* tiene con él exactamente dos conocidos comunes, se sobreentiende, entre los a_1, \dots, a_m . Además, a distintas personas les corresponderán distintos pares (si un par (a_i, a_j) correspondiese a dos personas diferentes, a_i y a_j tendrían más de dos conocidos comunes, por cuanto son conocidos también con *X*). De aquí se deduce que el número de personas que no se conocen con *X* es también no mayor que C_m^2 , por lo cual debe ser igual a $C_m^2 = \frac{m(m-1)}{2}$. Pero entonces el número

total *n* de presentes es igual a $1 + m + \frac{m(m-1)}{2}$.

Considerando la igualdad $n = 1 + m + \frac{m(m-1)}{2}$

como una ecuación cuadrática con respecto a *m*, vemos que ésta tiene sólo una raíz positiva, lo cual significa, precisamente, que para todas las personas el número *m* de sus conocidos es el mismo.

364.

La verificación demuestra que la permutación de dos letras vecinas *A* y *B* no cambia el producto (es suficiente analizar las combinaciones *ABBA*, *BABB* y *AABB*). Por esto, se puede considerar que primero van todas las letras *A*, y después, todas las *B*. Pero entonces la afirmación se hace evidente.

365.

En cada vertical y en cada horizontal hay una torre. Por esto, cada uno de los números a, b, c, d, e, f, g, h , al igual que cada uno de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, figurará en el producto exactamente una vez. Por esto, el producto es igual a $8! abcdefgh$.

366.

Supongamos que se han reunido 5 miembros del Comité de Organización. Por la hipótesis del problema, éstos no tienen llaves por lo menos de una cerradura, y la llave de ésta la tienen cada uno de los seis miembros restantes. Como esto tiene lugar para cualquier combinación de 5 miembros, el número total de cerraduras es igual a $C_5^6 = 462$. Como para cada cerradura hay seis llaves, la cantidad total de éstas es igual a $462 \cdot 6 = 2772$, teniendo cada miembro del Comité de Organización $2772 : 41 = 252$ llaves.

Si el número de miembros fuese igual a n , y el de miembros necesarios y suficientes para que se pueda abrir la caja, a m , el número de cerraduras sería C_{m-1}^n , y el de llaves de cada miembro de la Comisión, a $\frac{n-m+1}{n} C_{m-1}^n$.

367.

Aclaremos primero cuál es la mayor longitud de la cadena, tal que después de romper k eslabones se pueda obtener cualquier peso de 1 a n . Analicemos, para esto, cuál es la disposición más ventajosa de los eslabones abiertos. Como el número de éstos es igual a k , con ellos se puede obtener cualquier peso de 1 a k . Pero ya no podremos obtener el peso $k+1$, sin utilizar una parte más. Está claro que lo más ventajoso es que esta parte esté formada por $k+1$ eslabones; entonces, podremos obtener cualquier peso, del 1 al $2k+1$. Ahora nos serán necesarias las partes de los pesos $2(k+1), 4(k+1), \dots, 2^h(k+1)$. Con ayuda de éstos podremos obtener cualquier peso, del 1 al

$$\begin{aligned} n &= k + [(k+1) + 2(k+1) + 4(k+1) + \dots \\ &\dots + 2^h(k+1)] = k + (k+1)(2^{h+1} - 1) = \\ &= 2^{h+1}(k+1) - 1. \end{aligned}$$

De este modo, si $2^h k \leq n \leq 2^{h+1}(k+1)$, podremos arreglarnos con k rupturas, pero será imposible arreglárselas con $k-1$. En particular, como $2^2 \cdot 3 \leq 60 \leq 2^4 \cdot 4 - 1$, para una cadena de 60 eslabones hay que abrir 3 de ellos, obteniendo los trozos de 4, 8, 16 y 29 g.

Si se utiliza una balanza de dos platillos, a los k eslabones abiertos hay que agregar el trozo de peso $2k+1$ (poniéndolo en un platillo de la balanza, y los eslabones restantes, en el otro, podremos obtener cualquier peso, de $k+1$ a $2k$, y colocándolo conjuntamente con los eslabones restantes, cualquier peso del $2k+1$ al $3k+1$). Los trozos restantes deben tener peso 3 ($2k+1$), 9 ($2k+1$), \dots , $3^h(2k+1)$. Con éstos se puede obtener cualquier peso, del 1 al

$$\begin{aligned} k + [(2k+1) + 3(2k+1) + \dots + 3^h(2k+1)] &= \\ &= \frac{1}{2} [(2k+1) 3^{h+1} - 1]. \end{aligned}$$

En particular, para una cadena de 60 g hay que abrir dos eslabones, obteniendo trozos de peso 5, 15 y 38 g.

368.

Si x , al dividirse por 7, da restos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x^2 dará los restos 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1 respectivamente. Por esto, $x^2 + y^2$ se divide por 7 (y , con mayor razón, por 49) sólo en el caso en que x e y se dividan por 7. Por esto, el número de pares (teniendo en cuenta el orden), es igual a

$$\left[E \left(\frac{1000}{7} \right) \right]^2 = 142^2 = 20164. \text{ Si no se tiene en cuenta el orden, se obtiene } \overline{C}_2^{142} = 10153 \text{ pares.}$$

369.

Si el número dado es igual a $10a + b$, sumándolo con el número escrito con las mismas cifras en orden inverso, se obtiene $11(a+b)$. Como esto es un cuadrado perfecto, y $2 \leq a+b \leq 18$, será $a+b=11$. Obtenemos 8 posibilidades: 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.

370.

Las tres primeras cifras del número son arbitrarias, y la última toma uno de dos valores (determinados por el resto de la división de la suma de las tres primeras cifras por 3). Por esto, si en algún lugar se fija una cifra, las demás se pueden elegir de $6^2 \cdot 2 = 72$ maneras. En consecuencia, la suma de las cifras de la primera columna es igual a $72(1+2+3+4+5+6) = 1512$, siendo la suma de todos los números igual a $1512 + 15120 + 151200 + 1512000 = 1679832$.

371.

En el último lugar puede haber una de las cifras 0, 2, 4. Si se fija una de ellas, los lugares segundo y tercero pueden ser ocupados por cualquiera

de las seis cifras, y el primero, cualquiera de las cinco 1, 2, 3, 4, 5. En total, se obtienen $3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 6 = 180$ posibilidades. Por consiguiente, la suma de las cifras de la primera columna es igual a $(2 + 4) \cdot 180 = 1080$. Análogamente se halla que la suma de las cifras de la segunda columna es igual a $(1 + 2 + 3 + 4 + 5) \cdot 900 = 13\,500$; de la tercera, $135\,000$, y de la cuarta, $1\,620\,000$. En total se obtiene la suma $1\,769\,580$.

372.

La ecuación $x + y = k$ tiene $k - 1$ soluciones enteras, que satisfacen la condición $1 \leq x, 1 \leq y$. Por esto, la desigualdad $|x| + |y| \leq 100$ tiene

$$4 \sum_{k=2}^{100} (k-1) = 1\,998\,000$$

soluciones, para las cuales $|x| \neq 0$ o $|y| \neq 0$. Además, esta desigualdad tiene 3996 soluciones, para las cuales una de las incógnitas es igual a cero y una solución del tipo $x = 0, y = 0$. En total, existen $2\,001\,997$ soluciones.

373.

Si se agrega a los vértices de cualquier polígono, que no contenga el punto A_1 , este punto, se obtiene uno que contendrá A_1 . Con esto queda establecida una correspondencia biunívoca entre el conjunto de todos los polígonos que no contienen A_1 y una parte del conjunto de los que lo contienen. En este caso no hay polígonos que correspondan a los triángulos, uno de cuyos vértices es A_1 . Por esto, habrá más polígonos que contengan el punto A_1 .

374.

Al cabo de un número par de jugadas, el caballo puede llegar a casillas de un mismo color que la del punto de partida. Nos será más cómodo girar el tablero 45° y representar sólo las casillas de este color, sustituyendo cada una por su centro. Entonces las casillas a las que el caballo puede llegar al cabo de 2 jugadas se representarán por el esquema de la fig. 42. El número de estas casillas es igual a 33. Cada una de ellas es el centro de una figura igual, que muestra dónde puede llegar el caballo después de las dos jugadas siguientes. Uniendo estas figuras, obtenemos la representada en la fig. 43. Esta se divide en un cuadrado, que contiene $9^2 = 81$ puntos, y cuatro trapecios, cada uno de los cuales contiene $7 + 5 = 12$ puntos. En total, se obtienen $81 + 4 \cdot 12 = 129$ puntos.

Al cabo de $2n$ jugadas, se obtendrá una figura que se dividirá en un cuadrado de lado $4n$, el que




Fig. 42.




Fig. 43.

contendrá $(4n + 1)^2$ puntos, y 4 trapecios, cada uno de los cuales contendrá

$$(4n - 1) + (4n - 3) + \dots + (2n + 1) = 3n^2$$

puntos. En total, obtenemos

$$12n^2 + (4n + 1)^2 = 28n^2 + 8n + 1$$

puntos. Así, pues, al cabo de $2n$ jugadas, $n > 1$, el caballo puede llegar a una de las $28n^2 + 8n + 1$ casillas.

375.

Si se toman las ternas que contienen un mismo elemento, digamos, el a , éstas satisfarán la condición planteada, siendo el número de éstas igual a $C_1^{1984} = 1\ 907\ 481$. Demostremos que no es posible escoger un número mayor de ternas que tengan dos a dos un elemento común. Supongamos que hemos escogido $N > C_1^{1984}$ de estas ternas, y que (a, b, c) es una de ellas. Como cualquiera de las $N - 1$ ternas restantes tiene por lo menos un elemento común con la elegida, resulta que por lo menos para uno de los elementos

a, b, c , digamos, el a , existirán $\frac{N-1}{3}$ ternas que

lo contengan, siendo $\frac{N-1}{3} > 635\ 808$. No más

de 3906 ternas contendrán, además de a , uno de los elementos b, c . Por esto, existirá una terna del tipo (a, d, e) , siendo d y e distintos de b, c . Análogamente, existirán ternas del tipo (a, f, g) y (a, h, j) , siendo f y g distintos de b, c, d, e , y h, j , de b, c, d, e, f, g .

Cualquiera de las N ternas dadas tiene por lo menos un elemento común con cada una de las cuatro ternas $(a, b, c), (a, d, e), (a, f, g), (a, h, j)$. Está claro que uno de estos elementos debe ser el a , puesto que, de otro modo, la terna contendría cuatro elementos distintos, lo cual es imposible. De esta manera, todas las ternas contienen el elemento a , por lo cual su número no supera a C_1^{1984} , contra la hipótesis.

376.

La sucesión dada contiene $9 + 2 \cdot 90 + 3 \cdot 900 + \dots + 8 \cdot 900\ 000\ 000 + 9$ cifras. Calculemos el número de ceros de la sucesión $1, 2, \dots, 10^9$. Escribamos todos los números del 1 al $10^9 - 1$ en forma de números de nueve cifras, agregando delante la cantidad necesaria de ceros (por ejemplo, 000 000 003), y sustituylamos el 10^9 por 000 000 000. Como resultado, se obtienen $9 \cdot 10^8$ cifras, figurando cada una de ellas tantas veces cuantas cualquier otra. Por esto, tendremos $9 \cdot 10^8$ ceros. Pero entre ellos, una parte fue agregada por nosotros: $8 \cdot 9$ ceros para los números de una cifra, $7 \cdot 90$ para los de dos, etc. Si los eliminamos, quedarán $9 \cdot 10 - 8 \cdot 9 - 7 \cdot 90 - \dots - 9 \cdot 10^7$ ceros. Es fácil ver que esta suma es igual a $2 \cdot 9 + 3 \cdot 90 + \dots + 8 \cdot 9 \cdot 10^7$, es decir, al número de cifras de la primera sucesión.

377.

Si la suma de las primeras cifras es igual a k , para $k \leq 9$ tendremos $(k + 1)^2$ números con la propiedad indicada, y para $k > 9$, $(19 - k)^2$ de estos números. En total, se obtienen

$$2(1^2 + \dots + 9^2) + 10^2 = 670 \text{ números.}$$

378.

Designemos el conjunto de asignaturas, en las que el alumno a obtiene 5, mediante A_a . Todos estos conjuntos están formados por no más de $2n$ elementos, sin que ninguno sea parte del otro, según la hipótesis del problema. Dividamos estos conjuntos en clases, haciendo pertenecer a la k -ésima los formados por k elementos. Sea r el mínimo número de elementos en los conjuntos de nuestra colección. Demostremos que, si $r < n$, se puede sustituir la colección dada de conjuntos por otra, de forma que

a) ningún conjunto de la nueva colección sea parte de otro;

b) el número de conjuntos en la nueva colección sea mayor que en la inicial;

c) el mínimo número de elementos en los conjuntos de la nueva colección sea igual a $r + 1$.

Tomemos para esto todos los conjuntos formados por r elementos, y agreguemos a cada uno, de todas las formas posibles, uno de los elementos que no le pertenecen. Dejemos los conjuntos restantes de nuestra colección invariables. Está claro que, después de esta operación, obtendremos una colección en la que el mínimo número de elementos de los conjuntos será igual a $r + 1$. Además, ningún conjunto de la nueva colección será parte de otro: si el conjunto B contuviese el nuevo conjunto A' , éste contendría también el conjunto A de la r -ésima clase, del cual fue obtenido A' agregando un elemento, lo cual contradice a la hipótesis. Obsérvese, además, que ninguno de los nuevos conjuntos coincide con los dados inicialmente. Por ejemplo, supongamos que el nuevo conjunto fue obtenido agregando el elemento x al A . Si éste coincidiese con un conjunto B dado inicialmente, esto significaría que B contiene A , contra lo supuesto.

Nos queda demostrar que el número de nuevos conjuntos es mayor que el de los iniciales. Para esto, obsérvese que para cada conjunto A de la r -ésima clase hay $2n - r$ elementos que no le pertenecen, por lo cual se obtienen de éste $2n - r$ conjuntos nuevos. Pero algunos de ellos coinciden entre sí (por ejemplo, de los conjuntos (a, b) y (b, c) se puede obtener, agregando un elemento

el mismo conjunto (a, b, c) . Pero un conjunto dado de $r + 1$ elementos sólo de $(r + 1)^a$ forma puede ser obtenido de conjuntos que contengan r elementos. Por esto, si el número de conjuntos de la r -ésima clase era igual a m y de éstos se obtuvieron p nuevos conjuntos distintos, será $m(2n - r) \leq p(r + 1)$. Como para $r < n$ se tiene que $2n - r > r + 1$, de aquí se deduce que $m < p$, es decir, que el número de conjuntos aumentó.

Repetiendo el procedimiento descrito, podemos sustituir todos los conjuntos que contengan menos de n elementos por conjuntos de n elementos, conservando la condición a) y obteniendo mayor cantidad de conjuntos que al principio. De la misma forma se pueden sustituir todos los conjuntos que contengan más de n elementos (éstos se sustituyen sucesivamente por conjuntos que se obtengan eliminando un elemento). Como resultado, se obtiene una colección de conjuntos formados por n elementos y que contiene mayor cantidad de conjuntos que la dada inicialmente. Pero de $2n$ elementos se pueden formar solamente C_{2n}^n conjuntos de n elementos. Por lo tanto, la cantidad de conjuntos no era mayor que C_{2n}^n , en otras palabras, en la escuela no había más de C_{2n}^n alumnos.

379.

Llamaremos elementos de primera especie a los m primeros, y de segunda especie, a los segundos n . Dividamos todos los arreglos de $m + n$ elementos tomados de a r en clases, haciendo pertenecer a la k -ésima los arreglos en los que figuran exactamente k elementos de primera especie. Entonces, la k -ésima clase contiene $C_k^m A_k^n A_{r-k}^n$ arreglos. En efecto, podemos elegir de C_k^m formas los lugares en los que estén los elementos de primera especie, después de lo cual llenar de A_k^n modos estos lugares con elementos de primera especie, y de A_{r-k}^n modos los $r - k$ lugares restantes con elementos de segunda especie.

De esta manera, el número de arreglos de $m + n$ elementos tomados de a r es igual a $\sum_{k=0}^r C_k^m A_k^n A_{r-k}^n$

o, en las notaciones convenidas, a $\sum_{k=0}^r C_k^m M_k N_{r-k}$.

Pero esto no es otra cosa que el resultado de abrir paréntesis en la expresión $(M + N)^r$ y sustituir luego los exponentes por subíndices.

Obsérvese que el número de arreglos de la k -ésima clase puede ser calculado también así: escogemos k elementos de primera especie, y $r - k$ de segunda y permutamos de todas las maneras posibles estos elementos. Esto se puede efectuar de $P(k, r - k) A_k^m A_{r-k}^n = C_k^m A_k^m A_{r-k}^n$ formas.

380.

El exponente de grado 8 puede ser formado de las siguientes formas a partir de los exponentes 2 y 3: $8 = 2 + 2 + 2 + 2 = 2 + 3 + 3$. Esto significa que si se denota x^2 mediante y , y x^3 mediante z , el coeficiente buscado es igual a la suma de los coeficientes de y^4 e yz^2 en el desarrollo de $(1 + y - z)^8$. En virtud de la fórmula de elevar un polinomio a una potencia, este coeficiente es igual a $P(2, 2, 2, 2, 1) + P(3, 3, 2, 1) = 378$.

381.

Se tiene que

$$(1+x)^k + \dots + (1+x)^n = \frac{(1+x)^{n+1} - (1+x)^k}{x}$$

Por esto, el coeficiente de x^m es igual a $C_{m+1}^{n+1} - C_{m+1}^k$, si $m < k$, y C_{m+1}^{n+1} , si $m \geq k$.

382.

Tenemos que $17 = 7 + 5 + 5$, y 18 no se divide en suma de términos positivos, múltiplos de 5 y 7. Por esto, x^{17} figurará con coeficiente $C_7^{10} C_5^8 = 3420$, y x^{18} , con coeficiente cero.

383.

Se tiene que $17 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 = 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$. Por esto, en el desarrollo de $(1 + x^2 - x^3)^{1000}$, el término con x^{17} tendrá un coeficiente igual a

$$-C_1^{1000} C_2^{999} - C_4^{1000} C_3^{999} - C_1^{1000} C_3^{999},$$

y en el desarrollo de $(1 - x^2 + x^3)^{1000}$, un coeficiente de

$$-C_7^{1000} C_1^{999} + C_4^{1000} C_3^{999} - C_1^{1000} C_3^{999}.$$

Está claro que el segundo coeficiente es mayor

384.

Se da que

$$(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}. \quad (*)$$

Demostremos primeramente que $a_k = a_{2n-k}$. Para esto, hagamos $x = \frac{1}{y}$ y multipliquemos ambos miembros de la igualdad por y^{2n} . Obtendremos así que

$$(y^2 + y + 1)^n = a_0 y^{2n} + a_1 y^{2n-1} + \dots + a_{2n}. \quad (**)$$

Comparando los desarrollos (*) y (**), se obtiene que

$$a_k = a_{2n-k}.$$

Sustituycamos ahora x por $-x$. Se obtendrá que $(1-x+x^2)^n = a_0 - a_1 x + a_2 x^2 - \dots + a_{2n} x^{2n}$. (***)

Multiplicando los desarrollos (*) y (***), se deduce que

$$(1+x^2+x^4)^n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k (a_0 a_k - a_1 a_{k-1} + \dots$$

$$\dots + a_k a_0) x^k. \quad (****)$$

Es evidente que el desarrollo del primer miembro de la igualdad contiene sólo términos con potencias pares de x , por lo cual el coeficiente de x^{2n-1} es igual a cero. Pero en el segundo miembro el coeficiente de x^{2n-1} es

$$-(a_0 a_{2n-1} - a_1 a_{2n-2} + a_2 a_{2n-3} - \dots - a_{2n-1} a_0) =$$

$$= -(a_0 a_1 - a_1 a_2 + a_2 a_3 - \dots - a_{2n-1} a_{2n}).$$

Queda así demostrada la igualdad a). Obsérvese ahora que el desarrollo (****) se puede representar, según la fórmula (*), como sigue:

$$(1+x^2+x^4)^n = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots + a_{2n} x^{4n}.$$

De aquí se deduce que el coeficiente de x^{2n} en este desarrollo es igual a a_n . Por otro lado, según la fórmula (****), éste es igual a

$$a_0 a_{2n} - a_1 a_{2n-1} + a_2 a_{2n-2} - \dots + a_{2n} a_0 =$$

$$= 2a_0^2 - 2a_1^2 + 2a_2^2 - \dots + (-1)^n a_n^2.$$

De aquí se desprende directamente la igualdad b). Escribamos la igualdad (*) en la forma

$$(1-x^8)^n = (1-x)^n (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{2n} x^{2n}).$$

De aquí se deduce que

$$1 - C_1^n x^8 + C_2^n x^{16} - \dots + (-1)^n C_n^n x^{8n} =$$

$$= (1 - C_1^n x + C_2^n x^2 - \dots + (-1)^n C_n^n x^n) \times$$

$$\times (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{2n} x^{2n}).$$

Si r no se divide por 3, el coeficiente de x^r en el primer miembro es igual a cero. En el segundo, el coeficiente de x^r es igual a

$$a_r - C_1^n a_{r-1} + C_2^n a_{r-2} - \dots + (-1)^r C_r^n a_0.$$

Por consiguiente, esta expresión es igual a cero, si r no se divide por 3, y a $(-1)^h C_h^n$, si $r=3k$. Con esto queda demostrada la relación c).

Haciendo en el desarrollo (*) $x=1$, se obtiene que

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = 3^n.$$

Haciendo $x=1$ en el desarrollo (**), tendremos:

$$a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{2n} = 1.$$

Sumando y restando estas igualdades, se obtienen las relaciones d).

385.

Se tienen C_n^1 términos del tipo x_k^3 , $2C_n^2$ del tipo $x_j^2 x_k$, $j \neq k$, y C_n^3 del tipo $x_i x_j x_k$, $i \neq j$, $i \neq k$, $j \neq k$, habiendo, en total, $C_n^1 + 2C_n^2 + C_n^3$ términos.

386.

Tenemos que

$$(1+x+\dots+x^{n-1})^2 = \frac{(x^n-1)^2}{(x-1)^2} = (x^n-1)^2 \times$$

$$\times (x-1)^{-2} = (x^{2n}-2x^n+1) (1+2x+3x^2+\dots$$

$$\dots + mx^{n-1}+\dots).$$

Por esto, el coeficiente de x^k es igual a $k+1$, si $0 \leq k \leq n-1$, y a $2n-k-1$, si $n \leq k \leq 2n-2$. La respuesta se puede escribir como sigue: $n-|n-k-1|$.

387.

Como $C_r^{n+1} = \frac{n+1}{r+1} C_r^n$ y $C_r^n = \frac{n}{r} C_{r-1}^{n-1}$, el primer miembro de la igualdad se puede escribir en la forma

$$\frac{n}{r} \left(\frac{n+1}{r+1} - 1 \right) (C_{r-1}^{n-1})^2 = \frac{n(n-r)}{r(r+1)} = r.$$

$$\frac{\left(\frac{n^2}{r^2} - \frac{(n+1)n}{(r+1)r} \right) (C_{r-1}^{n-1})^2 = \frac{n(n-r)}{r^2(r+1)} = r.$$

388.

El número de arreglos con repetición de n elementos tomados de a 3 es igual a n^3 . Dividamos estos arreglos en clases, haciendo pertenecer a la k -ésima los que contienen exactamente k tipos distintos de elementos. El número de arreglos de la primera clase es igual a C_1^n , el de la segunda, a $6C_2^n$ (hay n formas de elección del elemento que figura dos veces en el arreglo, $n-1$ de tomar el que figura una vez y, luego, tres permutaciones de estos elementos), y el de la tercera, a $A_3^n = 6C_3^n$. En total, tendremos $C_1^n + 6C_2^n + 6C_3^n$ arreglos. De aquí se deduce la primera relación. Para demostrar la segunda, dividimos análogamente en clases los arreglos con repetición que contienen por lo menos un elemento de un tipo prefijado. Se obtiene así que

$$(n+1)^3 - n^3 = 1 + 6C_1^n + 6C_2^n,$$

de donde se deduce, precisamente, la relación a demostrar.

389.

Se demuestra en forma totalmente análoga a la afirmación 388, pero se toman arreglos con repetición de elementos de n tipos tomados de a 4.

390.

Tomemos la igualdad

$$\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n = \left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^n = \cos\frac{2n\pi}{3} + i\sin\frac{2n\pi}{3}.$$

Según la fórmula del binomio de Newton, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{2^n} \{1 + C_1^n(-i\sqrt{3}) + C_2^n(-i\sqrt{3})^2 + \\ + C_3^n(-i\sqrt{3})^3 + \dots\} = \\ = \frac{(-1)^n}{2^n} \{1 - 3C_2^n + 9C_4^n - \dots \\ \dots - i\sqrt{3}\{C_1^n - 3C_3^n + \dots\}\}. \end{aligned}$$

Igualando las partes real e imaginaria en ambos términos, obtenemos las relaciones que queremos demostrar.

391.

Tomemos la identidad

$$(1+x)^n = C_0^n + C_1^n x + C_2^n x^2 + C_3^n x^3 + \dots + C_n^n x^n$$

y hagamos en ella sucesivamente $x=1, \varepsilon, \varepsilon^2$, siendo $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}$, por lo cual $\varepsilon^3 + \varepsilon + 1 = 0$. Se obtiene entonces:

$$2^n = C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n,$$

$$(1+\varepsilon)^n = C_0^n + C_1^n \varepsilon + C_2^n \varepsilon^2 + \dots + C_n^n \varepsilon^n,$$

$$(1+\varepsilon^2)^n = C_0^n + C_1^n \varepsilon^2 + C_2^n \varepsilon^4 + \dots + C_n^n \varepsilon^{2n}.$$

Pero $1 + \varepsilon^k + \varepsilon^{2k} = 0$, si k no se divide por 3, y $1 + \varepsilon^k + \varepsilon^{2k} = 3$, si k se divide por 3. En consecuencia,

$$2^n + (1+\varepsilon)^n + (1+\varepsilon^2)^n = 3(C_0^n + C_3^n + C_6^n + \dots).$$

Como

$$\begin{aligned} 1 + \varepsilon = -\varepsilon^2 = -\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = \\ = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

$$1 + \varepsilon^2 = -\varepsilon = \cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3},$$

tendremos que

$$2^n + (1+\varepsilon)^n + (1+\varepsilon^2)^n = 2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}.$$

De aquí se deduce, precisamente, que

$$C_0^n + C_3^n + C_6^n + \dots = \frac{1}{3} \left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right).$$

Las otras dos igualdades se obtienen en forma análoga a la anterior, considerando las sumas

$$2^n + \varepsilon(1+\varepsilon)^n + \varepsilon^2(1+\varepsilon^2)^n, \quad 2^n + \varepsilon^2(1+\varepsilon)^n + \varepsilon(1+\varepsilon^2)^n.$$

La igualdad d) se deduce análogamente, analizando la expresión $(1+i)^n$.

392.

Tenemos que

$$-(1+x)^n + (1-x)^n = 2 \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} C_k^n x^{2k}.$$

Los coeficientes de este polinomio son positivos. Por esto, su mayor valor lo tendrá para $x=1$. Este valor es igual a 2ⁿ.

393.

Se tiene:

$$\sum_{x=0}^n \frac{n!(m-x)!}{m!(n-x)!} = \frac{1}{C_n^m} \sum_{x=0}^n C_{m-x}^{m-x} = \frac{C_{m-n+1}^{m+1}}{C_n^m} = \frac{m+1}{m-n+1}$$

y

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^n \frac{C_x^n C_r^n}{C_{x+r}^{2n}} &= \frac{n! C_r^n}{(2n)!} \sum_{x=0}^n \frac{(x+r)!(2n-x-r)!}{x!(n-x)!} = \\ &= \frac{(n!)^2}{(2n)!} \sum_{x=0}^n C_r^{x+r} C_{n-r}^{2n-x-r} = \frac{(n!)^2}{(2n)!} C_{n+1}^{2n+1} = \\ &= \frac{2n+1}{n+1}. \end{aligned}$$

394.

La suma del primer miembro de la igualdad se reduce a

$$\sum_{h=1}^n C_h^{m+h-1} = C_m^{m+n-1}.$$

Al mismo valor es igual la suma del segundo miembro.

395.

Se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^n \frac{C_{x-1}^{n-1}}{C_{2n-1}^{2n-1}} &= \frac{(n-1)!}{(2n-1)!} \sum_{x=1}^n \frac{x(2n-x-1)!}{(n-x)!} = \\ &= \frac{2n}{(2n-1) C_{n-1}^{2n-2}} \sum_{x=1}^n C_{n-1}^{2n-x-1} = \\ &= \frac{1}{C_{n-1}^{2n-1}} \sum_{x=1}^n C_n^{2n-x} = \frac{2n C_{n-1}^{2n-1}}{(2n-2) C_{n-1}^{2n-2}} = \\ &= \frac{C_{n-1}^{2n-1}}{C_{n-1}^{2n-1}} = \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

396.

Se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^n \frac{C_{x-1}^{n-1}}{C_x^{n+q}} &= \frac{(n-1)!}{(n+q)!} \sum_{x=1}^n \frac{x(n+q-x)!}{(n-x)!} = \\ &= \frac{(n+q+1)(n-1)! q!}{(n+q)!} \sum_{x=1}^n C_{n-x}^{n+q-x} = \\ &= \frac{(n-1)!(q+1)!}{(n+q)!} \sum_{x=1}^n C_{n-x}^{n+q-x+1} = \\ &= \frac{(n+q+1)(n-1)! q!}{(n+q)!} C_{n-1}^{n+q} = \\ &= \frac{(n-1)!(q+1)!}{(n+q)!} C_{n-1}^{n+q+1} = \\ &= \frac{n+q+1}{q+1} \cdot \frac{n+q+1}{q+2} = \frac{n+q+1}{(q+1)(q+2)}. \end{aligned}$$

397.

Se tiene:

$$\sum_{x=1}^n \frac{C_{x-2}^{n-2}}{C_x^{n+q}} = \frac{(n-2)!}{(n+q)!} \sum_{x=1}^n \frac{x(x-1)(n+q-x)!}{(n-x)!}.$$

Ahora bien, aplicando la identidad

$$x(x-1) = (n+q-x+1)(n+q-x+2) + (n+q+1)[n+q-2(n+q-x+1)],$$

se obtiene, que nuestra suma es igual a

$$\begin{aligned} \frac{(n-2)!}{(n+q)!} \left[(q+2)! \sum_{x=1}^n C_{n-x}^{n+q-x+2} - \right. \\ \left. - 2(n+q+1)(q+1)! \sum_{x=1}^n C_{n-x}^{n+q-x+1} + \right. \\ \left. + (n+q)(n+q+1) q! \sum_{x=1}^n C_{n-x}^{n+q-x} \right] = \\ = \frac{(n-2)! q!}{(n+q)!} [(q+1)(q+2) C_{n-1}^{n+q+2} - \\ - 2(n+q+1)(q+1) C_{n-1}^{n+q+1} + \\ + (n+q)(n+q+1) C_{n-1}^{n+q}]. \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de C_{n-1}^{n+q+2} , C_{n-1}^{n+q+1} , C_{n-1}^{n+q} y transformando la expresión, se obtiene la fórmula requerida.

398.

Sabemos que $C_{n-1}^{n-1} = \frac{k}{n} C_n^n$. Como

$$(1+x)^n = 1 + C_1^n x + \dots + C_k^n x^k + \dots + C_n^n x^n, (*)$$

de aquí se deduce que

$$n(1+x)^{n-1} = C_1^n + \dots + k C_k^n x^{k-1} + \dots$$

$$\dots + n C_n^n x^{n-1} (**)$$

(el lector que conozca el cálculo diferencial puede obtener esta fórmula derivando término a término ambos miembros de la igualdad (*)).

Multipliquemos los desarrollos (*) y (**). Obtendremos que

$$n(1+x)^{2n-1} = (1 + C_1^n x + \dots + C_n^n x^n) \times$$

$$\times (C_1^n + \dots + n C_n^n x^{n-1}).$$

Comparando los coeficientes de x^{n-1} en ambos miembros de esta igualdad, se obtiene la relación que se quería demostrar.

399.

Tomemos todas las n -combinaciones con repetición de elementos de n tipos. El número de éstas es igual a C_n^{n-1} . Dividamos estas combinaciones en clases, haciendo pertenecer a la k -ésima aquellas en las que figuren elementos de exactamente k tipos diferentes. En la k -ésima clase habrá $C_k^n C_{n-k}^{n-1}$ combinaciones (elegimos, de C_k^n modos, los k tipos de elementos que figuran en la combinación de esta clase, y de los elementos de los k tipos dados podemos formar C_{n-k}^{n-1} n -combinaciones con repetición, en las que figuren elementos de todos los k tipos). De esta forma, tenemos

$$\text{que } C_n^{n-1} = \sum_{k=1}^n C_k^n C_{n-k}^{n-1}.$$

Expresando los números C_k^{n-1} , C_k^n , C_{n-k}^{n-1} mediante factoriales, se obtiene la relación requerida.

400.

La igualdad a demostrar puede escribirse así:

$$C_r^{n+r-1} - C_1^n C_{r-2}^{n+r-3} + C_2^n C_{r-4}^{n+r-5} - \dots = C_r^n.$$

Para demostrarla, tomemos todas las r -combinaciones con repetición de elementos de n tipos, y hallemos de dos formas el número de todas aquellas que estén formadas solamente por elementos de distintos tipos. Por un lado, este número es igual a C_r^n . Por el otro, el número de r -combinaciones con repetición, formadas a partir de elementos de n tipos, en las que por lo menos figuron dos veces elementos de k tipos dados, es igual a C_{r-2k}^{n-2k} . Como estos k tipos pueden ser escogidos de C_k^n maneras, aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones se obtiene la relación que queríamos demostrar.

401.

a) Hagamos $S_n = C_1^n + 2C_2^n + 3C_3^n + \dots + nC_n^n$. En virtud de la igualdad $C_k^n = C_{n-k}^n$, tendremos que $S_n = nC_0^n + (n-1)C_1^n + \dots + C_{n-1}^n$. Sumando, obtenemos

$$2S_n = n[C_0^n + C_1^n + \dots + C_n^n] = 2^n n,$$

por lo cual será $S_n = 2^{n-1} n$.

b) De la misma forma se establece que $S_n = \frac{(n+1)2^{n-1}}{2}$.

c) $S_n = (n-2)2^{n-1} + 1$.

d) $S_n = (n+1)2^n$.

e) $S_n = 0$.

f) Se tiene:

$$S_n = 4(C_1^n + 2C_2^n + \dots + nC_n^n) - (C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n) = 2^{n-1} n - 2^n + 1.$$

g) Se tiene que $C_k^n = C_{k-1}^{n-1} + C_{k-1}^{n-1}$. Por esto,

$$S_n = C_0^{n-1} + C_1^{n-1} - 2(C_1^{n-1} + C_2^{n-1}) + 3(C_2^{n-1} + C_3^{n-1}) - \dots + (-1)^{n-1} n C_{n-1}^{n-1} = C_0^{n-1} - C_1^{n-1} + C_2^{n-1} - \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1}.$$

Esta suma es igual a 1 para $n=1$ y a 0 para $n > 1$.

h) Esta suma es igual a

$$S_n = \frac{1}{n+1} [C_1^{n+1} + C_2^{n+1} + \dots + C_{n+1}^{n+1}] = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

i) Como $C_h^n = \frac{(k+2)(k+1)}{(n+1)(n+2)} C_{h+2}^{n+2}$, esta suma es igual a

$$S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} (C_2^{n+2} + 2C_3^{n+2} + \dots + (n+1)C_{n+2}^{n+2}) = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \times \\ \times [(C_1^{n+2} + 2C_2^{n+2} + \dots + (n+2)C_{n+2}^{n+2}) - (C_1^{n+2} + \dots + C_{n+2}^{n+2})].$$

Aplicando los resultados de los problemas a) y b), se obtiene que

$$S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} [2^{n+1}(n+2) - 2^{n+2} + 1] = \\ = \frac{2^{n+1}n + 1}{(n+1)(n+2)}.$$

j) Escribamos la suma en la forma

$$S_n = \frac{1}{n+1} [C_1^{n+1} - C_2^{n+1} + \dots + (-1)^n C_{n+1}^{n+1}] = \\ = \frac{1}{n+1},$$

puesto que la expresión entre corchetes es igual a 1.

k) Si n es impar, será $S_n = 0$, y si $n = 2k$ es par, será $S_n = (-1)^k C_h^{2k}$. Para demostrarlo, hay que multiplicar los desarrollos de $(1+x)^n$ y $(1-x)^n$, hallando luego el coeficiente de x^n .

402.

El mayor coeficiente del primer desarrollo es el de $a^3 b^2 c^4$ (o de $a^2 b^4 c^3$, $a^4 b^2 c^3$). Este es igual a $P(3, 3, 4) = 4200$. En el segundo desarrollo, el mayor será el coeficiente $P(4, 4, 3, 3)$ de $a^3 b^2 c^4 d^2$.

403.

Según la fórmula del binomio de Newton, tendremos:

$$(1-4x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \\ + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} (-4x)^n. \quad (*)$$

Por esto, el coeficiente Y_n de x^n es igual a

$$Y_n = \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1) \cdot 2^n}{n!} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = C_n^{2n}.$$

Para $(1-4x)^{\frac{1}{2}}$, tendremos, en virtud de la fórmula del binomio de Newton, el desarrollo

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \\ + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} \times \\ \times (-4x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n}{1-2n} x^n.$$

Por lo

$$\frac{Y_n}{1-2n} = -\frac{C_n^{2n}}{2n-1} = -\frac{(2n)!}{(n!)^2(2n-1)} = \\ = -\frac{2}{n} \frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2} = -\frac{2}{n} Y_{n-1}.$$

Por esto,

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_{n-1}}{n} x^n, \quad (**)$$

donde hicimos $Y_0 = 1$.

404.

a) Multipliquemos los desarrollos (*) y (**). Obtendremos que

$$1 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n x^n\right) \left(1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_{n-1}}{n} x^n\right) = \\ = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[Y_n - 2 \left(Y_{n-1} + \frac{1}{2} Y_{n-2} Y_1 + \dots \right. \right. \\ \left. \left. \dots + \frac{1}{n} Y_{n-1} \right) \right] x^n.$$

De aquí se deduce de inmediato la igualdad a demostrar.

b) Elevemos el desarrollo (*) al cuadrado. Se obtiene que

$$\begin{aligned}(1-4x)^{-1} &= \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n x^n\right)^2 = \\ &= 1 + (Y_0 + Y_1 Y_0) x + (Y_0 Y_2 + Y_1 Y_1 + \\ &+ Y_2 Y_0) x^2 + \dots + (Y_0 Y_n + Y_1 Y_{n-1} + \dots \\ &\dots + Y_n Y_0) x^n + \dots\end{aligned}$$

Como

$$(1-4x)^{-1} = 1 + 4x + 4^2 x^2 + \dots + 4^n x^n + \dots,$$

se obtiene de inmediato la igualdad a demostrar.

c) Elévese al cuadrado el desarrollo (**).

405.

Designemos los números pares con la letra P , y los impares, con la I . Los primeros 4 elementos de la tercera fila tienen una escritura IPIP, los de la cuarta, IIPPI, los de la quinta, IPPPP, los de la sexta, IIIPI, y los de la séptima, IPIPI. Después de esto, el ciclo se repite (los primeros 4 elementos de cada fila se determinan por los primeros cuatro de la precedente). Por esto, en cada fila habrá por lo menos un número par.

406.

Demostremos que cada fila del triángulo es una progresión aritmética, y la suma de los elementos de la fila que estén igualmente alojados de los extremos se divide por 1958. La demostración la haremos mediante inducción con respecto al número de la fila. Para la primera, la afirmación es evidente. Supongamos que ésta fue demostrada para la n -ésima. Tomemos tres elementos vecinos a , $a+d$ y $a+2d$ de la n -ésima fila. En la fila $n+1$, a éstos les corresponden los elementos $2a+d$, $2a+3d$, la diferencia de los cuales es igual a $2d$. Por lo tanto, en la fila $n+1$ se tiene una progresión con diferencia $2d$. Para hallar la suma de los elementos de esta fila que se hallen a igual distancia de los extremos, es suficiente hallar la suma del primero y del último. Pero si los dos primeros elementos de la n -ésima fila son iguales a a y b , y sus dos últimos, a c y d , la suma de los elementos primero y último de la $(n+1)$ -ésima fila será igual a $(a+b) + (c+d) = 2(a+d)$, por lo cual, según la hipótesis de la inducción, se divide por 1958. Por lo tanto, para cualquier fila la suma de los elementos primero y último se divide por 1958. Entonces, esta propiedad la

poseerá también la suma de dos elementos de la penúltima fila, es decir, el último elemento de la tabla.

407.

a) Demostremos la igualdad mediante inducción con respecto a $n+m$. Supongamos que para todo k y s , tales que $k+s < n+m$, ya fue demostrada la igualdad a). Entonces, tendremos:

$$\begin{aligned}u_{n+m} &= u_{n+m-1} + u_{n+m-2} = \\ &= u_{n-1} u_{m-1} + u_n u_m + u_{n-1} u_{m-2} + u_n u_{m-1} = \\ &= u_{n-1} (u_{m-1} + u_{m-2}) + u_n (u_m + u_{m-1}) = \\ &= u_{n-1} u_m + u_n u_{m+1}. \quad (*)\end{aligned}$$

Como para $m+n=1$ la igualdad (*) se comprueba directamente, ésta es válida para todo m y n .

b) Efectuemos la demostración mediante inducción con respecto a k . Para $k=1$, la afirmación es trivial. Supongamos que ya fue demostrado que u_{km} se divide por u_m . Según la igualdad (*), tendremos:

$$u_{(k+1)m} = u_{km+m} = u_{km-1} u_m + u_{km} u_{m+1},$$

por lo cual $u_{(k+1)m}$ también se dividirá por u_m . Por inducción concluimos que todos los u_{nm} se dividen por u_m .

c) Supongamos que u_n y u_{n+1} se dividen por $k \neq 1$. Entonces también $u_{n-1} = u_n + 1 - u_n$ se dividirá por k . Continuando este razonamiento, obtendríamos que $u_1 = 1$ se divide por k , lo cual es imposible.

408.

Designemos el máximo común divisor de los números a y b mediante (a, b) . De la igualdad $u_{m+n} = u_{n-1} u_m + u_n u_{m+1}$, se deduce que (u_{m+n}, u_n) es divisor de $u_{n-1} u_m$ y, como u_n y u_{n-1} son primos entre sí, es también divisor de u_m . Recíprocamente, (u_m, u_n) es divisor de u_{m+n} . Por esto, $(u_m, u_n) = (u_{m+n}, u_n)$. Pero entonces, si $n = km + q$, será $(u_m, u_n) = (u_m, u_q)$. Aplicando el algoritmo de Euclides, nos convencemos de que $(u_m, u_n) = u_{(m, n)}$. En particular, $(u_{1000}, u_{770}) = u_{10} = 55$.

409.

Tomemos la sucesión formada por las últimas cuatro cifras de los números de Fibonacci. Como la cantidad de números de cuatro cifras del tipo 0000, 0001, ..., 9999 es igual a 10^4 , la canti-

dad de pares de estos números será igual a 10^m . Por consiguiente, entre los primeros 100 000 001 números de Fibonacci habrá dos pares (u_m, u_{m+1}) y (u_n, u_{n+1}) , $n > m$, tales que u_m y u_n al igual que u_{m+1} y u_{n+1} tengan las últimas cuatro cifras iguales. Pero entonces, los números $u_n - u_m$ y $u_{n+1} - u_{m+1}$ terminarán en cuatro ceros. Como

$$u_{n-1} - u_{m-1} = (u_{n+1} - u_{m+1}) - (u_n - u_m),$$

también $u_{n-1} - u_{m-1}$ terminarán en cuatro ceros. Si continuamos la disminución del subíndice y tenemos en cuenta que $u_0 = 0$, obtenemos que el número u_{n-m} termina en cuatro ceros.

410.

Supongamos que se han escogido los números $u_n, u_{n+1}, u_{n+2}, \dots, u_{n+7}$. Expresémoslos mediante u_n y u_{n+1} :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= u_n + u_{n+1}, & u_{n+3} &= u_n + 2u_{n+1}, \\ & & u_{n+4} &= 2u_n + 3u_{n+1}, \\ u_{n+5} &= 3u_n + 5u_{n+1}, & u_{n+6} &= 5u_n + 8u_{n+1}, & u_{n+7} &= \\ & & & & &= 8u_n + 13u_{n+1} \end{aligned}$$

En consecuencia, la suma de estos números es igual a $21u_n + 33u_{n+1}$. Pero $u_{n+8} = 13u_n + 21u_{n+1}$, $u_{n+9} = 21u_n + 34u_{n+1}$. De la desigualdad $u_{n+8} < 21u_n + 33u_{n+1} < u_{n+9}$ queda claro que $21u_n + 33u_{n+1}$ no es un número de Fibonacci.

411.

La afirmación a) se demuestra por inducción. Para $n=1$, ésta es evidente. Supongamos que sea válida para n :

$$u_2 + u_4 + \dots + u_{2n} = u_{2n+1} - 1.$$

Agreguemos u_{2n+2} a ambos miembros de la igualdad. Como $u_{2n+2} + u_{2n+1} = u_{2n+3}$, se obtiene que $u_2 + u_4 + \dots + u_{2n+2} = u_{2n+3} - 1$. Queda así demostrada nuestra afirmación. Análogamente se demuestra la afirmación b).

La afirmación c) también se demuestra mediante inducción completa.

Para demostrar la d), obsérvese que

$$\begin{aligned} u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} &= u_{n+1}^2 - u_n^2 - u_n u_{n+1} = \\ &= u_{n+1}(u_{n+1} - u_n) - u_n^2 = u_{n-1} u_{n+1} - u_n^2. \end{aligned}$$

$$\text{Por esto, } u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} = (-1)^n [u_1^2 - u_0 u_2] = (-1)^n.$$

Demostraremos conjuntamente las afirmaciones e) y f). Para $n=1$, éstas son evidentes. Supongamos que ya fueron demostradas para $n=k$. En virtud de la afirmación d), tendremos entonces que

$$\begin{aligned} u_1 u_2 + u_2 u_3 + \dots + u_{2k} u_{2k+1} + u_{2k+1} u_{2k+2} = \\ = u_{2k+1}^2 - 1 + u_{2k+1} u_{2k+2} = u_{2k+1} u_{2k+3} - 1 = u_{2k+2}^2 \end{aligned}$$

y que

$$\begin{aligned} u_1 u_2 + \dots + u_{2k+1} u_{2k+2} + u_{2k+2} u_{2k+3} = \\ = u_{2k+2}^2 + u_{2k+2} u_{2k+3} = u_{2k+2} u_{2k+4} = u_{2k+3}^2 - 1. \end{aligned}$$

Por consiguiente, estas afirmaciones tienen lugar también para $n=k+1$ y, en consecuencia, para todo n .

Para demostrar la igualdad g), obsérvese que, en virtud de a) y b), $u_1 + u_2 + \dots + u_{n+1} = u_{n+3} - 1$. Por esto, si tiene lugar la igualdad g), será

$$\begin{aligned} (n+1)u_1 + nu_2 + \dots + 2u_n + u_{n+1} = \\ = u_{n+4} - (n+3) + u_{n+3} - 1 = u_{n+5} - (n+4). \end{aligned}$$

Como la igualdad g) es válida para $n=1$, ésta lo será para todo n .

La relación h) se deduce sin dificultad de que

$$\frac{u_{3n+2} - 1}{2} + u_{3n+3} = \frac{u_{3n+5} - 1}{2}.$$

Para demostrar la relación i), hagamos $m=n$ en la fórmula $u_{n+m} = u_{n-1} u_m + u_n u_{m+1}$. Obtendremos entonces que $u_{2n} = u_{n-1} u_n + u_n u_{n+1} = u_n^2 - 1 + u_n^2 = 2u_n^2 - 1$. De igual forma se demuestra que $u_{2n+1} = u_n^2 + u_{n+1}^2$. Haciendo en la misma fórmula $m=2n$, se obtiene que

$$\begin{aligned} u_{3n} &= u_{n-1} u_{2n} + u_n u_{2n+1} = \\ &= u_{n-1}(u_n^2 - 1) + u_n(u_n^2 + u_{n+1}^2) = \\ &= u_{n-1} u_n^2 + u_n^3 - u_{n-1} + u_n^3 + u_n u_{n+1}^2 = u_{n-1} u_n^2 + u_n^3 - u_{n-1}^2. \end{aligned}$$

412.

Supongamos que $u_n \leq N < u_{n+1}$. Entonces será $0 \leq N - u_n < u_{n-1}$, por lo cual existirá un $s < n-1$, tal que $u_s \leq N - u_n < u_{s+1}$. Pero entonces será $0 \leq N - u_n - u_s < u_{s-1}$, siendo, además, $s-1 < n-2$. Al cabo de varios pasos, obtendremos que $N = u_n + u_s + u_p + \dots + u_r$, donde los subíndices vecinos n, s, p, \dots, r se diferenciarán entre sí por lo menos en 2.

413.

Este número de formas es igual al coeficiente de x^s en el desarrollo de la expresión

$$\begin{aligned} (1+x+\dots+x^p)(1+x+\dots+x^q)(1+x+\dots+x^r) &= \\ = (1-x^{p+1})(1-x^{q+1})(1-x^{r+1})(1-x)^{-3} &= \\ = (1-x^{p+1}-x^{q+1}-x^{r+1}-\dots)(1+3x+6x^2+\dots & \\ \dots + C_2^{p+q+r}x^{p+q+r}+\dots) \end{aligned}$$

Como $p < q+r$, será $p < s$, $q < s$, $r < s$, y este coeficiente tendrá la forma

$$\begin{aligned} C_2^{s+2} - C_2^{s-p+1} - C_2^{s-q+1} - C_2^{s-r+1} &= \\ = \frac{(s+2)(s+1)}{2} - \frac{(s-p+1)(s-p)}{2} - & \\ - \frac{(s-q+1)(s-q)}{2} - \frac{(s-r+1)(s-r)}{2} \end{aligned}$$

Abramos paréntesis y consideremos que $p+q+r=2s$. Después de efectuar transformaciones, se obtiene $s^2+s+1-\frac{1}{2}(p^2+q^2+r^2)$.

414.

Si $q+r < p$, será $q < s$, $r < s$, pero $p \geq s$, por lo cual el coeficiente será igual a $C_2^{s+r} - C_2^{s-q+1} - C_2^{s-r+1}$. De aquí se desprende nuestra afirmación.

415.

Todos los objetos se pueden permutar de $(pq+r)!$ maneras. Después de esto, escojamos r personas de entre p , las que obtendrán $q+1$ objetos (de C_2^q modos) y repartamos los objetos en orden, dando a cada una persona q o $q+1$ de ellos. Como el resultado no depende del orden de los elementos en los grupos, habrá que dividir $C_2^q (pq+r)!$ por $(q!)^{p-r} [(q+1)]^r = (q!)^p (q+1)^r$.

416.

$$\begin{aligned} \text{Como } \sum_{i_0=1}^{i_1} 1 = i_1 = C_1^{i_1}, \text{ será } \sum_{i_1=1}^{i_2} \sum_{i_0=1}^{i_1} 1 &= \\ = \sum_{i_1=1}^{i_2} C_1^{i_1} = C_2^{i_2+1}. \text{ Después, tendremos } \sum_{i_2=1}^{i_3} \times & \\ \times \sum_{i_1=1}^{i_2} \sum_{i_0=1}^{i_1} 1 = \sum_{i_2=1}^{i_3} C_2^{i_2+1} = C_3^{i_3+2}. \end{aligned}$$

De aquí queda claro que la suma calculada es igual a C_{n+1}^{n+m} .

417.

Dividamos todas las permutaciones de m esferas blancas y n negras en clases. Haremos pertenecer a la clase (k_1, \dots, k_m) las permutaciones en las que hay k_1 esferas blancas aisladas, k_2 pares, k_3 ternas, \dots , k_m grupos de m esferas blancas juntas. Es evidente que $k_1 + 2k_2 + \dots + mk_m = m$. Calculemos el número de permutaciones de la clase (k_1, \dots, k_m) . Si las n esferas negras están en orden, tendremos $n+1$ lugares en que se podrán colocar las esferas blancas. De éstos, k_1 lugares estarán ocupados por una esfera blanca, k_2 , por dos, \dots , k_m , por m , y $n - k_1 - \dots - k_m + 1$ lugares estarán libres. Por esto, el número de formas de distribuir los lugares para las esferas blancas, es decir, el número de permutaciones de la clase (k_1, \dots, k_m) , es igual a $P(k_1, \dots, k_m, n - k_1 - \dots - k_m + 1)$. Como el número total de permutaciones de m esferas blancas y n negras es igual a C_{n+m}^m , obtenemos la relación que se quería demostrar.

418.

a) Resolviendo la ecuación característica $r^2 - 7r + 12 = 0$, se hallan las raíces $r_1 = 3$, $r_2 = 4$. Por esto, la solución general tiene la forma $a_n = C_1 3^n + C_2 4^n$. b) Análogamente se obtiene que $a_n = C_1 2^n + C_2 (-5)^n$. c) Se tiene que $a_n = C_1 (2+3i)^n + C_2 (-2-3i)^n$. d) $a_n = C_1 (3i)^n + C_2 (-3i)^n$. e) $r_1 = r_2 = -2$. Por esto, $a_n = (-2)^n (C_1 + C_2 n)$. f) La ecuación característica es la siguiente: $r^2 - 9r^2 + 26r - 24 = 0$. Sus raíces son $r_1 = 2$, $r_2 = 3$, $r_3 = 4$. Por esto, $a_n = C_1 2^n + C_2 3^n + C_3 4^n$. g) $r_1 = r_2 = r_3 = -1$. Por esto, será $a_n = (-1)^n (C_1 + C_2 n + C_3 n^2)$. h) La ecuación característica tiene la forma $r^4 + 4 = 0$. Sus raíces son: $r_1, 2 = \pm 1 \pm i$, $r_3, 4 = -1 \pm i$.

$$\text{Por esto, } a_n = 2^{1/2} [C_1(1+i)^n + C_2(1-i)^n + C_3(-1+i)^n + C_4(-1-i)^n].$$

419.

a) Resolviendo la ecuación característica $r^2 - 5r + 6 = 0$, se obtiene que $r_1 = 2$, $r_2 = 3$, por lo cual $a_n = C_1 2^n + C_2 3^n$. Haciendo $n = 1$ y $n = 2$, se obtiene, para determinar C_1 y C_2 , el sistema de ecuaciones

$$2C_1 + 3C_2 = 1, \quad 4C_1 + 9C_2 = -7.$$

De éste se halla que $C_1 = 5$, $C_2 = -3$, por lo cual $a_n = 5 \cdot 2^n - 3^{n+1}$.

b) Se tiene que $a_n = 2^n (C_1 + C_2 n)$. Haciendo $n = 1, n = 2$, se obtuvo el sistema de ecuaciones $C_1 + C_2 = 1, C_1 + 2C_2 = 1$, del cual se deduce que $C_1 = 1, C_2 = 0$, por lo cual $a_n = 2^n$.

$$c) a_n = \frac{1}{2^{n+2}} [(-1+i\sqrt{3})^n + (-1-i\sqrt{3})^n].$$

$$d) a_n = 2^n + 2^n - 4^n.$$

420.

La ecuación característica tiene la forma $r^2 - 2r \cos \alpha + 1 = 0$. Sus raíces son $r_{1,2} = \cos \alpha \pm i \sin \alpha$. Por esto, $a_n = C_1 (\cos \alpha + i \sin \alpha)^n + C_2 (\cos \alpha - i \sin \alpha)^n$. Haciendo $n = 1, 2$, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} (C_1 + C_2) \cos \alpha + (C_1 - C_2) i \sin \alpha = \cos \alpha, \\ (C_1 + C_2) \cos 2\alpha + (C_1 - C_2) i \sin 2\alpha = \cos 2\alpha. \end{cases}$$

De aquí se obtiene $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, $a_n =$

$$= \frac{1}{2} [(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n + (\cos \alpha - i \sin \alpha)^n].$$

En virtud de la fórmula de Moivre, será $a_n = \cos n\alpha$.

421.

Se deduce de que la ecuación característica

$$r^k - C_1^k r^{k-1} + C_2^k r^{k-2} + \dots + (-1)^k = 0$$

se puede escribir en la forma $(r-1)^k = 0$. Esta tiene la raíz $r=1$, de multiplicidad k . Por esto,

una de las soluciones de la relación de recurrencia es $a_n = n^k$ (véase la pág. 111).

422.

$$a_n = \frac{n}{12} \cdot 2^n + C_1 (-4)^n + C_2 2^n.$$

423.

Se tiene que

$$(1+x)^p = 1 + C_1^p x + C_2^p x^2 + \dots + C_n^p x^n + \dots \quad (*)$$

$$(1+x)^{-k-1} = 1 - C_1^{k+1} x + C_2^{k+2} x^2 - \dots \quad (**)$$

$$(1+x)^{p-k-1} = 1 - C_1^{p-k-1} x + \dots \quad (***)$$

Multipliquemos los desarrollos (*) y (***) y halle-

mos el coeficiente de x^n . Este es igual a

$$\sum_s (-1)^{n-s} C_{n-s}^{k+n-s} C_s^p = \sum_s (-1)^s C_s^{k+s} C_{n-s}^p.$$

De aquí se deduce directamente la identidad que había que demostrar. Las identidades restantes, hasta el problema 438 inclusive, se demuestran análogamente.

439.

Se demuestra mediante inducción completa con respecto a n .

AL LECTOR

Le agradeceremos a Ud. que nos dé a conocer su opinión acerca del libro que le ofrecemos, así como de la traducción, presentación e impresión del mismo. Le quedaremos también muy reconocidos si nos manda cualquier otra sugerencia.

Nuestra dirección
Editorial Mir, 1 Rizhski per., 2
129820, H-278, Moscú, URSS

